Health Status of New Brunswickers

Fourth Report 1994-1998

New Brunswick

Health and Wellness

104-01848/

Health Status of New Brunswickers

Fourth Report

1994 - 1998

New Brunswick
Department of Health & Wellness

Table of Contents

LIST OF TABLES.....iii

LIST OF FIGURES.....vii

ACKNOWLEDGEMENTS.....xvi

EXECUTIVE SUMMARY.....xvii

CHAPTER 1 INTRODUCTION.....1

CHAPTER 2 POPULATION, STRUCTURE.....5

New Brunswick
Health Regions
North & South

CHAPTER 3 POPULATION, STATISTICS.....13

Highlights
Natural Rate of Increase
Infant Mortality
Age-Specific Fertility Rates
Live births <2500 grams
Life Expectancy
Potential Years of Life Lost

CHAPTER 4 MORTALITY IN THE POPULATION,.....31

Highlights
Mortality & Leading Causes of Death
Leading Causes of Death by Age & Gender
Proportional Mortality Ratio & Crude Mortality Rate
Diseases of the Circulatory System
- Ischemic Heart Disease
- Cerebrovascular Disease

Neoplasms
- Malignant Neoplasms of the Trachea, Bronchus & Lung
- Malignant Neoplasms of the Female Breast

Diseases of the Respiratory System
- Chronic Obstructive Pulmonary Disease

External Causes of Injury & Poisoning
- Motor Vehicle Traffic Accidents
- Suicide

CHAPTER 5 MORBIDITY IN THE POPULATION,.....99

Highlights
Communicable Diseases
Vaccine-Preventable Disease
Sexually-Transmitted Diseases (STDs)
Enteric Diseases
Other Communicable Diseases
Hospital Utilization
Disease Classification
Mental Disorders
Diseases of the Circulatory System
Cerebrovascular Disease
Ischemic Heart Disease
Diseases of the Respiratory System
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Diseases of the Digestive System
Malignant Neoplasms
Lung Cancer
Prostate Cancer
Female Breast Cancer
Colorectal Cancer
Complications of Pregnancy, Childbirth & Peurperium
Diseases of the Nervous System & Sense Organs
Injury & Poisoning
Diseases of the Musculoskelatal System
Diseases of the Genitourinary System
Endocrine, Nutritional, Metabolic Diseases & Immunity Disorders
Diseases of Skin & Subcutaneous Tissue
Other Data
Congenital anomalies
Child health
Dental health
Reproductive health
Lifestyle Issues
Drug abuse

APPENDIX A - Map of Health Regions, New Brunswick.....256

GLOSSARY.....257

REFERENCES.....258

List of Tables

No. Page

1. NATURAL RATE OF INCREASE, per 1,000 Population, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....16

2. Number of LIVE BIRTHS, INFANT DEATHS & INFANT MORTALITY RATE, per 1,000 Live Births, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....19

3. Age-Specific FERTILITY RATES, per 1,000 FEMALES, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....22

4. Number and percentage of LIVE BIRTHS <2500 grams in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....25

5. LIFE EXPECTANCY (years) at Birth by Sex, Canada & Provinces: 1990-92 & 1996.....27

6. LIFE EXPECTANCY (years) by Age & Sex, New Brunswick & Canada: 1996.....27

7a-b POTENTIAL YEARS OF LIFE LOST (PYLL) RATE, per 100,000 Population, by Leading Causes of Deaths, MALES & FEMALES Under Age 75, Canada, Provinces & Territories: 1994 – 1997.....29-30

8. TOTAL NUMBER OF DEATHS from Seventeen Major Disease Classifications (ICD-9 Codes) in North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998 36

9. Number of DEATHS BY LEADING CAUSES, Age Group & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....45-48

10. CRUDE MORTALITY Rate, per 10,000 Population, & Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for MALES in the North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....51

11. CRUDE MORTALITY Rate, per 10,000 Population, & Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for FEMALES in the North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....52

12. ISCHEMIC HEART DISEASE Mortality Rate, per 10,000 Population by Sex & Age Group in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....55

13. CEREBROVASCULAR DISEASE Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex & Age Group in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....59

14. MALIGNANT NEOPLASMS OF TRACHEA, BRONCHUS & LUNG Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex & Age Group in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....64

15. MALIGNANT NEOPLASMS OF FEMALE BREAST Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex & Age Group in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick 1994 – 1998.....68

16a-e Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE by Sex in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 - 1998 74–78

17a-e Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS by Sex in the seven Health Regions North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....86-90

18a-e Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for DEATHS BY SUICIDE by Sex in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....94-98

19. Number of reported cases, per 1,000 Population, for MEASLES, MUMPS, RUBELLA and PERTUSSIS in New Brunswick: 1994 – 1998.....103

20. Reported Cases of MEASLES, MUMPS, RUBELLA & , PERTUSSIS by Age Group & Gender, New Brunswick: 1994–1998.....104

21. Number of GRADE 1 STUDENTS IMMUNIZED & IMMUNIZATION RATE in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1994 – 1998.....105

22a Reported Number of GONORRHEA, CHLAMYDIA, & SYPHILIS Cases in New Brunswick: 1994 – 1998 106

22b Reported Number of GONNORRHEA, CHLAMYDIA, & SYPHILIS Cases per 1,000 population in New Brunswick: 1994 – 1998.....106

22c Reported Number of GONORRHEA, CHLAMYDIA, & SYPHILIS Cases by Age Group & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....107

23a-b Number of New HIV & AIDS Cases & Status of Individuals Diagnosed with AIDS in New Brunswick: 1994 – 1998.....110

24. Number of Reported Cases, per 1,000 Population, for AMEBIASIS, CAMPYLOBACTERIOSIS, GIARDIASIS, E. COLI-0157:H7, SALMONELLOSIS & SHIGELLOSIS in New Brunswick: 1994 - 1998.....114

25. Number of New Cases of TUBERCULOSIS Reported by Type of Case & Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998.....117

26. Number of New Cases of TUBERCULOSIS Reported by Type of Case & area New Brunswick: 1994 – 1998.....117

27. Selected HOSPITAL UTILIZATION & FINANCIAL STATISTICS, New Brunswick & Canada: 1993/94 – 1997/98.....122

28. Hospital Utilization for MAJOR DISEASE CLASSIFICATION by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS & TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 Population, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 126-130

29a-e Hospital Utilization for SELECTED DIAGNOSIS by Sex According to HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 –1997/98.....131-150

30a-e Hospital Utilization for SELECTED DIAGNOSIS by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 Population, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....151-170

31. HOSPITAL CARE DAYS, per 100,000 Population, & Separations, per 100,000 Population, for all CONGENITAL ANOMALIES by Sex, New Brunswick & Canada: 1992/93 – 1997/98.....242

32. NUMBER OF SEPARATIONS & Separations, per 100,000 Population, for Diagnoses of CONGENITAL ANOMALIES by Sex, New Brunswick & Canada: 1992/93 – 1997/98.....243-244

33. Number of REFERRED HEALTH PROBLEMS Identified at Well-Child & 3.5-Year Old Clinics, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1995 – 96 to 1998 – 99.....247

34. NEWBORN CLIENTS Assessed for ECI by Risk Category, in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1998 – 1999.....249

35. Number of VISION, HEARING, & SPEECH SCREENING TEST FAILURES at Public Health 3.5 Year Old Health Clinics by Regions, North, South & Province: 1995/96 – 1998/99.....250

36. Participation Rate of School Children in FLOURIDE MOUTHRINSE PROGRAM, Grades 1 – 6, New Brunswick: 1994/95 to 1998/99.....251

37. Number of BIRTHS & BIRTH RATE, per 1,000 Females, by Age Group & Marital Status for 20 – 24 Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998.....254

38. Reported Use of SUBSTANCES/DRUGS AMONG STUDENTS Grades 7, 9, 10 and 12, New Brunswick: 1996 and 1998.....255

List of Figures

No. Page

1. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, New Brunswick: 1996.....8
2. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 1: 1996.....8
3. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 2: 1996.....9
4. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 3: 1996.....9
5. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 4: 1996.....10
6. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 5: 1996.....10
7. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 6: 1996.....11
8. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Health Region 7: 1996.....11
9. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Northern Health Regions: 1996.....12
10. POPULATION DISTRIBUTION by Age & Sex, Southern Health Regions: 1996.....12
11. INFANT MORTALITY RATE, per 1,000 Live Births, New Brunswick: 1994 – 1998.....17
12. AGE SPECIFIC FERTILITY RATES, per 1,000 Females, by Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998.....20
13. PERCENTAGE OF LIVE BIRTHS <2500 Grams by Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....23
14. AGE-STANDARDIZED MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for All Causes by Gender, New Brunswick: 1991 – 1998.....34
15. PERCENTAGE of DEATHS BY LEADING CAUSES & GENDER: Five-Year Average, New Brunswick: 1994 – 1998.....37
16. PERCENTAGE of DEATHS BY LEADING CAUSES, New Brunswick: 1994 – 1998 38

17. PERCENTAGE of DEATHS BY LEADING CAUSES & GENDER, New Brunswick: 1994 – 1998.....39

18. AVERAGE NUMBER OF DEATHS BY LEADING CAUSES, Age Group & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....41-44

19. AVERAGE PROPORTIONAL MORTALITY RATIO by Leading Causes of Death, Gender & Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....50

20. AVERAGE PERCENTAGE OF DEATHS due to DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM by Leading Diagnostic Classes, Males & Females, New Brunswick: 1994 – 1998.....53

21. AGE-STANDARDIZED MORTALITY RATE FOR ISCHEMIC HEART DISEASE by Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....54

22. AVERAGE AGE-SPECIFIC MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for ISCHEMIC HEART DISEASE by Area, Gender & Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998.....57

23. AGE-STANDARDIZED MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for CEREBROVASCULAR DISEASE by Gender, New Brunswick: 1994 – 1998 58

24. AVERAGE AGE-SPECIFIC MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for CEREBROVASCULAR DISEASE by Area, Gender & Age Group: New Brunswick: 1994 – 1998.....61

25. AVERAGE PERCENTAGE of DEATHS due to MALIGNANT NEOPLASMS by Leading Sites & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....62

26. AGE-STANDARDIZED MORTALITY RATE for MALIGNANT NEOPLASMS of the TRACHEA, BRONCHUS & LUNG by Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.....63

27. AVERAGE AGE SPECIFIC MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for MALIGNANT NEOPLASMS of the TRACHEA, BRONCHUS & LUNG by Area, Gender & Age Group, New Brunswick: 1994 - 1998.....66

28. AGE-STANDARDIZED MORTALITY RATE for MALIGNANT NEOPLASMS of the FEMALE BREAST by Area, New Brunswick: 1994 – 1998 67

29. AVERAGE AGE-SPECIFIC MORTALITY RATES, per 10,000 Population, for MALIGNANT NEOPLASMS of the FEMALE BREAST by Area & Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998.....70

30. AVERAGE PERCENTAGE of DEATHS due to DISEASES of the RESPIRATORY SYSTEM by Leading Diagnostic Classes for Males & Females, New Brunswick: 1994 – 1998.....71

31. AGE-SPECIFIC MORTALITY RATES, per 10,000 Population, for COPD by Age Group & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998 73

32. AVERAGE AGE SPECIFIC MORTALITY RATES, per 10,000 Population, for COPD by Gender, Age Group & Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....80

33. AVERAGE PERCENTAGE of DEATHS due to EXTERNAL CAUSES of INJURY & POISONING by Leading Causes & Gender, New Brunswick: 1994 – 1998 81

34. AVERAGE AGE-SPECIFIC MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS by Gender, Age Group & Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....83-85

35. AVERAGE AGE-SPECIFIC MORTALITY RATE, per 10,000 Population, for DEATHS by SUICIDE by Gender, Age Group & Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....92-93

36. Number of Cases, per 1,000 Population, for MAJOR SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES in New Brunswick: 1994 – 1998 108

37. Number of NEW HIV & AIDS Cases by Gender in New Brunswick: 1994 – 1998 109

38a. Number of Cases, per 1,000 Population, for CAMPYLOBACTERIOSIS, SALMONELLOSIS, in New Brunswick: 1994 – 1998.....111

38b. Number of Cases, per 1,000 Population, for GIARDIASIS, E. COLI-0157:H7 in New Brunswick: 1994 – 1998.....112

38c. Number of Cases, per 1,000 Population, for SHIGELLOSIS & AMEBIASIS in New Brunswick: 1994 – 1998.....113

39. Number of New Cases of TUBERCULOSIS by Type Reported in New Brunswick: 1994 – 1998.....115

40. Average Number of New TUBERCULOSIS Cases, per 1,000 Population, by Area, New Brunswick: 1994 – 1998.....118

41. HOSPITAL CARE DAYS, per 100,000 Population, & Annual Per Capita Spending on Hospital Care, New Brunswick & Canada: 1993/94 – 1997/98 119

42. AVERAGE COST, per PATIENT-DAY, & AVERAGE LENGTH of STAY in PUBLIC HOSPITALS, New Brunswick & Canada: 1993/94 – 1997/98 120

43. HOSPITAL SEPARATIONS, per 100,000 Population, & Average Cost, per Separation, in Public Hospitals, New Brunswick & Canada: 1993/94 – 1997/98 121

44. Five-Year AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, by Disease Classification & Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....123

45. Five-Year AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, by Disease Classification & Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....124

46. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for MENTAL DISORDERS by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 171

47. AVERAGE NUMBER of HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for MENTAL DISORDERS by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 173

48. AVERAGE NUMBER of HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for MENTAL DISORDERS by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....174

49. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM by Gender, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98 176

50. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM - All Causes by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 179

51. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM - All Causes by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 179

52. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for CEREBROVASCULAR DISEASES by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....182

53. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for CEREBROVASCULAR DISEASES by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....182

54. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for ISCHEMIC HEART DISEASE by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....185

55. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for ISCHEMIC HEART DISEASE by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....185

56. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM by Gender, New Brunswick:1993/94 – 1997/98.....187

57. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....190

58. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 190

59. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for COPD by Gender in the seven Health Regions, North, South & the Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....193

60. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for COPD by Gender in the seven Health Regions, North , South & the Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 193

61. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM by Gender, New Brunswick:1993/94 – 1997/98 194

62. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 197

63. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98 197

64. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for MALIGNANT NEOPLASMS by Gender, New Brunswick: 1993/94–1997/98.....198

65. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for MALIGNANT NEOPLASMS - All Causes, by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 201

66. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for MALIGNANT NEOPLASMS - All Causes, by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98 201

67. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for LUNG CANCER by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 204

68. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for LUNG CANCER by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....204

69. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for PROSTATE CANCER in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98.....206

70. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for PROSTATE CANCER in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....206

71. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for FEMALE BREAST CANCER in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98.....208

72. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for FEMALE BREAST CANCER in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....208

73. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for COLORECTAL CANCER by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98.....211

74. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for COLORECTAL CANCER by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....211

75. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH & THE PUERPERIUM in Females, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 212

76. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH & THE PUERPERIUM in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98.....214

77. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH & THE PUERPERIUM in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....214

78. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 215

79. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98 218

80. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 –1997/98 218

81. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for INJURY & POISONING by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 219

82. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for INJURY & POISONING by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98 222

83. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for INJURY & POISONING by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 222

84. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 223

85. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 226

86. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98 226

87. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....227

88. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....230

89. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....230

90. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for ENDOCRINE, NUTRITIONAL & METABOLIC DISEASES & IMMUNITY DISORDERS by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....231

91. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for ENDOCRINE, NUTRITIONAL & METABOLIC DISEASES & IMMUNITY DISORDERS by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98.....234

92. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for ENDOCRINE, NUTRITIONAL & METABOLIC DISEASES & IMMUNITY DISORDERS by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....234

93. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....235

94. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL CARE DAYS, per 1,000 Population, for DISEASES OF SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....238

95. AVERAGE NUMBER OF HOSPITAL SEPARATIONS, per 1,000 Population, for DISEASES OF SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE by Gender in the seven Health Regions, North, South & Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98.....238

96. HOSPITAL CARE DAYS & HOSPITAL SEPARATIONS, per 100,000 Population, for CONGENITAL ANOMALIES by Gender, New Brunswick & Canada: 1992/93 – 1997/98 240

97. Average Number of Hospital Separations for Congenital Anomalies, per 100,000 population, by Gender & Diagnosis, New Brunswick & Canada: 1992/93 – 1997/98 245

98. Birth Rate, per 1,000 Females, by Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998 252

99. Birth Rate, per 1,000 Females from 20 – 24 Years old, by Marital Status, New Brunswick: 1994 – 1998.....253

Acknowledgements

We wish to acknowledge contributions from the following sources in the preparation of this report:

Statistics Canada

Health Canada: Laboratory Centre for Disease Control

NB Statistical Agency

Departmental Staff:

Charles Gilbert – Epidemiology Program Officer, Provincial Epidemiology Service

Deeba Zaidi – Research & Planning Officer, Provincial Epidemiology Service

Huguette Lavoie – Program & Policy Analyst, Vital Statistics (1994 – 1998 database)

Provincial Epidemiology Service

Hospital Services

Public Health Management Service

To obtain additional copies, contact:

Dr. B. Christofer Balram
Provincial Epidemiologist
Director, Provincial Epidemiology Service
Department of Health & Wellness
P.O. Box 5100
Fredericton, New Brunswick
Canada
E3B 5G8
Phone (506) 453-3092
Fax (506) 453-2780
Email: christofer.balram@gnb.ca

Executive Summary

INTRODUCTION

This fourth report of the **HEALTH STATUS OF NEW BRUNSWICKERS** provides a profile of the health status of the Population, including information on selected health indicators & updates of the baseline information presented in previous reports.

In order to maintain consistency & continuity of data between this & subsequent reports, the maximum time, period covered in this report is up to 1998, since hospital utilization data usually have a lag, period of about two years. The data presented below covers various aspects of health status under the following headings & time, periods.

Population Structure	-	New Brunswick: 1996 census data
Population Statistics	-	Selected Population rates, New Brunswick and Canada: 1994 – 1998
Mortality in the Population	-	Vital Statistics data, 1994 – 1998
Morbidity in the Population	-	Communicable Diseases in New Brunswick: 1994 – 1998
	-	Hospital utilization data, 1994 – 1998
	-	Public Health program statistics, 1994 – 1998

POPULATION, STRUCTURE

Overall, the Population structure shows little change from previous years.

- The total adjusted Population, in New Brunswick for the year 1996 = 752,995.
- Slightly less than half of the New Brunswick Population, is male at 49.6%, while 50.4% of the New Brunswick Population is female.
- Adults aged 15 – 64 years of age comprise 68.4% of the total Population.
- The three largest 5-year age groups in the Province are 35 – 39 at 8.5%, 30 – 34 at 8.4% & 40 – 44 at 8.2%, for a total of 25.1% of the entire Population.
- Those aged 65+ years make up 12.4% of the entire Population in New Brunswick.
- Children aged <1 – 14 years make up 19.2% of the Population in New Brunswick

POPULATION, STATISTICS

- The natural rate of increase for the Province declined from a rate of 4.1, per 1000 Population, in 1994 to a rate of 2.1, per 1000 Population, in 1998. There were no consistent regional differences among the Health Regions during the five-year period from 1994 – 1998.

- The infant mortality rate continued to decline over the current reporting, period with the lowest rate reported in 1995 & a sudden increase of about 26% in 1998. There were no consistent differences among the Health Regions.

- The fertility rate during the reporting period for New Brunswick was highest for mothers aged 25 – 29 years ranging from 100.4 to 120.5 live births, per 1,000 women aged 25-29. A gradual increase was noted in the fertility rate for mothers aged 35 – 39 years going from 17.2 to 20.3 live births, per 1,000 women aged 35 – 39, for the reporting period.

- The total number of live births has decreased steadily in New Brunswick since 1994, going from 8,903 to 7,831 in 1998.

- The, percent of live births <2500 grams fluctuated over the five-year period from 1994 to 1998, with the lowest, percentage reported in 1998 (5.1%) & the highest reported in 1994 (5.8%).

- Life expectancy for New Brunswickers at birth was slightly lower than the Canadian average for both males & females. In 1996, in New Brunswick: the male life expectancy at birth was 75.2 years, while the life expectancy for females was 81.2 years. (Note: life expectancy calculations are only done in the post censal year by Statistics Canada. Consequently 1996, are the most recent figures).

- The leading causes of the potential years of life lost (PYLL) for the 1994 – 1998 period remained the same as those identified previously for males (e.g. coronary heart disease, suicide, car accidents & lung cancer). The leading causes of PYLL for females have changed since the previous report. They are: breast cancer, coronary heart disease, lung cancer & car accidents, compared to congenital anomalies, coronary heart disease, car accidents, lung cancer and perinatal mortality in the previous report. For both males & females, these causes were responsible for the most potential years of life lost for the five-year period.

MORTALITY IN THE POPULATION

- The leading causes of death in New Brunswick in the 1994 – 1998 period continued to be diseases of the circulatory system, neoplasms, diseases of the respiratory system & external causes of injury & poisoning.

- Deaths due to diseases of the circulatory system have decreased by 2% during 1994 – 1998 period, while deaths due to neoplasms have increased by 11.3% during 1994 – 1998.

- Among males, ischemic heart disease (IHD) accounted for the largest proportion of all deaths. Malignant neoplasms of the trachea, bronchus & lung was next, followed by chronic obstructive pulmonary disease (COPD) & cerebrovascular disease (CVD).

- Among females, as in earlier reports, ischemic heart disease (IHD) accounted for the largest proportion of all deaths, followed by cerebrovascular diseases (CVD), malignant neoplasms of the breast, malignant neoplasms of trachea, bronchus & lung. These diseases accounted for the largest proportion of all deaths in females during the five-year period

LEADING CAUSES OF DEATH BY SELECTED DISEASES

- A review of the leading causes of death in the period 1994 – 1998 shows that the specific causes were similar to those of the preceding five years.

- For males, the leading cause of deaths from diseases of the circulatory system was ischemic heart disease, which accounted for 54% of all deaths. In females, the leading cause of deaths from diseases of the circulatory system was also ischemic heart disease, which accounted for 46% of all deaths.

- In males, the leading causes of cancer deaths, continued to be malignant neoplams of the trachea, bronchus & lung, followed by malignant neoplasms of the prostate, colon, pancreas & stomach.

- In females, the leading causes of cancer deaths continued to be malignant neoplasms of the trachea, bronchus & lung, followed by malignant neoplasms of breast, colon, pancreas & uterus.

- Chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia & influenza accounted for over 88% of all male & female deaths due to diseases of the respiratory system.

- The age-specific mortality rates for chronic obstructive pulmonary disease continued to be highest in the 65+ year age group for both sexes.

- Motor vehicle traffic accidents accounted for the greatest percentage of deaths in the category "external injury & poisoning" in both sexes.

- The percentage of deaths due to motor vehicle traffic accidents was higher for females (61%), compared to 42% for males, in the five-year period.

MORBIDITY IN THE POPULATION

Analyses of communicable disease data revealed the following information:

- In 1998, only one case of rubella was reported, compared to two cases in the previous year. In 1998, the number of reported cases of pertussis increased to 266 cases compared to 73 in 1997.

- The immunization rate for Grade One Students entering school was down from 98.5% in 1993/94 to 95.8% in 1997/98.

- The leading sexually transmitted disease reported during 1994 – 1998 was chlamydia, followed by gonorrhea & syphilis.

- The number of AIDS deaths rose from 74 in 1994 to 89 in 1998. The number of reported cases of HIV serepositivity stabilized over the five-year period & showed no consistent increasing trends.

- Campylobacteriosis & salmonellosis were the leading enteric diseases reported during the five-year period, followed by giardiasis & E.coli 0157:H7.

- The largest number of tuberculosis cases was reported in the 60+ year age group during 1994 – 1998.

Analyses of hospital utilization data revealed the following information:

- The leading causes of hospitalization during the 1994 – 1998 period were in rank order: mental disorders, diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory system & diseases of the digestive system.

- Between 1993/94 & 1997/98, the average cost, per patient day, for New Brunswick increased by 34.5% from $577.00 to $776.00. This was slightly higher than the national estimate, which increased by 33.0% from $628 to $840 over the same time, period.

- Between 1994 – 1998, hospital care days, per 1,000 Population, decreased by 24% in New Brunswick & 33% in Canada, while the number of separations, per 1,000 Population, decreased by 11% in New Brunswick & 20% in Canada.

- In males, ischemic heart disease, cerebrovascular disease & malignant neoplasms accounted for a greater proportion of hospital utilization in the South than in the North of the province. In females, ischemic heart disease & cerebrovascular disease accounted for a greater proportion of hospital utilization in the South than in the North of the Province.

Chapter 1

Introduction

Introduction

Purpose and Scope

The purpose of the fourth report of the **HEALTH STATUS OF NEW BRUNSWICKERS** is:

1. to provide a profile of the health status of the New Brunswick population, and

2. to provide information to assist in program planning, monitoring and evaluation, as well as policy development

This report includes updated information on selected indicators for several disease categories. Detailed sections are offered on the six leading causes of death.

Report Content

Chapter 2 – Population Structure – provides an update of the population structure of New Brunswick based on the 1996 Census data.

Chapter 3 – Population Statistics – contains updated information describing selected population statistics, such as the natural rate of increase, life expectancy, infant health and teen pregnancy.

Chapter 4 – Mortality in the Population – presents updated information on the major causes of death in the province.

Chapter 5 – Morbidity in the Population – provides an update on morbidity data, which were derived from various sources, such as hospital utilization data, Communicable Diseases in New Brunswick and Public Health program statistics and reports.

The data in this report are in most instances presented for the entire province, for the North and South regions and for the seven Health Regions. The names and boundaries for New Brunswick's Health Regions may be found in Appendix A. The 1996 New Brunswick census population data have been used throughout the report and selected population statistics are presented for 1994 – 1998.

Feedback

Comments on this report are welcome and may be sent to:

Dr. Christofer Balram
Provincial Epidemiologist
Director, Provincial Epidemiology Service
Department of Health and Wellness
P.O. Box 5100,
Fredericton, New Brunswick
E3B 5G8
Phone: 1-506-453-3092
Fax: 1-506-453-2780
Email: christofer.balram@gnb.ca

Chapter 2

Population Structure

Highlights

The information in this section is based on the 1996 census population count from Statistics Canada.

According to the 1996 census:

- The total adjusted population of New Brunswick was 752,995.
- Slightly less than half (i.e. 49.6%) of the New Brunswick population was male, while 50.4% of the population was female.
- Adults aged 15 - 64 years of age accounted for 68.4% of the total population.
- The three largest 5-year age groups in the Province were:
  - 35-39 at 8.7%
  - 30-34 at 8.4%
  - 40-44 at 8.2%
- Those aged 65+ made up 12.4% of the entire population.
- Children aged <1 - 14 years made up 19.2% of the population.

Population Structure

This section presents information on the structure of the New Brunswick population according to the 1996 census. The total presented in the figures may not always be exact due to rounding. The data is presented for the Province, the seven Health Regions, North and South of the Province. The North consists of Health Regions 4, 5, 6 and 7, while the South includes Health Regions 1, 2 and 3.

NOTES TO FIGURE 1
NEW BRUNSWICK

- Total population (1996 adjusted census): 752,995
- Males: 373,791
- Females: 379,204
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 99
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.5%), 30-34 (8.4%), and 40-44 (8.1%)
- Adults, 15-64 years = 68.2% of population
- Elderly, 65+ years = 12.5% of population
- Children, 0-14 years = 19.3% of Population



NOTES TO FIGURE 2
HEALTH REGION 1

- Total population (1996 adjusted census): 182,850
- Males: 90,533
- Females: 92,317
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 98
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.5%), 30-34 (8.4%), and 40-44 (8.1%)
- Adults, 15-64 years = 68.5% of population
- Elderly, 65+ years =13.2% of population
- Children, 0-14 years =18.3 % of Population



NOTES TO FIGURE 3
HEALTH REGION 2

- Total population (1996 adjusted census): 177,837
- Males: 87,170
- Females: 90,667
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 96
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.5%), 30-34 (8.5%,) and 40-44 (8.1%)
- Adults, 15-64 years = 66.5% of population
- Elderly, 65+ years = 13.2% of population
- Children, 0-14 years = 20.3% of Population



NOTES TO FIGURE 4
HEALTH REGION 3

- Total population (1996 adjusted census): 165,354
- Males: 82,597
- Females: 82,757
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 100
- Three largest age groups, both sexes: 30-34 (8.7%), 35-39 (8.4%), and 25-29 (7.8%)
- Adults, 15-64 years = 68.0% of population
- Elderly, 65+ years = 12.0% of population
- Children, 0-14 years = 20.0% of Population



NOTES TO FIGURE 5
HEALTH REGION 4

- Total population (1996 adjusted census): 54,727
- Males: 27,113
- Females: 27,614
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 98
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (9.4%), 40-44 (8.6%), and 30-34 (8.3%)
- Adults, 15-64 years = 68.7% of population
- Elderly, 65+ years = 11.8% of population
- Children, 0-14 years = 19.5% of Population



NOTES TO FIGURE 6
HEALTH REGION 5

- Total population (1996 adjusted census): 32,953
- Males: 16,161
- Females: 16,792
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 96
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.8%), 30-34 (8.1%), and 40-44 (8.1%)
- Adults, 15-64 years = 67.7% of population
- Elderly, 65+ years = 13.3% of population
- Children, 0-14 years = 19.0% of Population



NOTES TO FIGURE 7
HEALTH REGION 6

- Total population (1996 adjusted census): 89,265
- Males: 44,946
- Females: 44,319
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 101
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (9.0%), 40-44 (8.7%), and 30-34 (8.5%)
- Adults, 15-64 years = 70.6% of population
- Elderly, 65+ years = 11.1% of population
- Children, 0-14 years = 18.3% of Population



NOTES TO FIGURE 8
HEALTH REGION 7

- Total population (1996 adjusted census): 50,009
- Males: 25,271
- Females: 24,738
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 102
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.3%), 30-34 (8.1%,) and 40-44 (8.0%)
- Adults, 15-64 years = 68.4% of population
- Elderly, 65+ years = 12.3% of population
- Children, 0-14 years = 19.3% of Population



NOTES TO FIGURE 9
NORTHERN HEALTH REGION
(Regions 4, 5, 6 & 7)

- Total population (1996 adjusted census): 226,954
- Males: 113,491
- Females: 113,463
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 100
- Three largest age groups, both sexes: 35-39 (8.9%), 30-34 (8.4%), and 40-44 (8.4%)
- Adults, 15-64 years = 69.2% of population
- Elderly, 65+ years = 11.9% of population
- Children, 0-14 years = 18.9% of Population



Figure 9 Population Distribution By Ag and Sex, Northern Health Regions: 1996

NOTES TO FIGURE 10
SOUTHERN HEALTH REGION
(Regions 1, 2 & 3)

- Total population (1996 adjusted census): 526,041
- Males: 260,300
- Females: 265,741
- Sex ratio: Number of males per 100 females = 98
- Three largest age groups, both sexes: 30-34 (8.5%), 35-39 (8.4%), and 40-44 (8.0%)
- Adults, 15-64 years = 67.7% of population
- Elderly, 65+ years = 19.5% of population
- Children, 0-14 years = 12.8% of Population



Figure 10 Population Distribution By Ag and Sex, Southern Health Regions: 1996

Chapter 3

Population Statistics

Highlights

In the New Brunswick population:

- The natural rate of increase for the Province declined steadily from a rate of 4.1 in 1994, to a rate of 2.1 in 1998. There were no consistent differences evident in the natural rate of increase amongst the Health Regions during the current five-year reporting period, from 1994 – 1998.

- There was an overall decline in the infant mortality rate from 1994 to 1997, while in 1998, an increase of about 26% was noted. There were no consistent trends to report within the Health Regions.

- The fertility rate for New Brunswick was the highest for mothers aged 25 – 29 years during the reporting period. However, a gradual decrease was noted in the fertility rate for mothers between 20 and 29 years of age. A gradual decrease was also noted in the fertility rate for mothers aged 15 – 19 years to 1997, followed by a slight increase in 1998. The fertility rate for mothers aged 30 – 44 years gradually increased during the five-year reporting period, 1994 to 1998.

- The total number of live births in New Brunswick decreased steadily since 1994 (see table 2).

- The percentage of live births less than 2500 grams fluctuated during the reporting period, with the lowest percentage reported at 5.1% in 1998, and the highest percentage reported at 5.8% in 1994.

- Life expectancy for New Brunswickers at birth was slightly lower than the Canadian average for both males (75.7 years) and females (81.4 years) in 1996. In New Brunswick, the male life expectancy at birth was 75.2 years, while the life expectancy for females was 81.2 years.

- The leading causes of potential years of life lost (PYLL) for males during the 1994 – 1998 period remained the same as those identified previously: coronary heart disease, car accidents, suicide and lung cancer.

- The leading causes of potential years of life lost (PYLL) for females changed somewhat from the previous report, with breast cancer replacing congenital anomalies as the leading cause of PYLL in women .

Population Statistics

NATURAL RATE OF INCREASE

NOTES TO TABLE 1

Table 1 presents the natural rate of increase, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick between 1994 and 1998.

- The natural rate of increase for New Brunswick has declined steadily since 1994, with the lowest rate occurring in 1998.

North and South

- The natural rate of increase decreased steadily in both areas during the five-year period between 1994 and 1998.
- The South reported a higher natural rate of increase than the North in all years between 1994 and 1998.

Health Regions

- An overall downward trend in the natural rate of increase was evident in all regions between 1994 and 1998.

Table 1 Natural rate of increase, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

		1994	1995	1996	1997	1998
Health Region	**I**	3.2	2.8	2.5	1.7	1.2
	II	4.1	3.0	3.5	2.6	1.8
	III	5.7	5.2	4.5	4.1	3.8
	IV	2.8	1.9	1.7	1.2	1.7
	V	2.8	2.1	0.4	2.5	-0.3
	VI	3.9	3.7	2.0	2.9	1.8
	VII	4.7	5.0	4.1	2.8	3.6
	North	3.7	3.3	2.2	2.4	1.9
	South	4.3	3.6	3.5	2.8	2.2
	Province	4.1	3.5	3.1	2.7	2.1

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 - 1998).

Population Statistics

NATURAL RATE OF INCREASE

NOTES TO TABLE 1

Table 1 presents the natural rate of increase, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick between 1994 and 1998.

- The natural rate of increase for New Brunswick has declined steadily since 1994, with the lowest rate occurring in 1998.

North and South

- The natural rate of increase decreased steadily in both areas during the five-year period between 1994 and 1998.
- The South reported a higher natural rate of increase than the North in all years between 1994 and 1998.

Health Regions

- An overall downward trend in the natural rate of increase was evident in all regions between 1994 and 1998.

Table 1 Natural rate of increase, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

		1994	1995	1996	1997	1998
Health Region	**I**	3.2	2.8	2.5	1.7	1.2
	II	4.1	3.0	3.5	2.6	1.8
	III	5.7	5.2	4.5	4.1	3.8
	IV	2.8	1.9	1.7	1.2	1.7
	V	2.8	2.1	0.4	2.5	-0.3
	VI	3.9	3.7	2.0	2.9	1.8
	VII	4.7	5.0	4.1	2.8	3.6
	North	3.7	3.3	2.2	2.4	1.9
	South	4.3	3.6	3.5	2.8	2.2
	Province	4.1	3.5	3.1	2.7	2.1

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998).

INFANT MORTALITY

NOTES TO FIGURE 11

Figure 11 shows the annual infant mortality rate, per 1,000 live births, in New Brunswick between 1994 and 1998.

- In comparison to the previous five-year period (1989 - 1993), the infant mortality rate for the Province declined, reaching its lowest point in 1995. A sudden increase was noted in 1998 when the infant mortality rate increased by about 26%.

Figure 11 Infant Mortality Rate, per 1,000 Live Births, in New Brunswick: 1994 – 1998



NOTES TO TABLE 2

Table 2 presents the number of live births, infant deaths and infant mortality rate, per 1,000 live births, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick between 1994 and 1998. **Note**: these data do not include out-of-province numbers.

- Provincially, the infant mortality rate fluctuated during the period 1994 – 1998, with the lowest rate reported in 1995 and 1997, followed by an increase of about 26% in 1998.

North and South

- The infant mortality rate was similar in the North and South in all years, except for 1994 when the rate was higher in the North, and 1998 when the rate was higher in the South. A low infant mortality rate in the North was noted in 1997.

Health Regions

- There were no consistent trends reported among the seven Health Regions for the period 1994 – 1998. All regional rates fluctuated during the five-year period with the exception of Region IV that showed a continuous decrease since 1996. A substantial decrease was also evident in Region V in 1996, 1997, and 1998.

Table 2 **Number of live births, infant deaths, and infant mortality rate, per 1,000 live births, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

1994		Live births	Infant Deaths	Infant Mortality Rate
Health Region	I	1947	10	5.1
	II	2338	8	3.4
	III	2163	8	3.7
	IV	561	2	3.6
	V	354	2	5.7
	VI	940	2	2.1
	VII	600	5	8.3
	North	2455	11	4.5
	South	6448	26	4.0
	Province	8903	37	4.1
1995		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1954	10	5.1
	II	2196	10	4.6
	III	2036	6	3.0
	IV	525	3	5.7
	V	325	1	3.1
	VI	873	2	2.3
	VII	605	1	1.7
	North	2328	7	3.0
	South	6186	26	4.2
	Province	8514	33	3.9
1996		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1884	11	5.8
	II	2162	7	3.2
	III	1989	7	3.5
	IV	508	4	7.9
	V	261	0	0.0
	VI	778	1	1.3
	VII	553	2	3.6
	North	2100	7	3.3
	South	6035	25	4.1
	Province	8135	32	3.93
1997		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1753	7	4.0
	II	2027	11	5.4
	III	1949	12	6.2
	IV	484	0	0.0
	V	306	0	0.0
	VI	846	1	1.2
	VII	503	0	0.0
	North	2139	1	0.5
	South	5729	30	5.2
	Province	7868	31	3.9
1998		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1833	12	6.5
	II	1948	10	5.1
	III	1906	9	4.7
	IV	525	2	3.8
	V	278	0	0.0
	VI	772	2	2.6
	VII	569	4	7.0
	North	2144	8	3.7
	South	5687	31	5.5
	Province	7831	39	5.0

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

Table 2 **Number of live births, infant deaths, and infant mortality rate, per 1,000 live births, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

1994		Live births	Infant Deaths	Infant Mortality Rate
Health Region	I	1947	10	5.1
	II	2338	8	3.4
	III	2163	8	3.7
	IV	561	2	3.6
	V	354	2	5.7
	VI	940	2	2.1
	VII	600	5	8.3
	North	2455	11	4.5
	South	6448	26	4.0
	Province	8903	37	4.1
1995		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1954	10	5.1
	II	2196	10	4.6
	III	2036	6	3.0
	IV	525	3	5.7
	V	325	1	3.1
	VI	873	2	2.3
	VII	605	1	1.7
	North	2328	7	3.0
	South	6186	26	4.2
	Province	8514	33	3.9
1996		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1884	11	5.8
	II	2162	7	3.2
	III	1989	7	3.5
	IV	508	4	7.9
	V	261	0	0.0
	VI	778	1	1.3
	VII	553	2	3.6
	North	2100	7	3.3
	South	6035	25	4.1
	Province	8135	32	3.93
1997		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1753	7	4.0
	II	2027	11	5.4
	III	1949	12	6.2
	IV	484	0	0.0
	V	306	0	0.0
	VI	846	1	1.2
	VII	503	0	0.0
	North	2139	1	0.5
	South	5729	30	5.2
	Province	7868	31	3.9
1998		**Live births**	**Infant Deaths**	**Infant Mortality Rate**
Health Region	I	1833	12	6.5
	II	1948	10	5.1
	III	1906	9	4.7
	IV	525	2	3.8
	V	278	0	0.0
	VI	772	2	2.6
	VII	569	4	7.0
	North	2144	8	3.7
	South	5687	31	5.5
	Province	7831	39	5.0

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES

NOTES TO FIGURE 12

Figure 12 shows the age-specific fertility rates, per 1,000 females, for four age groups between 1994 and 1998.

- Compared to the preceding five-year period (1989 – 1993), a gradual downward trend was noted in the fertility rates for mothers in the 15 - 19 and 20 - 29 year age groups.
- During the five-year period 1994 – 1998, fertility rates were consistent for women between 30 and 39 years of age. There was no change for women between 40 and 49 years of age.

Figure 12 Age-Specific Fertility Rates, per 1,000 Females, by Age Group in New Brunswick: 1994 – 1998



NOTES TO TABLE 3

Table 3 presents age-specific fertility rates, per 1,000 females, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 – 1998.

- Provincial fertility rates were highest for mothers in the 25 - 29 year age group over the five-year period 1994 – 1998.
- An increase in the fertility rate in the 15 – 19 year age group was noted up to the year 1994, followed by gradual decrease during subsequent years, 1995 to 1998.
- During the five-year reporting period, a slight decrease was noted in the fertility rate for mothers in the 20 - 24 and 25 – 29 year age groups, to1997, followed by a slight increase in 1998 for the 25 – 29 year age group. For mothers in the 30 - 34 year age group, a slight increase was noted to 1995, then a gradual decrease again to 1998. A slight increase was also noted for mothers in the 35 – 39 and 40 – 44 year age groups.
- Fertility rates in the 45 – 49 year age group remained stable over the 1994 – 1998 period.

North and South

- Age-specific fertility rates in 1994 – 1998 were generally higher in the South for all age groups, except for the 20 – 24 year age group in the years 1994, 1995, 1997 and 1998. This reflects the trend reported in earlier versions of the Health Status report (1989 – 1993).

Health Regions

- In the 15 – 19 year age group, the fertility rates in Region II, III, V and VII were higher than the provincial average during the 1994 – 1998 period. In the other age groups, there were few consistent differences between regions.

Table 3 Age-specific fertility rates, per 1,000 FEMALES, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

		Age Group						
1994		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	31.4	63.5	114.5	60.7	17.4	2.2	0.0
	II	40.5	94.0	126.9	72.7	21.8	2.4	0.2
	III	34.5	93.9	122.7	68.5	20.4	2.3	0.0
	IV	26.4	89.4	114.2	49.6	10.6	0.4	0.0
	V	34.1	87.3	128.5	59.2	8.4	3.0	0.0
	VI	27.5	71.8	119.3	53.9	11.8	0.8	0.0
	VII	38.1	96.9	116.3	55.2	14.7	1.5	0.0
	North	30.4	83.9	118.7	53.9	11.6	1.2	0.0
	South	35.5	83.3	121.3	67.2	19.8	2.3	0.0
	Province	33.8	83.5	120.6	63.2	17.2	2.0	0.0
1995		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	26.3	66.6	104.3	69.9	19.6	1.6	0.1
	II	38.4	89.6	109.7	74.9	20.1	2.8	0.0
	III	37.0	87.6	107.1	67.6	18.2	3.9	0.2
	IV	25.9	84.5	108.5	38.2	12.9	2.7	0.0
	V	33.2	86.4	90.9	65.8	11.9	0.8	0.0
	VI	25.7	71.5	104.7	51.5	9.3	1.6	0.0
	VII	36.5	93.2	109.0	64.2	20.6	0.5	0.0
	North	29.1	81.6	104.8	53.0	12.9	0.1	0.0
	South	33.8	80.9	107.0	70.9	19.3	2.7	0.1
	Province	32.3	81.1	106.4	65.5	17.3	1.9	0.1
1996		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	22.4	66.0	101.2	65.1	20.2	2.6	0.1
	II	33.1	90.9	101.1	77.6	22.5	3.3	0.3
	III	31.3	76.1	109.7	71.4	22.5	2.0	0.0
	IV	21.5	78.5	105.1	46.6	10.2	0.9	0.0
	V	22.7	75.6	95.9	36.2	7.7	0.8	0.0
	VI	20.2	62.5	87.2	48.0	13.8	2.1	0.0
	VII	27.8	88.3	103.3	64.6	12.3	0.0	0.0
	North	22.5	74.1	96.3	49.5	11.7	1.2	0.0
	South	28.8	77.4	104.0	71.3	21.7	2.7	0.2
	Province	26.8	76.4	101.8	64.8	18.6	2.2	0.1
1997		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	17.6	66.2	96.2	61.4	15.6	1.7	0.0
	II	30.5	79.0	102.6	70.9	22.1	3.3	0.0
	III	32.1	78.3	99.6	69.8	23.4	3.3	0.0
	IV	18.6	83.4	98.4	39.1	10.2	1.7	0.0
	V	21.9	78.5	101.8	59.9	11.2	0.8	0.0
	VI	20.8	69.6	104.7	48.8	10.6	2.1	0.0
	VII	23.4	76.5	105.0	53.2	8.8	3.1	0.0
	North	21.0	75.6	102.9	49.0	10.2	2.0	0.0
	South	26.5	74.3	99.4	67.3	20.2	2.7	0.0
	Province	24.7	74.7	100.4	61.8	17.1	2.5	0.0
1998		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	23.5	55.2	103.1	65.8	20.1	2.0	0.3
	II	28.9	76.4	95.4	65.7	25.7	3.7	0.5
	III	27.1	72.7	109.9	64.1	23.4	2.5	0.0
	IV	18.1	93.2	106.3	42.6	11.4	1.3	0.0
	V	29.7	72.6	82.0	47.3	14.0	0.8	0.0
	VI	19.3	61.3	92.7	43.8	13.8	1.6	0.0
	VII	29.4	73.2	123.6	59.2	19.1	1.0	0.0
	North	22.6	73.1	101.6	47.3	14.3	1.3	0.0
	South	26.5	67.8	102.8	65.2	23.0	2.7	0.3
	Province	25.2	69.3	102.5	59.8	20.3	2.3	0.2

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

Table 3 Age-specific fertility rates, per 1,000 FEMALES, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

		Age Group						
1994		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	31.4	63.5	114.5	60.7	17.4	2.2	0.0
	II	40.5	94.0	126.9	72.7	21.8	2.4	0.2
	III	34.5	93.9	122.7	68.5	20.4	2.3	0.0
	IV	26.4	89.4	114.2	49.6	10.6	0.4	0.0
	V	34.1	87.3	128.5	59.2	8.4	3.0	0.0
	VI	27.5	71.8	119.3	53.9	11.8	0.8	0.0
	VII	38.1	96.9	116.3	55.2	14.7	1.5	0.0
	North	30.4	83.9	118.7	53.9	11.6	1.2	0.0
	South	35.5	83.3	121.3	67.2	19.8	2.3	0.0
	Province	33.8	83.5	120.6	63.2	17.2	2.0	0.0
1995		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	26.3	66.6	104.3	69.9	19.6	1.6	0.1
	II	38.4	89.6	109.7	74.9	20.1	2.8	0.0
	III	37.0	87.6	107.1	67.6	18.2	3.9	0.2
	IV	25.9	84.5	108.5	38.2	12.9	2.7	0.0
	V	33.2	86.4	90.9	65.8	11.9	0.8	0.0
	VI	25.7	71.5	104.7	51.5	9.3	1.6	0.0
	VII	36.5	93.2	109.0	64.2	20.6	0.5	0.0
	North	29.1	81.6	104.8	53.0	12.9	0.1	0.0
	South	33.8	80.9	107.0	70.9	19.3	2.7	0.1
	Province	32.3	81.1	106.4	65.5	17.3	1.9	0.1
1996		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	22.4	66.0	101.2	65.1	20.2	2.6	0.1
	II	33.1	90.9	101.1	77.6	22.5	3.3	0.3
	III	31.3	76.1	109.7	71.4	22.5	2.0	0.0
	IV	21.5	78.5	105.1	46.6	10.2	0.9	0.0
	V	22.7	75.6	95.9	36.2	7.7	0.8	0.0
	VI	20.2	62.5	87.2	48.0	13.8	2.1	0.0
	VII	27.8	88.3	103.3	64.6	12.3	0.0	0.0
	North	22.5	74.1	96.3	49.5	11.7	1.2	0.0
	South	28.8	77.4	104.0	71.3	21.7	2.7	0.2
	Province	26.8	76.4	101.8	64.8	18.6	2.2	0.1
1997		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	17.6	66.2	96.2	61.4	15.6	1.7	0.0
	II	30.5	79.0	102.6	70.9	22.1	3.3	0.0
	III	32.1	78.3	99.6	69.8	23.4	3.3	0.0
	IV	18.6	83.4	98.4	39.1	10.2	1.7	0.0
	V	21.9	78.5	101.8	59.9	11.2	0.8	0.0
	VI	20.8	69.6	104.7	48.8	10.6	2.1	0.0
	VII	23.4	76.5	105.0	53.2	8.8	3.1	0.0
	North	21.0	75.6	102.9	49.0	10.2	2.0	0.0
	South	26.5	74.3	99.4	67.3	20.2	2.7	0.0
	Province	24.7	74.7	100.4	61.8	17.1	2.5	0.0
1998		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Health Region	I	23.5	55.2	103.1	65.8	20.1	2.0	0.3
	II	28.9	76.4	95.4	65.7	25.7	3.7	0.5
	III	27.1	72.7	109.9	64.1	23.4	2.5	0.0
	IV	18.1	93.2	106.3	42.6	11.4	1.3	0.0
	V	29.7	72.6	82.0	47.3	14.0	0.8	0.0
	VI	19.3	61.3	92.7	43.8	13.8	1.6	0.0
	VII	29.4	73.2	123.6	59.2	19.1	1.0	0.0
	North	22.6	73.1	101.6	47.3	14.3	1.3	0.0
	South	26.5	67.8	102.8	65.2	23.0	2.7	0.3
	Province	25.2	69.3	102.5	59.8	20.3	2.3	0.2

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

LIVE BIRTHS <2500 GRAMS

NOTES TO FIGURE 13

Figure 13 shows the percentage of live births less than 2500 grams in the North and South of New Brunswick between 1994 and 1998.

- During the five-year period from 1994 to 1998, there was no consistent difference in the percentage of live births <2500 grams in the North and South of the Province.
- There was an upward trend in the percentage of live births <2500 grams in the South of the Province, while there was a downward trend in the percentage of live births <2500 grams in the North of the Province between the period 1994 to 1998.

Figure 13 Percentage of Live Births <2500 Grams by Area, New Brunswick, 1994 - 1998



NOTES TO TABLE 4

Table 4 presents the number of live births, number of live births less than 2500 grams and the percentage of live births less than 2500 grams in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 to 1998.
Note: these data do not include out-of-province numbers.

- The total number of live births has decreased gradually in New Brunswick since 1994. The lowest number recorded was 7,831 in 1998.

- The percentage of live births <2500 grams in the Province fluctuated during the five-year reporting period. The highest percentage of live births <2500 grams was 5.8% in 1994 (Table 4).

North and South

- The percentage of live births <2500 grams was slightly higher in the North and South in 1994 and 1996 during the five-year reporting period. The percentage of live births <2500 grams in both North and South declined in 1995.

Health Regions

- No consistent trends were evident among the Health Regions, except for a higher percentage of live births <2500 grams noted in 1994 in Health Region IV, and a lower percentage of live births <2500 grams noted in Region VII in the year 1996.

Table 4 **Number and percentage of live births <2500 grams in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998**

1994 Health Region		Total Number of Live Births	Live Births <2500 grams	Percentage <2500 grams
	I	1947	112	5.8
	II	2338	140	6.0
	III	2163	115	5.3
	IV	561	39	7.0
	V	354	20	5.7
	VI	940	50	5.3
	VII	600	37	6.2
	North	2455	146	6.0
	South	6448	367	5.7
	Province	8903	513	5.8
1995		**Total Number**	**Live Births**	**Percentage**
Health Region		of Live Births	<2500 grams	<2500 grams
	I	1954	107	5.5
	II	2196	88	4.0
	III	2036	92	4.5
	IV	525	32	6.1
	V	325	13	4.0
	VI	873	50	5.7
	VII	605	23	3.8
	North	2328	118	5.1
	South	6186	287	4.6
	Province	8514	405	4.8
1996		**Total Number**	**Live Births**	**Percentage**
Health Region		of Live Births	<2500 grams	<2500 grams
	I	1884	91	4.8
	II	2162	136	6.3
	III	1989	94	4.7
	IV	508	33	6.5
	V	261	10	3.8
	VI	778	39	5.0
	VII	553	12	2.2
	North	2100	94	4.5
	South	6035	321	5.3
	Province	8135	415	5.1
1997		**Total Number**	**Live Births**	**Percentage**
Health Region		of Live Births	<2500 grams	<2500 grams
	I	1753	77	4.4
	II	2027	124	6.1
	III	1949	99	5.1
	IV	484	31	6.4
	V	306	15	4.9
	VI	846	44	5.2
	VII	503	17	3.4
	North	2139	107	5.0
	South	5729	300	5.2
	Province	7868	407	5.2
1998		**Total Number**	**Live Births**	**Percentage**
Health Region		of Live Births	<2500 grams	<2500 grams
	I	1833	104	5.7
	II	1948	113	5.8
	III	1906	99	5.2
	IV	525	23	4.4
	V	278	15	5.4
	VI	772	33	4.3
	VII	569	22	3.9
	North	2144	93	4.3
	South	5687	316	5.6
	Province	7831	409	5.2

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

Table 4 **Number and percentage of live births <2500 grams in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998**

1994 Health Region		Total Number of Live Births	Live Births <2500 grams	Percentage <2500 grams
	I	1947	112	5.8
	II	2338	140	6.0
	III	2163	115	5.3
	IV	561	39	7.0
	V	354	20	5.7
	VI	940	50	5.3
	VII	600	37	6.2
	North	2455	146	6.0
	South	6448	367	5.7
	Province	8903	513	5.8
1995 Health Region		**Total Number of Live Births**	**Live Births <2500 grams**	**Percentage <2500 grams**
	I	1954	107	5.5
	II	2196	88	4.0
	III	2036	92	4.5
	IV	525	32	6.1
	V	325	13	4.0
	VI	873	50	5.7
	VII	605	23	3.8
	North	2328	118	5.1
	South	6186	287	4.6
	Province	8514	405	4.8
1996 Health Region		**Total Number of Live Births**	**Live Births <2500 grams**	**Percentage <2500 grams**
	I	1884	91	4.8
	II	2162	136	6.3
	III	1989	94	4.7
	IV	508	33	6.5
	V	261	10	3.8
	VI	778	39	5.0
	VII	553	12	2.2
	North	2100	94	4.5
	South	6035	321	5.3
	Province	8135	415	5.1
1997 Health Region		**Total Number of Live Births**	**Live Births <2500 grams**	**Percentage <2500 grams**
	I	1753	77	4.4
	II	2027	124	6.1
	III	1949	99	5.1
	IV	484	31	6.4
	V	306	15	4.9
	VI	846	44	5.2
	VII	503	17	3.4
	North	2139	107	5.0
	South	5729	300	5.2
	Province	7868	407	5.2
1998 Health Region		**Total Number of Live Births**	**Live Births <2500 grams**	**Percentage <2500 grams**
	I	1833	104	5.7
	II	1948	113	5.8
	III	1906	99	5.2
	IV	525	23	4.4
	V	278	15	5.4
	VI	772	33	4.3
	VII	569	22	3.9
	North	2144	93	4.3
	South	5687	316	5.6
	Province	7831	409	5.2

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

LIFE EXPECTANCY

NOTES TO TABLES 5 AND 6

Table 5 presents the life expectancy at birth of males and females in the ten Provinces and Canada during two periods: 1990 – 1992 and 1996.

Table 6 presents the life expectancy of male and female New Brunswickers and Canadians, at birth and 60 years, for the year 1996.

- In New Brunswick, life expectancy at birth in 1996 was approximately 75 years for men and 81 years for women.
- Life expectancy for New Brunswickers at birth was slightly lower than the Canadian average for males and females during 1996.
- In males, life expectancy at birth increased by 0.9% in New Brunswick and 1.2% in Canada between 1990 - 92 and 1996.
- In females, life expectancy at birth increased by 0.3% in New Brunswick and 0.5% in Canada.
- Life expectancy for New Brunswickers at 60 years was similar to that of Canadians in 1996.

Table 5 **Life expectancy (years) at birth by sex, Canada and provinces: 1990-92 and 1996**

	Male			Female		
	1990-92	1996	% Change	1990-92	1996	% Change
Canada	**74.55**	**75.70**	**1.2**	**80.89**	**81.40**	**0.5**
NFLD.	73.62	75.00	1.4	79.28	80.50	1.2
NS	73.64	74.90	1.3	80.59	80.70	0.1
PEI	73.22	73.90	0.7	80.79	80.70	-0.1
NB	**74.29**	**75.20**	**0.9**	**80.85**	**81.20**	**0.3**
QC	73.69	75.20	1.5	80.76	81.50	0.7
ONT	74.93	76.10	1.2	80.95	81.40	0.5
MAN	74.57	75.50	0.9	80.89	80.80	-0.1
SASK	75.31	75.50	0.2	81.67	81.40	-0.3
ALTA	75.07	76.00	0.9	80.96	81.30	0.3
BC	75.19	76.10	0.9	81.25	81.90	0.7

Source: Statistics Canada, Catalogue No. H39-467/1999E, Health of Canadians, Canada and Provinces, 1996

Table 6 **Life Expectancy (years) by age and sex, New Brunswick and Canada : 1996**

	AT BIRTH		60 YEARS	
	Male	Female	Male	Female
Canada	**75.7**	**81.4**	**16.1**	**19.9**
N.B.	**75.2**	**81.2**	**15.7**	**19.9**
Region 1	75.4	82.2	16.2	20.7
Region 2	74.7	80.3	15.3	19.2
Region 3	74.8	80.7	15.3	19.5
Region 4	73.0	80.6	15.1	19.5
Region 5	73.7	81.0	15.9	19.6
Region 6	75.7	82.4	16.2	20.9
Region 7	73.8	81.5	16.1	19.8

Source: Statistics Canada, Catalogue No. 82-221-XIE, Health Indicators, Canada and Provinces, 1996

NOTE TO TABLE 6

Data not available for 1 year, 20 years and 40 years. Life Expectancy calculations are only done around census years, and detailed Life Expectancy tables were not available at time of printing.

Table 5 **Life expectancy (years) at birth by sex, Canada and provinces: 1990-92 and 1996**

	Male			Female		
	1990-92	1996	% Change	1990-92	1996	% Change
Canada	**74.55**	**75.70**	**1.2**	**80.89**	**81.40**	**0.5**
NFLD.	73.62	75.00	1.4	79.28	80.50	1.2
NS	73.64	74.90	1.3	80.59	80.70	0.1
PEI	73.22	73.90	0.7	80.79	80.70	-0.1
NB	**74.29**	**75.20**	**0.9**	**80.85**	**81.20**	**0.3**
QC	73.69	75.20	1.5	80.76	81.50	0.7
ONT	74.93	76.10	1.2	80.95	81.40	0.5
MAN	74.57	75.50	0.9	80.89	80.80	-0.1
SASK	75.31	75.50	0.2	81.67	81.40	-0.3
ALTA	75.07	76.00	0.9	80.96	81.30	0.3
BC	75.19	76.10	0.9	81.25	81.90	0.7

Source: Statistics Canada, Catalogue No. H39-467/1999E, Health of Canadians, Canada and Provinces, 1996

Table 6 **Life Expectancy (years) by age and sex, New Brunswick and Canada : 1996**

	AT BIRTH		60 YEARS	
	Male	**Female**	**Male**	**Female**
Canada	**75.7**	**81.4**	**16.1**	**19.9**
N.B.	**75.2**	**81.2**	**15.7**	**19.9**
Region 1	75.4	82.2	16.2	20.7
Region 2	74.7	80.3	15.3	19.2
Region 3	74.8	80.7	15.3	19.5
Region 4	73.0	80.6	15.1	19.5
Region 5	73.7	81.0	15.9	19.6
Region 6	75.7	82.4	16.2	20.9
Region 7	73.8	81.5	16.1	19.8

Source: Statistics Canada, Catalogue No. 82-221-XIE, Health Indicators, Canada and Provinces, 1996

NOTE TO TABLE 6

Data not available for 1 year, 20 years and 40 years. Life Expectancy calculations are only done around census years, and detailed Life Expectancy tables were not available at time of printing.

POTENTIAL YEARS OF LIFE LOST

NOTES TO TABLE 7A

Table 7a presents the potential years of life lost (PYLL) due to fifteen leading causes of death for males in the ten provinces and Canada during the period from 1994 – 1997.

- In New Brunswick and Canada as a whole, the four leading causes of PYLL in males were coronary heart disease, suicide, car accidents and lung cancer.
- PYLL due to all four leading causes of deaths was higher in New Brunswick males than in Canadian males.

NOTES TO TABLE 7B

Table 7b presents the potential years of life lost (PYLL) due to fifteen leading causes of deaths for females in the ten provinces and Canada during the period from 1994 – 1997.

- In females, the ranking of the four leading causes of PYLL differed between New Brunswick and Canada.
- In New Brunswick females, the four leading causes of PYLL were: breast cancer, coronary heart disease, lung cancer and car accidents.
- In Canadian females, the four leading causes of PYLL were breast cancer, lung cancer, coronary heart disease and perinatal mortality.
- PYLL due to coronary heart disease, lung cancer and car accidents were all higher in New Brunswick females than in Canadian females. PYLL due to breast cancer was higher for Canadian females than for New Brunswick females.

Table 7a PYLL rate, per 100,000 population, by leading causes of death, *MALES* under age 75, Canada, Provinces and Territories: 1994 - 1997

RANK (N.B.)	CAUSE	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	ALL CAUSES	7373	7533	7611	7392	7578	7831	6793	7876	8169	7390	7519
1	Coronory Heart Disease	942	1316	1152	1097	944	1046	925	1011	988	892	698
2	Suicide	725	455	607	644	823	1092	488	671	838	887	578
3	Motor Vehicle Traffic Accidents	549	390	877	637	612	593	426	598	757	696	608
4	Cancer of the Trachea, Bronchus & Lung	498	594	522	564	591	682	433	454	412	369	393
5	Perinatal Mortality	317	396	189	303	191	286	341	354	420	326	262
6	HIV	292	105	71	154	138	372	296	135	95	181	403
7	Congenital Anomalies	264	354	139	211	284	267	252	309	450	276	223
8	Cancer of the Colon & Rectum	186	224	205	214	201	201	190	184	178	158	150
9	Cerebrovascular disease	170	231	276	167	192	174	165	201	153	152	168
10	Cirrhosis and other Liver Diseases	142	114	69	107	111	128	165	120	150	138	135
11	Lymphoid Cancer	122	96	143	139	154	128	125	150	155	101	98
12	Cancer of the Brain	96	94	44	113	91	106	92	85	109	90	95
13	Homicide	92	44	45	92	82	93	77	136	148	113	103
14	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	90	120	93	100	118	121	75	76	77	85	72
15	Leukemias	84	66	95	76	75	90	87	84	87	87	71

Note 2: Due to a change in the population base used for standardization, the rates are not directly comparable to rates in previous reports.

Source: Statistics Canada, Health Statistics Division

Table 7b PYLL rate, per 100,000 population, by leading causes of death, *FEMALES* under age 75, Canada, Provinces and Territories: 1994 - 1997

RANK (N.B.)	CAUSE	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	ALL CAUSES	4109	4298	3901	4371	4059	4142	3901	4752	4672	4286	4016
1	Cancer of the Breast	348	355	325	357	338	358	352	367	307	358	315
2	Cancer of the Trachea, Bronchus & Lung	306	238	478	361	316	370	266	352	304	273	293
3	Coronory Heart Disease	277	438	252	339	324	303	273	308	269	275	190
4	Perinatal Mortality	263	315	295	240	217	243	263	315	328	268	267
5	Motor Vehicle Traffic Accidents	229	121	195	233	271	237	189	236	384	279	253
6	Congenital Anomalies	224	405	364	216	181	228	220	220	284	238	180
7	Suicide	182	70	120	122	129	273	136	164	191	233	138
8	Cerebrovascular Disease	135	150	129	130	113	141	129	183	154	142	119
9	Cancer of the Colon & Rectum	131	230	133	172	138	146	128	122	102	98	113
10	Cancer of the Ovary	83	74	62	83	85	80	85	94	87	80	83
11	Lymphoid Cancer	78	67	65	75	83	77	86	95	75	71	62
12	Cancer of the Brain	64	59	39	58	67	68	65	61	71	56	58
13	Cirrhosis and other Liver Diseases	62	35	12	52	45	48	65	73	103	69	78
14	Leukemias	58	77	27	78	46	60	58	63	71	58	50
15	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	54		33	70	75	65	48	40	58	53	46

Note 2: Due to a change in the population base used for standardization, the rates are not directly comparable to rates in previous reports.

Source: Statistics Canada, Health Statistics Division

Chapter 4

Mortality
In the Population

Highlights

The following section presents summary statistics arising from death events in New Brunswick from 1994 – 1998. Trends in mortality for the same period are also presented.

- The age-standardized mortality rate from all causes remained relatively stable in males but increased by 4.0% in females during the period 1991 – 1998 (Figure 14).

- Diseases of the circulatory system were the leading cause of death in New Brunswick.

- The four leading causes of death in New Brunswick in the 1994 – 1998 period were diseases of the circulatory system, neoplasms, respiratory system and external causes of injury and poisoning.

- Approximately 38.4% of all deaths were due to diseases of the circulatory system, followed by cancer that accounted for approximately 28.1% of all deaths.

- During the five-year period between 1994 and 1998, the percentage of deaths due to diseases of the circulatory system decreased by approximately 2.0%, while the percentage of deaths due to cancer increased by approximately 11.3%.

- Among males, ischemic heart disease (IHD) accounted for the largest proportion of all deaths during the 1994 – 1998 period, followed by cancer of the trachea, bronchus and lung, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cerebrovascular disease (CVD).

- Among females, ischemic heart disease (IHD) accounted for the largest proportion of all deaths during the 1994 – 1998 period, followed by cerebrovascular disease (CVD), cancer of the trachea, bronchus and lung and cancer of the breast.

NOTES TO FIGURE 14

Figure 14 shows the age-standardized mortality rate (ASMR), per 10,000 population, for all causes for males and females in New Brunswick during the period 1991 - 1998

- The ASMR for males remained relatively stable during the eight-year period examined, except for in 1997 where it dropped by approximately 7%.
- The ASMR for females showed an average increase of approximately 4.0% during the eight-year period.

Figure 14 Age-Standardized Mortality Rate, per 10,000 Population, for All Causes by Gender, New Brunswick: 1991 – 1998



Rates are age-standardized to the 1996 Canadian Population
Source: Statistics Canada, Catalogue No: 82-221-XD

NOTES TO TABLE 8

Table 8 presents the total number of deaths in the North, South and Province of New Brunswick, according to seventeen major disease classifications (ICD-9 Codes[2]), between 1994 – 1998.

- Consistent with earlier reported trends, the four leading causes of death in New Brunswick during the 1994 – 1998 period were, in rank order:

    1. diseases of the circulatory system;
    2. neoplasms;
    3. diseases of the respiratory system; and,
    4. external causes of injury and poisoning.

North and South:

- Diseases of the circulatory system accounted for a slightly higher percentage of deaths in the South (five-year average: 41%) than in the North (five-year average: 38%).

- Neoplasms and diseases of the respiratory system accounted for almost the same percentage of deaths in the North and South of the Province (i.e. 28% in the North and 27% in the South for neoplasms and 28% in the North and 27% in the South for respiratory diseases).

- External causes of injury and poisonings accounted for a slightly higher percentage of deaths in the South (five-year average: 7.0%) than in the North (five-year average: 5.9%) during the five-year period.

---

[2] **International Classification of Diseases, 1975**

Table 8 **Total Number of Deaths from Seventeen Major Disease Classifications (ICD-9 Codes) in North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

Diseases Classifications	Location	1994	1995	1996	1997	1998
Infections and Parasitic Diseases (001-139)	North	19	19	14	12	16
	South	27	46	43	33	34
	Province	46	65	57	45	50
Neoplasms (140-239)	North	482	458	523	500	536
	South	1104	1212	1123	1159	1229
	Province	1586	1670	1646	1659	1765
Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Immunity Disorders (240-279)	North	46	50	78	94	73
	South	130	142	149	154	170
	Province	176	192	227	248	243
Diseases of the Blood and Blood Forming Organs (280-289)	North	7	7	14	9	10
	South	18	12	16	14	17
	Province	25	19	30	23	27
Mental Disorders (290-319)	North	39	43	37	42	48
	South	80	89	94	99	140
	Province	119	132	131	141	188
Diseases of the Nervous System and Sense Organs (320-389)	North	51	54	43	50	55
	South	111	142	136	133	150
	Province	162	196	179	183	205
Diseases of the Circulatory System (390-459)	North	647	611	598	608	615
	South	1689	1664	1606	1642	1684
	Province	2336	2275	2204	2250	2299
Diseases of the Respiratory System (460-519)	North	166	121	138	145	167
	South	372	361	394	365	418
	Province	538	482	532	510	585
Diseases of the Digestive System (520-579)	North	61	48	46	51	73
	South	139	140	133	151	156
	Province	200	188	179	202	229
Diseases of the Genitourinary System (580-629)	North	29	31	30	35	38
	South	78	56	80	66	82
	Province	107	87	110	101	120
Complications of Pregnancy, Child-Birth and the Puerperium (630-676)	North	0	0	0	0	1
	South	0	2	0	0	1
	Province	0	2	0	0	2
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue (680-709)	North	0	2	1	0	3
	South	2	3	11	5	4
	Province	2	5	12	5	7
Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue (710-739)	North	10	15	7	7	12
	South	18	16	18	16	12
	Province	28	31	25	23	24
Congenital Anomalies (740-759)	North	5	4	5	4	4
	South	11	13	15	13	10
	Province	16	17	20	17	14
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period (760-779)	North	10	2	7	2	7
	South	10	9	4	14	17
	Province	20	11	11	16	24
Symptoms, Signs, and Ill Defined Conditions (780-799)	North	19	25	27	17	24
	South	70	76	102	75	81
	Province	89	107	129	92	105
Injury and Poisoning (800-999)	North	120	160	124	111	115
	South	243	231	204	238	228
	Province	363	391	328	349	343
TOTAL ALL CAUSES	North	1711	1650	1692	1687	1797
	South	4102	4214	4128	4177	4433
	Province	5813	5864	5820	5864	6230

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database 1994 – 1998)

Table 8 Total Number of Deaths from Seventeen Major Disease Classifications (ICD-9 Codes) in North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

Diseases Classifications	Location	1994	1995	1996	1997	1998
Infections and Parasitic Diseases (001-139)	North	19	19	14	12	16
	South	27	46	43	33	34
	Province	46	65	57	45	50
Neoplasms (140-239)	North	482	458	523	500	536
	South	1104	1212	1123	1159	1229
	Province	1586	1670	1646	1659	1765
Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Immunity Disorders (240-279)	North	46	50	78	94	73
	South	130	142	149	154	170
	Province	176	192	227	248	243
Diseases of the Blood and Blood Forming Organs (280-289)	North	7	7	14	9	10
	South	18	12	16	14	17
	Province	25	19	30	23	27
Mental Disorders (290-319)	North	39	43	37	42	48
	South	80	89	94	99	140
	Province	119	132	131	141	188
Diseases of the Nervous System and Sense Organs (320-389)	North	51	54	43	50	55
	South	111	142	136	133	150
	Province	162	196	179	183	205
Diseases of the Circulatory System (390-459)	North	647	611	598	608	615
	South	1689	1664	1606	1642	1684
	Province	2336	2275	2204	2250	2299
Diseases of the Respiratory System (460-519)	North	166	121	138	145	167
	South	372	361	394	365	418
	Province	538	482	532	510	585
Diseases of the Digestive System (520-579)	North	61	48	46	51	73
	South	139	140	133	151	156
	Province	200	188	179	202	229
Diseases of the Genitourinary System (580-629)	North	29	31	30	35	38
	South	78	56	80	66	82
	Province	107	87	110	101	120
Complications of Pregnancy, Child-Birth and the Puerperium (630-676)	North	0	0	0	0	1
	South	0	2	0	0	1
	Province	0	2	0	0	2
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue (680-709)	North	0	2	1	0	3
	South	2	3	11	5	4
	Province	2	5	12	5	7
Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue (710-739)	North	10	15	7	7	12
	South	18	16	18	16	12
	Province	28	31	25	23	24
Congenital Anomalies (740-759)	North	5	4	5	4	4
	South	11	13	15	13	10
	Province	16	17	20	17	14
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period (760-779)	North	10	2	7	2	7
	South	10	9	4	14	17
	Province	20	11	11	16	24
Symptoms, Signs, and Ill Defined Conditions (780-799)	North	19	25	27	17	24
	South	70	76	102	75	81
	Province	89	107	129	92	105
Injury and Poisoning (800-999)	North	120	160	124	111	115
	South	243	231	204	238	228
	Province	363	391	328	349	343
TOTAL ALL CAUSES	North	1711	1650	1692	1687	1797
	South	4102	4214	4128	4177	4433
	Province	5813	5864	5820	5864	6230

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database 1994 – 1998)

NOTES TO FIGURE 15

Figure 15 shows the average percentage of deaths due to leading causes of death for males and females in New Brunswick during the five-year period 1994 – 1998.

- Diseases of the circulatory system and neoplasms (cancer) accounted for approximately two-thirds (66%) of all deaths for both males and females.
- The largest difference between males and females was in the malignant neoplasms, which accounted for 34.4% of all deaths in males, but only 20% of all deaths in females.

Figure 15 Percentage of Deaths by Leading Causes and Gender: Five-Year Average, New Brunswick: 1994 – 1998



NOTES TO FIGURE 16

Figure 16 shows the percentage of deaths due to the four leading causes during the period 1994 – 1998.

- Over the five years, there was a consistent downward trend in the percentage of deaths due to diseases of the circulatory system and a slight increase in the percentage of deaths due to neoplasms.

- The percentage of deaths due to diseases of the respiratory system and injuries and poisonings remained relatively stable between 1994 and 1998.

Figure 16 Percentage of Deaths by Leading Causes: New Brunswick, 1994 – 1998



NOTES TO FIGURE 17

Figure 17 shows the percentage of deaths by the four leading causes for males and females during the period 1994 – 1998.

- With the exception of diseases of the circulatory system, there were no major differences in the trend for men and women.

- Among males, there was a gradual decline in the percentage of deaths due to diseases of the circulatory system during the period from 1994 – 1998. The percentage of deaths dropped from 36% to 33% for the males during 1994 – 1998. However, the percentages of deaths due to diseases of the circulatory system for females during the period 1994 – 1998 increased from 45% to 49%.

Figure 17 Percentage of Deaths by Leading Causes and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998.



LEADING CAUSES OF DEATH BY AGE AND GENDER

NOTES TO FIGURE 18

Figure 18 shows the average number of deaths per year by leading cause, gender and age group during the five-year period 1994 – 1998.

- In the 0 – 1 year age group, certain conditions originating in the perinatal period and congenital anomalies were the leading causes of death for males and females.
- In the 1 – 4 year age group, injury and poisoning followed by neoplasms were the leading cause of death for both genders.
- In the 5 – 14 year and 15 – 24 year age groups, the leading causes of death for males and females were injury and poisoning.
- In the 25 -- 44 year age group, the leading cause of death for males was injury and poisoning while the leading cause of death for females was malignant neoplasms.
- In the 45 – 64 year age group, the leading causes of death for males was malignant neoplasms, followed closely by diseases of the circulatory system. Similarly for females, the leading cause of death was malignant neoplasms, followed by diseases of the circulatory system.
- In the 65+ year age group, the leading causes of death for males and females were diseases of the circulatory system, followed by malignant neoplasms and diseases of the respiratory system.
- The distribution of leading causes of death within each age group in the present reporting period is consistent with trends noted in earlier Health Status Reports. Malignant neoplasms remained the leading cause of death among males in the 45 – 64 year age group.

Figure 18 **Average Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender in New Brunswick: 1994 – 1998**



Figure 18 (Continued) **Average Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender in New Brunswick: 1994 – 1998**





Figure 18 (Continued) **Average Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender in New Brunswick: 1994 -- 1998**





Figure 18 (Continued) **Average Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender in New Brunswick: 1994 – 1998**



NOTES TO TABLE 9

Table 9 provides a breakdown of the number of deaths by leading cause, gender a nd age group for each year between 1994 and 1998.

Table 9 Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 - 1998

0 – 1 Year

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Perinatal Conditions:											
. Respiratory Conditions	5	6	3	2	2	2	2	2	6	4	34
. Maternal Conditions & Complications of Labour	1	1	1	0	3	0	1	2	3	2	14
. Immaturity & Prematurity	1	3	0	3	0	0	0	2	4	1	14
Congenital Anomalies	4	4	5	4	4	3	5	1	4	3	37
Sudden Infant Death Syndrome	3	2	2	5	6	3	3	2	3	1	30
Infectious & Parasitic Diseases	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Injury & Poisoning	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
All Other Causes	0	4	4	1	3	3	4	4	5	1	29
Total Number of Deaths	16	20	16	15	18	12	16	15	26	12	166

1 – 4 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Injury & Poisoning	1	1	0	0	1	2	2	2	2	0	11
Neoplasms	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	6
Congenital Anomalies	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Digestive Diseases	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Respiratory System	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
All Other Causes	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Total Number of Deaths	5	3	3	1	2	2	5	2	3	3	29

NOTES TO TABLE 9

Table 9 provides a breakdown of the number of deaths by leading cause, gender a nd age group for each year between 1994 and 1998.

Table 9 Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 - 1998

0 – 1 Year

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Perinatal Conditions:											
. Respiratory Conditions	5	6	3	2	2	2	2	2	6	4	34
. Maternal Conditions & Complications of Labour	1	1	1	0	3	0	1	2	3	2	14
. Immaturity & Prematurity	1	3	0	3	0	0	0	2	4	1	14
Congenital Anomalies	4	4	5	4	4	3	5	1	4	3	37
Sudden Infant Death Syndrome	3	2	2	5	6	3	3	2	3	1	30
Infectious & Parasitic Diseases	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Injury & Poisoning	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
All Other Causes	0	4	4	1	3	3	4	4	5	1	29
Total Number of Deaths	16	20	16	15	18	12	16	15	26	12	166

1 – 4 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Injury & Poisoning	1	1	0	0	1	2	2	2	2	0	11
Neoplasms	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	6
Congenital Anomalies	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Digestive Diseases	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Respiratory System	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
All Other Causes	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Total Number of Deaths	5	3	3	1	2	2	5	2	3	3	29

Table 9 (Continued) **Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**

5 - 14 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Injury & Poisoning	5	1	11	1	6	3	6	3	5	1	42
Malignant Neoplasms	2	0	1	0	0	0	2	2	0	1	8
Disease of the Circulatory System	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Congenital Anomalies	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Respiratory Diseases	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
All Other Causes	1	0	0	0	2	2	0	0	0	2	7
Total Number of Deaths	10	2	13	1	8	6	9	5	5	5	64

15 - 24 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Injury & Poisoning	54	10	31	10	41	10	39	14	36	8	253
Malignant Neoplasms	0	2	4	0	5	1	4	3	5	1	25
Disease of the Circulatory System	2	2	0	2	0	3	0	1	1	0	11
Congenital Anomalies	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	5
Diseases of the Digestive System	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
All Other Causes	1	2	2	0	4	1	1	3	2	2	16
Total Number of Deaths	57	18	37	13	51	16	46	21	44	12	314

Table 9 (Continued) **Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**

25 - 44 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Injury & Poisoning	87	22	107	14	81	9	84	17	74	17	512
Malignant Neoplasms	20	42	25	37	21	37	32	28	19	36	297
Diseases of the Circulatory System	25	10	32	11	22	13	19	9	22	9	172
Diseases of the Digestive System	3	3	2	1	2	0	5	1	5	0	22
Respiratory Diseases	1	4	1	4	2	1	1	2	0	4	20
All Other Causes	7	9	9	5	13	7	14	15	11	9	99
Total Number of Deaths	143	90	176	72	141	67	157	72	131	75	1122

45 - 64 Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Malignant Neoplasms	204	185	245	171	214	181	224	162	211	178	1975
Disease of Circulatory System	178	58	202	52	174	81	172	59	169	63	1208
Injury & Poisoning	59	17	62	18	57	20	55	12	53	23	376
Respiratory Diseases	27	18	28	22	16	19	16	14	16	18	194
Diseases of Digestive System	21	11	28	12	23	2	22	15	18	12	167
All Other Causes	26	29	31	23	40	18	34	23	33	15	272
Total Number of Deaths	515	318	596	298	527	321	523	285	500	309	4192

Table 9 (Continued) **Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**

65+ Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Diseases of Circulatory System	976	1045	936	1004	917	968	889	1077	941	1041	9794
Malignant Neoplasms	620	485	669	486	637	511	640	525	731	540	5844
Respiratory Diseases	277	210	239	190	272	229	243	230	308	234	2432
Diseases of Digestive System	73	87	82	64	68	78	72	86	92	96	801
Injury & Poisoning	81	54	60	57	58	57	69	51	67	55	609
All Other Causes	220	291	229	326	228	342	220	300	280	392	2828
Total Number of Deaths	2247	2172	2215	2127	2180	2185	2133	2272	2419	2358	22308

Table 9 (Continued) **Number of Deaths by Leading Causes, Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**

65+ Years

LEADING CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		5-Yr. Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Diseases of Circulatory System	976	1045	936	1004	917	968	889	1077	941	1041	9794
Malignant Neoplasms	620	485	669	486	637	511	640	525	731	540	5844
Respiratory Diseases	277	210	239	190	272	229	243	230	308	234	2432
Diseases of Digestive System	73	87	82	64	68	78	72	86	92	96	801
Injury & Poisoning	81	54	60	57	58	57	69	51	67	55	609
All Other Causes	220	291	229	326	228	342	220	300	280	392	2828
Total Number of Deaths	2247	2172	2215	2127	2180	2185	2133	2272	2419	2358	22308

PROPORTIONAL MORTALITY RATIO & CRUDE MORTALITY RATE

NOTES TO FIGURE 19

Figure 19 shows the average proportional mortality rate (PMR) for leading causes of death in males and females in the North and South of the Province during the period 1994 – 1998.

- In **males**, the PMR for ischemic heart disease and cardiovascular disease was slightly higher in the South than in the North of the Province, while the PMR for malignant neoplasm of trachea, bronchus & lungs, COPD & allied conditions, suicide & self-inflicted injury, malignant neoplasms of prostate and motor vehicle accidents were slightly higher in the North.

- In **females**, the PMR for ischemic heart disease, cerebrovascular disease, malignant neoplasm of the breast, malignant neoplasm of the trachea, bronchus & lung, COPD & allied conditions and malignant neoplasms of colon were slightly higher in the South than in the North of the Province. The PMR for diabetes mellitus and malignant neoplams of pancreas was slightly higher in the North than in the South of the Province.

NOTES FOR TABLE 10

Table 10 shows the proportional mortality ratio (PMR) and the crude mortality rate (CMR), per 10,000 population, for selected diagnostic classes for males in the North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 – 1998.

- In males, ischemic heart disease (IHD) was responsible for the largest proportion of deaths during the five-year period.

- The second leading cause of death in males was malignant neoplasm of the trachea, bronchus and lung, followed by chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cerebrovascular disease.

NOTES FOR TABLE 11

Table 11 shows the proportional mortality ratio (PMR) and the crude mortality rate (CMR), per 10,000 population, for selected diagnostic classes for females in the North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 – 1998.

- In females, ischemic heart disease (IHD) was responsible for the largest proportion of deaths during the five-year period.

- The second leading cause of death in females was cerebrovascular disease, followed by malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung and malignant neoplasms of the breast.

Figure 19 **Average Proportional Mortality Ratio by Leading Causes of Death, Gender and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**

MALES



ICD-9 Codes

410-414	Ischemic Heart Disease	185	Malignant Neoplasms of Prostate
162	Malignant Neoplasms of Trachea, Bronchus and Lung	250	Diabetes Mellitus
		E950-959	Suicide & Self-inflicted Injury
430-438	Cerebrovascular Diseases	480-487	Pneumonia & Influenza
490-496	COPD & Allied Conditions	E810-819	Motor Vehicle Accidents

FEMALES



ICD-9 Codes

410-414	Ischemic Heart Disease	490-496	COPD & Allied Conditions
430-438	Cerebrovascular Heart Disease	480-487	Pneumonia & Influenza
174	Malignant Neoplasms of Breast	250	Diabetes Mellitus
162	Malignant Neoplasms of Trachea, Bronchus & Lung	153	Malignant Neoplasms of Colon
		157	Malignant Neoplasms of Pancreas

Table 10 **Crude Mortality Rate, per 10,000 Population, and Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for *MALES* in North, South and Province of New Brunswick: 1994 –1998**

		Total Number of Deaths					Crude Mortality Rate (CMR) Per 10,000 Population					Proportional Mortality Ratio in % (PMR)				
Selected Diagnostic Classes	**Location**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Malignant Neoplasms of	South	15	15	24	15	20	0.59	0.58	0.93	0.58	0.77	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
Stomach	North	11	17	23	14	18	0.95	1.48	2.01	1.23	1.59	0.6	1.0	1.4	0.8	1.0
(ICD-9: 151)	Province	26	32	47	29	38	0.70	0.86	1.26	0.78	1.02	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6
Malignant Neoplasm of Colon	South	39	46	44	42	33	1.52	1.79	1.70	1.61	1.27	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7
(ICD-9: 153)	North	13	17	18	17	19	1.12	1.48	1.57	1.50	1.68	0.8	1.0	1.4	0.8	1.1
	Province	52	63	62	59	52	1.40	1.69	1.66	1.58	1.39	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8
Malignant Neoplasm of	South	30	40	20	19	34	1.17	1.55	0.77	0.73	1.30	0.7	0.9	0.5	0.5	0.8
Pancreas	North	9	16	20	14	13	0.78	1.39	1.75	1.23	1.15	0.5	1.0	1.2	0.8	0.7
(ICD-9: 157)	Province	39	56	40	33	47	1.05	1.50	1.07	0.88	1.26	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8
Malignant Neoplasm of	South	214	210	209	213	223	8.36	8.16	8.08	8.18	8.55	5.2	5.0	5.1	5.1	5.0
Trachea, Bronchus & Lung	North	111	86	97	107	106	9.60	7.47	8.48	9.43	9.37	6.5	5.2	5.7	6.3	5.9
(ICD-9: 162)	Province	325	296	306	320	329	8.74	7.94	8.20	8.56	8.80	5.6	5.0	5.3	5.5	5.3
Malignant Neoplasm of	South	69	69	72	70	90	2.69	2.68	2.78	2.69	3.45	1.7	1.6	1.7	1.7	2.0
Prostate	North	32	32	22	33	41	2.77	2.78	1.92	2.91	3.62	1.9	1.9	1.3	2.0	2.3
(ICD-9: 174-175)	Province	101	101	94	103	131	2.72	2.71	2.52	2.76	3.50	1.7	1.7	1.6	1.8	2.1
Diabetes Mellitus	South	50	49	61	69	67	1.95	1.90	2.36	2.65	3.45	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5
(ICD-9: 250)	North	13	19	31	29	31	1.12	1.65	2.71	2.56	2.74	0.8	1.2	1.8	1.7	1.7
	Province	63	68	92	98	98	1.69	1.83	2.47	2.62	2.62	1.1	1.2	1.6	1.8	2.1
Ischemic Heart Disease	South	483	453	415	431	471	18.86	17.60	16.04	16.56	18.07	11.8	10.7	10.1	10.3	10.6
(ICD-9: 410-414)	North	175	176	171	151	180	15.13	15.28	14.94	13.31	15.91	10.2	10.7	10.1	9.0	10.0
	Province	658	629	596	582	651	17.70	16.88	15.71	15.57	17.41	11.3	10.7	10.1	9.9	10.4
Cerebrovascular Disease	South	126	149	132	122	125	4.92	5.79	5.10	4.69	4.79	3.1	3.5	3.2	2.9	2.8
(ICD-9: 430-438)	North	46	49	47	51	47	3.98	4.25	4.11	4.49	4.15	2.7	3.0	2.8	3.0	2.6
	Province	172	198	179	173	172	4.63	5.31	4.80	4.63	4.60	3.0	3.4	3.1	3.0	2.8
Pneumonia and influenza	South	55	48	51	64	62	2.15	1.86	1.97	2.46	2.38	1.3	1.1	1.2	1.5	1.4
(ICD-9: 480-487)	North	22	13	15	16	27	1.90	1.13	1.31	1.41	2.39	1.3	0.8	0.9	0.9	1.5
	Province	77	61	66	80	89	2.07	1.64	1.77	2.14	2.38	1.3	1.0	1.1	1.4	1.4
Chronic Obstructive Pulmonary	South	130	122	139	99	133	5.08	4.74	5.37	3.80	5.10	3.2	2.9	3.4	2.4	3.0
Disease and Allied Condition	North	73	50	48	52	71	6.31	4.34	4.19	4.58	6.27	4.3	3.0	2.8	3.1	4.0
(ICD-9: 490-496)	Province	203	172	187	151	204	5.46	4.62	5.01	4.04	5.46	3.5	2.9	3.2	2.6	3.3
Chronic Liver Disease	South	22	18	16	15	21	0.86	0.70	0.62	0.58	0.81	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
and Cirrhosis	North	9	13	7	9	9	0.78	1.13	0.61	0.79	0.80	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5
(ICD-9: 571)	Province	31	31	23	24	30	0.83	0.83	0.62	0.64	0.80	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
Motor Vehicle Accidents	South	36	40	36	42	42	1.41	1.55	1.39	1.61	1.61	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
(Traffic)	North	17	25	17	20	12	1.47	2.17	1.49	1.76	1.06	1.0	1.5	1.0	1.2	0.7
(ICD-9: E810-E819)	Province	53	65	53	62	54	1.43	1.74	1.42	1.66	1.44	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9
Suicide and Self-Inflicted	South	48	57	43	51	56	1.87	2.21	1.66	1.96	2.15	1.2	1.4	1.0	1.2	1.3
Injury	North	38	51	35	27	32	3.29	4.43	3.06	2.38	2.83	2.2	3.1	2.1	1.6	1.8
(ICD-9: E950-E959)	Province	86	108	78	78	88	2.31	2.90	2.09	2.09	2.35	1.5	1.8	1.3	1.3	1.4

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

Table 10 Crude Mortality Rate, per 10,000 Population, and Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for *MALES* in North, South and Province of New Brunswick: 1994 –1998

		Total Number of Deaths					Crude Mortality Rate (CMR) Per 10,000 Population					Proportional Mortality Ratio in % (PMR)				
Selected Diagnostic Classes	**Location**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Malignant Neoplasms of	South	15	15	24	15	20	0.59	0.58	0.93	0.58	0.77	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
Stomach	North	11	17	23	14	18	0.95	1.48	2.01	1.23	1.59	0.6	1.0	1.4	0.8	1.0
(ICD-9: 151)	Province	26	32	47	29	38	0.70	0.86	1.26	0.78	1.02	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6
Malignant Neoplasm of Colon	South	39	46	44	42	33	1.52	1.79	1.70	1.61	1.27	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7
(ICD-9: 153)	North	13	17	18	17	19	1.12	1.48	1.57	1.50	1.68	0.8	1.0	1.4	0.8	1.1
	Province	52	63	62	59	52	1.40	1.69	1.66	1.58	1.39	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8
Malignant Neoplasm of	South	30	40	20	19	34	1.17	1.55	0.77	0.73	1.30	0.7	0.9	0.5	0.5	0.8
Pancreas	North	9	16	20	14	13	0.78	1.39	1.75	1.23	1.15	0.5	1.0	1.2	0.8	0.7
(ICD-9: 157)	Province	39	56	40	33	47	1.05	1.50	1.07	0.88	1.26	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8
Malignant Neoplasm of	South	214	210	209	213	223	8.36	8.16	8.08	8.18	8.55	5.2	5.0	5.1	5.1	5.0
Tracheas, Bronchus & Lung	North	111	86	97	107	106	9.60	7.47	8.48	9.43	9.37	6.5	5.2	5.7	6.3	5.9
(ICD-9: 162)	Province	325	296	306	320	329	8.74	7.94	8.20	8.56	8.80	5.6	5.0	5.3	5.5	5.3
Malignant Neoplasm of	South	69	69	72	70	90	2.69	2.68	2.78	2.69	3.45	1.7	1.6	1.7	1.7	2.0
Prostate	North	32	32	22	33	41	2.77	2.78	1.92	2.91	3.62	1.9	1.9	1.3	2.0	2.3
(ICD-9: 174-175)	Province	101	101	94	103	131	2.72	2.71	2.52	2.76	3.50	1.7	1.7	1.6	1.8	2.1
Diabetes Mellitus	South	50	49	61	69	67	1.95	1.90	2.36	2.65	3.45	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5
(ICD-9: 250)	North	13	19	31	29	31	1.12	1.65	2.71	2.56	2.74	0.8	1.2	1.8	1.7	1.7
	Province	63	68	92	98	98	1.69	1.83	2.47	2.62	2.62	1.1	1.2	1.6	1.8	2.1
Ischemic Heart Disease	South	483	453	415	431	471	18.86	17.60	16.04	16.56	18.07	11.8	10.7	10.1	10.3	10.6
(ICD-9: 410-414)	North	175	176	171	151	180	15.13	15.28	14.94	13.31	15.91	10.2	10.7	10.1	9.0	10.0
	Province	658	629	596	582	651	17.70	16.88	15.71	15.57	17.41	11.3	10.7	10.1	9.9	10.4
Cerebrovascular Disease	South	126	149	132	122	125	4.92	5.79	5.10	4.69	4.79	3.1	3.5	3.2	2.9	2.8
(ICD-9: 430-438)	North	46	49	47	51	47	3.98	4.25	4.11	4.49	4.15	2.7	3.0	2.8	3.0	2.6
	Province	172	198	179	173	172	4.63	5.31	4.80	4.63	4.60	3.0	3.4	3.1	3.0	2.8
Pneumonia and influenza	South	55	48	51	64	62	2.15	1.86	1.97	2.46	2.38	1.3	1.1	1.2	1.5	1.4
(ICD-9: 480-487)	North	22	13	15	16	27	1.98	1.13	1.31	1.41	2.39	1.3	0.8	0.9	0.9	1.5
	Province	77	61	66	80	89	2.07	1.64	1.77	2.14	2.38	1.3	1.0	1.1	1.4	1.4
Chronic Obstructive Pulmonary	South	130	122	139	99	133	5.08	4.74	5.37	3.80	5.10	3.2	2.9	3.4	2.4	3.0
Disease and Allied Condition	North	73	50	48	52	71	6.31	4.34	4.19	4.58	6.27	4.3	3.0	2.8	3.1	4.0
(ICD-9: 490-496)	Province	203	172	187	151	204	5.46	4.62	5.01	4.04	5.46	3.5	2.9	3.2	2.6	3.3
Chronic Liver Disease	South	22	18	16	15	21	0.86	0.70	0.62	0.58	0.81	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
and Cirrhosis	North	9	13	7	9	9	0.78	1.13	0.61	0.79	0.80	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5
(ICD-9: 571)	Province	31	31	23	24	30	0.83	0.83	0.62	0.64	0.80	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
Motor Vehicle Accidents	South	36	40	36	42	42	1.41	1.55	1.39	1.61	1.61	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
(Traffic)	North	17	25	17	20	12	1.47	2.17	1.49	1.76	1.06	1.0	1.5	1.0	1.2	0.7
(ICD-9: E810-E819)	Province	53	65	53	62	54	1.43	1.74	1.42	1.66	1.44	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9
Suicide and Self-Inflicted	South	48	57	43	51	56	1.87	2.21	1.66	1.96	2.15	1.2	1.4	1.0	1.2	1.3
Injury	North	38	51	35	27	32	3.29	4.43	3.06	2.38	2.83	2.2	3.1	2.1	1.6	1.8
(ICD-9: E950-E959)	Province	86	108	78	78	88	2.31	2.90	2.09	2.09	2.35	1.5	1.8	1.3	1.3	1.4

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998)

Table 11 Crude Mortality Rate, per 10,000 Population, and Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for *FEMALES* in North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998

		Total Number of Deaths					Crude Mortality Rate (CMR) Per 10,000 Population					Proportional Mortality Ratio in % (PMR)				
Selected Diagnostic Classes	**Location**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Malignant Neoplasms of	South	18	17	10	9	7	0.68	0.64	0.38	0.34	0.26	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
Stomach	North	7	9	12	7	9	0.61	0.79	1.05	0.62	0.79	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
(ICD-9: 151)	Province	25	26	22	16	16	0.66	0.69	0.58	0.42	0.42	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Malignant Neoplasm of Colon	South	43	36	39	44	47	1.64	1.37	1.47	1.66	1.76	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1
(ICD-9: 153)	North	12	8	12	16	13	1.04	0.70	1.05	1.41	1.15	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7
	Province	55	44	51	60	60	1.46	1.00	1.35	1.58	1.58	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0
Malignant Neoplasm of	South	41	27	27	33	28	1.56	1.02	1.02	1.24	1.05	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6
Pancreas	North	15	11	16	14	11	1.30	0.96	1.41	1.23	0.97	0.9	0.7	0.9	0.8	0.6
(ICD-9: 157)	Province	56	38	43	47	39	1.48	1.00	1.14	1.24	1.03	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6
Malignant Neoplasm of	South	100	111	109	101	125	3.81	4.21	4.12	3.80	4.69	2.4	2.6	2.6	2.4	2.8
Tracheas, Bronchus & Lung	North	41	30	40	33	42	3.57	2.62	3.51	2.91	3.71	2.4	1.8	2.4	2.0	2.3
(ICD-9: 162)	Province	141	141	149	134	167	3.73	3.73	3.93	3.53	4.39	2.0	2.4	2.6	2.0	2.4
Malignant Neoplasm of	South	81	105	100	87	109	3.08	3.98	3.78	3.27	4.09	2.0	2.3	2.4	2.1	2.5
Breast	North	38	28	49	32	39	3.31	2.44	4.30	2.82	3.44	2.2	1.8	2.4	2.0	2.3
(ICD-9: 174-175)	Province	119	133	149	119	148	3.15	3.52	3.93	3.14	3.89	2.0	2.4	2.6	2.3	2.7
Diabetes Mellitus	South	59	63	61	57	69	2.24	2.39	2.30	2.14	2.59	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6
(ICD-9: 250)	North	20	21	35	50	28	1.74	1.83	3.07	4.41	2.47	1.2	1.3	2.1	3.0	1.6
	Province	79	84	96	107	97	2.09	2.22	2.54	2.82	2.55	1.4	1.4	1.6	1.8	1.6
Ischemic Heart Disease	South	386	384	381	395	366	14.69	14.56	14.39	14.86	13.72	9.4	9.1	9.2	9.5	8.3
(ICD-9: 410-414)	North	126	108	124	148	129	10.96	9.42	10.89	13.04	11.39	7.4	6.5	7.3	8.8	7.2
	Province	512	492	505	543	495	13.55	13.00	13.34	14.32	13.02	8.8	8.4	8.7	9.3	7.9
Cerebrovascular Disease	South	208	182	168	211	208	7.91	6.90	6.34	7.94	7.80	5.1	4.3	4.1	5.1	4.7
(ICD-9: 430-438)	North	54	57	49	58	68	4.70	4.97	4.30	5.11	6.00	3.2	3.5	2.9	3.4	3.8
	Province	262	239	217	269	276	6.94	6.32	5.73	7.09	7.26	4.5	4.1	3.7	4.6	4.4
Pneumonia and influenza	South	72	65	78	67	89	2.74	2.46	2.95	2.52	3.34	1.8	1.5	1.9	1.6	2.0
(ICD-9: 480-487)	North	35	15	24	21	22	3.04	1.31	2.11	1.85	1.94	1.3	1.3	2.1	1.8	1.6
	Province	107	80	102	88	111	2.83	2.11	2.69	2.32	2.92	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9
Chronic Obstructive Pulmonary	South	79	79	79	89	89	3.01	3.00	2.95	3.35	3.34	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0
Disease and Allied Condition	North	23	22	36	30	29	3.04	1.31	3.16	2.64	2.56	1.3	1.3	2.1	1.8	1.6
(ICD-9: 490-496)	Province	102	98	115	119	118	2.70	2.67	3.04	3.14	3.10	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9
Chronic Liver Disease	South	16	8	6	10	9	0.61	0.30	0.23	0.38	0.34	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2
and Cirrhosis	North	3	1	2	3	9	0.26	0.09	0.18	0.26	0.79	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5
(ICD-9: 571)	Province	19	9	8	13	18	0.50	0.24	0.21	0.34	0.47	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3
Motor Vehicle Accidents	South	11	22	15	28	12	0.42	0.83	0.57	1.05	0.45	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3
(Traffic)	North	6	6	11	6	9	0.52	0.52	0.97	0.53	0.79	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
(ICD-9: E810-E819)	Province	17	28	26	34	21	0.45	0.74	0.69	0.90	0.55	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3
Suicide and Self-Inflicted	South	13	5	6	7	17	0.49	0.19	0.23	0.26	0.64	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
Injury	North	6	8	8	2	1	0.52	0.70	0.70	0.18	0.09	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1
(ICD-9: E950-E959)	Province	19	13	14	9	18	0.50	0.34	0.37	0.24	0.47	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998).

Table 11 **Crude Mortality Rate, per 10,000 Population, and Proportional Mortality Ratio by Selected Diagnostic Classes for *FEMALES* in North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

		Total Number of Deaths					Crude Mortality Rate (CMR) Per 10,000 Population					Proportional Mortality Ratio in % (PMR)				
Selected Diagnostic Classes	**Location**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Malignant Neoplasms of Stomach (ICD-9: 151)	South	18	17	10	9	7	0.68	0.64	0.38	0.34	0.26	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
	North	7	9	12	7	9	0.61	0.79	1.05	0.62	0.79	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
	Province	25	26	22	16	16	0.66	0.69	0.58	0.42	0.42	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Malignant Neoplasm of Colon (ICD-9: 153)	South	43	36	39	44	47	1.64	1.37	1.47	1.66	1.76	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1
	North	12	8	12	16	13	1.04	0.70	1.05	1.41	1.15	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7
	Province	55	44	51	60	60	1.46	1.00	1.35	1.58	1.58	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0
Malignant Neoplasm of Pancreas (ICD-9: 157)	South	41	27	27	33	28	1.56	1.02	1.02	1.24	1.05	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6
	North	15	11	16	14	11	1.30	0.96	1.41	1.23	0.97	0.9	0.7	0.9	0.8	0.6
	Province	56	38	43	47	39	1.48	1.00	1.14	1.24	1.03	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6
Malignant Neoplasm of Tracheas, Bronchus & Lung (ICD-9: 162)	South	100	111	109	101	125	3.81	4.21	4.12	3.80	4.69	2.4	2.6	2.6	2.4	2.8
	North	41	30	40	33	42	3.57	2.62	3.51	2.91	3.71	2.4	1.8	2.4	2.0	2.3
	Province	141	141	149	134	167	3.73	3.73	3.93	3.53	4.39	2.0	2.4	2.6	2.0	2.4
Malignant Neoplasm of Breast (ICD-9: 174-175)	South	81	105	100	87	109	3.08	3.98	3.78	3.27	4.09	2.0	2.3	2.4	2.1	2.5
	North	38	28	49	32	39	3.31	2.44	4.30	2.82	3.44	2.2	1.8	2.4	2.0	2.3
	Province	119	133	149	119	148	3.15	3.52	3.93	3.14	3.89	2.0	2.4	2.6	2.3	2.7
Diabetes Mellitus (ICD-9: 250)	South	59	63	61	57	69	2.24	2.39	2.30	2.14	2.59	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6
	North	20	21	35	50	28	1.74	1.83	3.07	4.41	2.47	1.2	1.3	2.1	3.0	1.6
	Province	79	84	96	107	97	2.09	2.22	2.54	2.82	2.55	1.4	1.4	1.6	1.8	1.6
Ischemic Heart Disease (ICD-9: 410-414)	South	386	384	381	395	366	14.69	14.56	14.39	14.86	13.72	9.4	9.1	9.2	9.5	8.3
	North	126	108	124	148	129	10.96	9.42	10.89	13.04	11.39	7.4	6.5	7.3	8.8	7.2
	Province	512	492	505	543	495	13.55	13.00	13.34	14.32	13.02	8.8	8.4	8.7	9.3	7.9
Cerebrovascular Disease (ICD-9: 430-438)	South	208	182	168	211	208	7.91	6.90	6.34	7.94	7.80	5.1	4.3	4.1	5.1	4.7
	North	54	57	49	58	68	4.70	4.97	4.30	5.11	6.00	3.2	3.5	2.9	3.4	3.8
	Province	262	239	217	269	276	6.94	6.32	5.73	7.09	7.26	4.5	4.1	3.7	4.6	4.4
Pneumonia and influenza (ICD-9: 480-487)	South	72	65	78	67	89	2.74	2.46	2.95	2.52	3.34	1.8	1.5	1.9	1.6	2.0
	North	35	15	24	21	22	3.04	1.31	2.11	1.85	1.94	1.3	1.3	2.1	1.8	1.6
	Province	107	80	102	88	111	2.83	2.11	2.69	2.32	2.92	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9
Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Allied Condition (ICD-9: 490-496)	South	79	79	79	89	89	3.01	3.00	2.95	3.35	3.34	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0
	North	23	22	36	30	29	3.04	1.31	3.16	2.64	2.56	1.3	1.3	2.1	1.8	1.6
	Province	102	98	115	119	118	2.70	2.67	3.04	3.14	3.10	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9
Chronic Liver Disease and Cirrhosis (ICD-9: 571)	South	16	8	6	10	9	0.61	0.30	0.23	0.38	0.34	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2
	North	3	1	2	3	9	0.26	0.09	0.18	0.26	0.79	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5
	Province	19	9	8	13	18	0.50	0.24	0.21	0.34	0.47	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3
Motor Vehicle Accidents (Traffic) (ICD-9: E810-E819)	South	11	22	15	28	12	0.42	0.83	0.57	1.05	0.45	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3
	North	6	6	11	6	9	0.52	0.52	0.97	0.53	0.79	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	Province	17	28	26	34	21	0.45	0.74	0.69	0.90	0.55	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3
Suicide and Self-Inflicted Injury (ICD-9: E950-E959)	South	13	5	6	7	17	0.49	0.19	0.23	0.26	0.64	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
	North	6	8	8	2	1	0.52	0.70	0.70	0.18	0.09	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1
	Province	19	13	14	9	18	0.50	0.34	0.37	0.24	0.47	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994 – 1998).

NOTES TO FIGURE 20

Figure 20 Shows the average percentage of deaths due to the two leading diagnostic categories in the diseases of the circulatory system (i.e. ischemic heart disease and cerebrovascular disease) for males and females during the period 1994 – 1998.

- The percentage of deaths due to ischemic heart disease (IHD), was approximately 8% higher in males than females, and the percentage of deaths due to cerebrovascular disease (CVD) was approximately 7% higher in females than in males.

Figure 20 **Average Percentage of Deaths due to Diseases of the Circulatory System, by Leading Diagnostic Classes, Males and Females: New Brunswick: 1994 – 1998**



NOTES TO FIGURE 21

Figure 21 shows the annual age-standardized mortality rates (ASMR), per 10,000 population, for ischemic heart disease for males and females in New Brunswick during the five-year period between 1994 - 1998.

- During the period 1994 to 1998, the age-standardized mortality rates (ASMR), per 10,000, for ischemic heart disease for males showed a steady decline until 1997, then a slight increase in 1998. In females, the ischemic heart disease rates were fairly consistent with a slight increase in 1997, then a decline in 1998.

- The ASMR for ischemic heart disease was consistently higher for males than for females in each of the five years examined.

Figure 21 Age-Standardized Mortality Rate for Ischemic Heart Disease by Gender, New Brunswick: 1994 - 1998



NOTES TO TABLE 12

Table 12 shows the mortality rates (ASMR), per 10,000 population, for ischemic heart disease for males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 - 1998.

Table 12 ***ISCHEMIC HEART DISEASE*** **Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex and Age Group in seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

		35-64										65+										All Ages									
		Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number of Deaths					Age-Standardized Mortality Rate				
Location	Sex	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
Region I	M	18	27	21	17	20	5.3	7.8	5.9	4.7	5.4	101	101	91	88	112	101.6	100.9	89.7	85.1	106.7	119	128	112	106	132	12.3	13.1	11.3	10.5	12.8
	F	8	9	8	4	7	2.4	2.6	2.3	1.1	1.9	106	105	106	107	100	77.6	76.2	75.7	74.9	68.3	115	114	114	111	107	11.5	11.3	11.1	10.6	10.0
Region II	M	44	39	33	47	32	14.0	12.2	10.1	14.2	9.5	160	156	136	131	145	168.0	163.8	141.8	135.0	148.5	206	195	169	178	177	22.4	21.1	18.1	18.8	18.6
	F	10	10	25	18	10	3.1	3.1	7.5	5.3	2.9	144	158	132	151	145	103.7	113.1	94.5	107.0	102.6	154	168	157	169	155	15.3	16.5	15.5	16.5	15.0
Region III	M	31	33	26	32	36	10.6	11.0	8.5	10.2	11.2	127	96	107	115	125	154.3	115.8	127.5	134.9	144.3	158	130	134	147	162	19.6	15.9	16.2	17.4	18.9
	F	5	9	13	7	12	1.7	3.0	4.3	2.2	3.7	112	93	97	108	92	100.4	82.7	85.4	93.9	79.0	117	102	110	115	104	14.3	12.3	13.1	13.6	12.1
Region IV	M	7	9	11	6	13	6.9	8.7	10.3	5.5	11.7	30	30	33	30	36	112.7	111.9	121.7	108.5	127.9	37	39	44	36	49	14.0	14.5	16.1	13.1	17.2
	F	3	3	3	7	5	3.0	2.9	2.8	6.4	4.5	27	15	28	28	20	73.1	40.6	74.4	73.2	51.3	30	18	31	35	25	11.0	6.5	11.1	12.2	8.6
Region V	M	8	6	6	8	1	12.6	9.3	9.2	12.1	1.5	23	19	23	14	21	128.9	105.3	126.1	75.4	111.3	31	25	29	22	22	17.6	14.1	16.2	11.9	12.0
	F	1	2	2	1	0	1.6	3.1	3.0	1.5	0.0	16	21	12	22	17	65.2	83.6	46.8	84.2	64.3	17	23	15	23	17	9.5	12.5	8.1	12.0	8.8
Region VI	M	16	11	9	11	14	9.3	6.2	5.0	6.0	7.5	57	49	44	38	42	131.5	111.6	99.3	84.1	91.1	74	60	53	49	56	17.0	13.6	11.9	10.7	12.0
	F	5	3	7	2	4	3.0	1.8	4.0	1.1	2.2	28	26	36	38	42	53.4	48.4	65.6	68.0	74.4	33	29	43	40	46	8.3	7.2	10.3	9.7	10.9
Region VII	M	6	12	13	11	8	6.4	12.8	13.7	11.4	8.2	27	40	42	33	45	104.3	151.5	157.4	121.3	164.7	33	52	55	44	53	13.0	20.0	20.9	16.4	19.8
	F	2	1	1	1	2	2.3	1.1	1.1	1.1	2.1	44	37	33	49	39	130.3	107.9	95.4	139.4	110.6	46	38	35	50	41	18.6	15.2	13.9	19.5	15.9
North	M	37	38	39	36	36	8.6	8.7	8.7	7.9	7.8	137	138	142	115	144	120.5	119.8	122.0	96.9	119.5	175	176	181	151	180	15.5	15.3	15.6	12.7	15.0
	F	11	9	13	11	11	2.6	2.1	3.0	2.4	2.4	115	99	109	137	118	77.9	66.0	71.4	88.2	75.1	126	108	124	148	129	11.6	9.7	11.0	12.9	11.1
South	M	93	99	80	96	88	9.9	10.3	8.1	9.5	8.6	388	353	334	334	382	140.1	126.8	118.7	116.9	132.1	483	453	415	431	471	17.9	16.7	15.1	15.4	16.6
	F	23	28	46	29	29	2.4	2.9	4.6	2.9	2.8	362	356	335	366	337	93.5	91.3	85.2	91.8	83.4	386	384	381	395	366	13.7	13.5	13.2	13.5	12.4
NB	M	130	137	119	132	124	9.5	9.8	8.3	9.0	8.3	525	491	476	449	526	134.4	124.8	119.7	111.0	128.4	658	629	596	582	651	17.2	16.3	15.2	14.6	16.1
	F	34	37	59	40	40	2.5	2.6	4.1	2.7	2.7	477	455	444	503	455	89.2	84.3	81.3	90.7	81.1	512	492	505	543	495	13.1	12.4	12.6	13.4	12.0

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994-1998).

NOTES TO FIGURE 22

Figure 22 shows the average Age-Specific Mortality Rates for ischemic heart disease in two age groups for males and females in the seven Health Regions, North, South and province of New Brunswick during the period 1994 - 1998.

35-64 year age group

- Region I males and females are significantly lower than the provincial average.
- Region II males and females are significantly higher than the provincial average.
- Region VI males are significantly lower than the provincial average.
- There were no statistically significant differences between the average ASMRs in the North versus the South for neither males nor females.

65+ year age group

- Region I and VI males are significantly lower than the provincial average.
- Region I, IV, V and VI females are significantly lower than the provincial average.
- Region II and III males are significantly higher than the provincial average.
- Region II and VII females are significantly higher than the provincial average.
- The average ASMRs for both males and females were significantly lower in the North versus the South.

Gender

- The average ASMRs for males in the 35-64 year age group were significantly higher than for females in all regions, as well as the North, the South and in the Province overall.
- The average ASMRs for males in the 65+ year age group were significantly higher than for females in all regions, except for Region VII, as well as the North, the South and in the Province overall.

Figure 22 **Average Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for Ischemic Heart Disease by Area, Gender and Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998**





CEREBROVASCULAR DISEASE

NOTES TO FIGURE 23

Figure 23 shows the annual age-standardized mortality rates (ASMR), per 10,000 population, for cerebrovascular disease for males and females in New Brunswick during the five-year period 1994 - 1998.

- In **females**, there was steady decline from 1994 to 1996, but then increased in 1997 and then stayed relatively stable for the next year.
- In **males**, the annual ASMR remained relatively stable over the five-year period.
- The annual ASMRs were consistently higher for females than for males during the five years examined.

Figure 23 **Age-Standardized Mortality Rate, per 10,000 Population, for Cerebrovascular Disease by Gender, New Brunswick: 1994- 1998**



NOTES TO TABLE 13

Table 13 presents the mortality rates, per 10,000 population, for cerebrovascular disease for males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998.

Table 13 ***CEREBROVASCULAR DISEASE*** **Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex and Age Group in seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

		35-64										65+										All Ages									
		Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number Of Deaths					Age-Standardized Mortality Rate				
Location	Sex	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
Region I	M	11	6	5	2	4	3.3	1.7	1.4	0.6	1.1	38	52	41	36	41	38.2	51.9	40.4	34.8	39.1	49	59	46	38	45	5.1	6.1	4.6	3.8	4.4
	F	4	2	5	5	2	1.2	0.6	1.4	1.4	0.5	66	68	54	77	84	48.3	49.4	38.6	53.9	57.4	70	72	59	82	86	7.0	7.2	5.8	7.9	8.0
Region II	M	8	9	5	6	3	2.5	2.8	1.5	1.8	0.9	32	39	43	46	38	33.6	40.9	44.8	47.4	38.9	42	50	49	52	41	4.6	5.4	5.3	5.5	4.3
	F	6	2	3	2	6	1.9	0.6	0.9	0.6	1.7	73	56	58	64	51	52.6	40.1	41.5	45.4	36.1	80	58	61	66	58	8.0	5.7	6.0	6.4	5.7
Region III	M	5	4	2	1	4	1.7	1.3	0.7	0.3	1.2	30	36	34	31	35	36.5	43.4	40.5	36.4	40.4	35	40	37	32	39	4.3	4.9	4.5	3.9	4.6
	F	2	1	1	2	2	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	56	51	47	61	62	50.2	45.3	41.4	53.1	53.2	58	52	48	63	64	7.1	6.3	5.8	7.5	7.5
Region IV	M	2	1	3	0	0	2.0	1.0	2.8	0.0	0.0	10	13	16	11	12	37.6	48.5	59.0	39.8	42.6	12	14	20	11	12	4.6	5.3	7.4	4.1	4.4
	F	2	1	1	1	1	2.0	1.0	0.9	0.9	0.9	17	15	13	15	14	46.0	40.6	34.5	39.2	35.9	19	16	14	16	15	7.0	5.9	5.0	5.7	5.2
Region V	M	0	0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	6	7	2	7	10	33.6	38.8	11.0	37.7	53.0	6	7	2	8	10	3.5	4.0	1.1	4.4	5.5
	F	0	1	0	0	0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	8	6	9	6	15	32.6	23.9	35.1	23.0	56.8	8	7	9	6	15	4.5	3.8	4.8	3.1	7.8
Region VI	M	0	1	0	4	2	0.0	0.6	0.0	2.2	1.1	19	17	19	14	13	43.8	38.7	42.9	31.0	28.2	19	18	19	18	15	4.5	4.2	4.4	3.9	3.3
	F	0	1	1	1	0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	17	22	14	20	20	32.4	41.0	25.5	35.8	35.4	17	23	15	21	20	4.4	5.8	3.7	5.1	4.9
Region VII	M	2	2	3	1	0	2.1	2.1	3.2	1.0	0.0	7	8	3	13	10	27.0	30.3	11.2	47.8	36.6	9	10	6	14	10	3.5	3.9	2.2	5.3	3.8
	F	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	11	11	15	18	29.6	32.1	31.8	42.7	51.0	10	11	11	15	18	4.1	4.4	4.4	5.8	7.0
North	M	4	4	6	6	2	0.9	0.9	1.3	1.3	0.4	42	45	40	45	45	36.9	39.1	34.4	37.9	37.4	46	49	47	51	47	4.1	4.3	4.1	4.4	4.0
	F	2	3	2	2	1	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	52	54	47	56	67	35.2	36.0	30.8	36.0	42.7	54	57	49	58	68	5.0	5.2	4.4	5.1	5.9
South	M	24	19	12	9	11	2.5	2.0	1.2	0.9	1.1	100	127	118	113	114	36.1	45.6	41.9	39.6	39.4	126	149	132	122	125	4.7	5.5	4.8	4.4	4.4
	F	12	5	9	9	10	1.3	0.5	0.9	0.9	1.0	195	175	159	202	197	50.4	44.9	40.4	50.6	48.7	208	182	168	211	208	7.4	6.4	5.8	7.2	7.0
NB	M	28	23	18	15	13	2.0	1.6	1.3	1.0	0.9	142	172	158	158	159	36.4	43.7	39.7	39.1	38.8	172	196	179	173	172	4.5	5.2	4.6	4.4	4.3
	F	14	8	11	11	11	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	247	229	206	258	264	46.2	42.4	37.7	46.5	47.0	262	239	217	269	276	6.7	6.1	5.4	6.6	6.7

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994-1998)

NOTES TO FIGURE 24

Figure 24 shows the average Age-Specific Mortality Rates for Cerebrovascular disease, in two age groups, for males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period1994 – 1998.

35 – 64 year age group

- There were no significant differences between any of the regions and the provincial average.
- The average ASMRs for both males and females were significantly lower in the North versus the South.

65+ year age group

- Region I females are significantly higher than the provincial average.
- Region VI females are significantly lower than the provincial average.
- The average ASMR for females was significantly lower in the North versus the South.

Gender

- The average ASMRs for males in the 35-64 year age group were significantly higher than for females in Region VII, as well as the North, the South and in the Province overall.
- The average ASMRs for males in the 65+ year age group were significantly lower than for females in Regions I and III, as well as the South and in the Province overall.

Figure 24 **Average Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for Cerebrovascular Disease by Area, Gender and Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998**





NOTES TO FIGURE 25

Cancer was the second leading cause of death in New Brunswick from 1994 – 1998. **Figure 25** shows the average percentage of deaths due to malignant neoplasm by leading sites and gender during the five-year period 1994 – 1998.

- In **males**, the five leading sites, in rank order, were: lung, prostate, colon, pancreas and stomach.
- In **females**, the five leading sites, in rank order, were: lung, breast, colon, pancreas and uterus.

Figure 25 Average Percentage of Deaths due to Malignant Neoplasms by Leading Sites and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998



MALIGNANT NEOPLASMS OF THE TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG

NOTES TO FIGURE 26

Figure 26 shows the annual age-specific mortality rates (ASMR), per 10,000 population, for malignant neoplasms of the trachea, bronchus and lung for males and females in New Brunswick during the five-year period 1994 - 1998.

- In both males and females, the annual ASMR remained relatively stable over the five-year period.
- Over the five-year period, the ASMR for males was consistently, at least double that for females.

Figure 26 **Age-Standardized Mortality Rate for Malignant Neoplasms of the Trachea, Bronchus and Lung by Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**



NOTES TO TABLE 14

Table 14 presents the mortality rate, per 10,000 population, for malignant neoplasms of the trachea, bronchus and lung for males and females, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998.

Table 14 *MALIGNANT NEOPLASMS OF TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG* **Mortality Rate, per 10,000 Population, by Sex and Age Group in seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1998**

		35-64										65+										All Ages									
		Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number Of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number of Deaths					Age-Standardized Mortality Rate				
Location	Sex	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
Region I	M	13	24	20	18	25	3.9	6.9	5.6	5.0	6.7	64	53	57	63	58	64.4	52.9	56.2	60.9	55.2	77	77	77	81	83	8.0	7.9	7.7	8.0	8.0
	F	12	14	12	14	13	3.5	4.0	3.4	3.9	3.5	17	33	23	22	33	12.4	24.0	16.4	15.4	22.6	29	47	35	37	46	2.9	4.7	3.4	3.5	4.3
Region II	M	22	24	17	26	22	7.0	7.5	5.2	7.8	6.5	62	53	49	53	61	65.1	55.6	51.1	54.6	62.5	84	77	66	79	83	9.1	8.3	7.1	8.3	8.7
	F	21	12	13	15	15	6.5	3.7	3.9	4.4	4.3	30	24	37	29	39	21.6	17.2	26.5	20.6	27.6	51	37	50	44	54	5.2	3.7	5.0	4.3	5.3
Region III	M	12	16	18	16	16	4.1	5.4	5.9	5.1	5.0	41	40	48	36	41	49.8	48.2	57.2	42.2	47.3	53	56	66	53	57	6.6	6.8	7.9	6.2	6.6
	F	7	7	7	6	5	2.4	2.3	2.3	1.9	1.6	13	20	17	14	20	11.7	17.8	15.0	12.2	17.2	20	27	24	20	25	2.4	3.2	2.8	2.3	2.9
Region IV	M	7	8	8	9	6	6.9	7.7	7.5	8.3	5.4	29	21	21	25	16	108.9	78.3	77.4	90.4	56.8	37	29	29	34	22	14.0	10.7	10.6	12.2	7.7
	F	8	1	0	2	4	7.9	1.0	0.0	1.8	3.6	8	4	6	6	10	21.6	10.8	15.9	15.7	25.6	16	5	6	8	14	5.7	1.8	2.2	2.8	4.7
Region V	M	10	4	3	6	3	15.7	6.2	4.6	9.1	4.5	8	14	9	12	17	44.8	77.6	49.3	64.6	90.1	18	18	12	18	20	10.1	10.1	6.7	9.8	10.8
	F	3	2	4	1	1	4.7	3.1	6.1	1.5	1.5	5	4	7	5	9	20.4	15.9	27.3	19.1	34.1	8	6	11	6	10	4.4	3.2	5.8	3.1	5.2
Region VI	M	10	6	10	13	12	5.8	3.4	5.5	7.1	6.4	27	17	21	26	37	62.3	38.7	47.4	57.5	80.2	37	23	31	39	49	8.4	5.2	6.8	8.4	10.5
	F	3	4	3	6	7	1.8	2.3	1.7	3.3	3.8	5	6	10	7	3	9.5	11.2	18.2	12.5	5.3	8	10	13	13	10	1.9	2.3	3.1	2.9	2.0
Region VII	M	5	4	7	3	7	5.4	4.3	7.4	3.1	7.2	14	12	18	13	8	54.1	45.4	67.4	47.8	29.3	19	16	25	16	15	7.4	6.2	9.5	6.0	5.5
	F	5	2	4	2	3	5.6	2.2	4.4	2.1	3.2	4	7	5	4	5	11.8	20.4	14.5	11.4	14.2	9	9	10	6	8	3.5	3.6	3.9	2.3	3.0
North	M	32	22	28	31	28	7.4	5.0	6.3	6.8	6.0	78	64	69	76	78	68.6	55.6	59.3	64.1	64.8	111	86	97	107	106	9.7	7.5	8.3	8.9	8.8
	F	19	9	11	11	15	4.5	2.1	2.5	2.4	3.3	22	21	28	22	27	14.9	14.0	18.3	14.2	17.2	41	30	40	33	42	3.6	2.6	3.5	2.8	3.5
South	M	47	64	55	60	63	5.0	6.6	5.6	6.0	6.1	167	146	154	152	160	60.3	52.5	54.7	53.2	55.3	214	210	209	213	223	7.9	7.7	7.6	7.6	7.8
	F	40	33	32	35	33	4.2	3.4	3.2	3.4	3.2	60	77	77	65	92	15.5	19.7	19.6	16.3	22.8	100	111	109	101	125	3.6	3.9	3.8	3.4	4.2
NB	M	79	86	83	91	91	5.8	6.1	5.8	6.2	6.1	245	210	223	228	238	62.7	53.4	56.1	56.4	58.1	325	296	306	320	329	8.5	7.6	7.8	8.0	8.1
	F	59	42	43	46	48	4.3	3.0	3.0	3.1	3.2	82	98	105	87	119	15.3	18.1	19.2	15.7	21.2	141	141	149	134	167	3.6	3.5	3.7	3.2	4.0

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994-1998)

NOTES TO FIGURE 27

Figure 27 shows the average Age-Specific Mortality Rates for malignant neoplasms of the trachea, bronchus and lung in two age groups for males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, during the period 1994 – 1998.

35-64 year age group

- Region II females are significantly higher than the provincial average.
- Region III females are significantly lower than the provincial average.
- There were no statistically significant differences between the average ASMRs in the North versus the South for neither males nor females.

65+ year age group

- Region II females are significantly higher than the provincial average.
- Region III males are significantly lower than the provincial average.
- Region IV males are significantly higher than the provincial average.
- Region VI females are significantly lower than the provincial average.
- The average ASMR for males was significantly higher in the North versus the South.

Gender

- The average ASMRs for males in the 35 - 64 year age group were significantly higher than for females in all regions, except for Region VII, as well as the North, the South and in the Province overall.
- The average ASMRs for males in the 65+ year age group were significantly higher than for females in all regions, as well as the North, the South and in the Province overall

Figure 27 **Average Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for Malignant Neoplasms of the Trachea, Bronchus and Lung by Area, Gender and Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998**





NOTES TO FIGURE 28

Figure 28 shows the annual age-standardized mortality rates (ASMR), per 10,000, for malignant neoplasms of the female breast in the North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1994 - 1998.

- The ASMR for the province steadily increased from 1994 to 1996 but then decreased in 1997, and then reverted to its 1996 level.
- There is no consistent pattern for either the North or the South over the five-year period.

Figure 28 **Age-Standardized Mortality Rate for Malignant Neoplasms of the Female Breast by Area, New Brunswick: 1994 – 1998**



NOTES TO TABLE 15

Table 15 presents the mortality rates, per 10,000 population, for malignant neoplasms of the female breast in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 - 1998.

Table 15 ***MALIGNANT NEOPLASMS OF THE FEMALE BREAST*** **Mortality Rate, per 10,000 Population, by Age Group in seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 – 1998**

		35-64										65+						All Ages									
		Total Number Of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number of Deaths					Age-Specific Mortality Rate					Total Number Of Deaths					Age-Standardized Mortality Rate				
Location	Sex	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
Region I	F	13	14	13	13	21	3.8	4.0	3.7	3.6	5.7	19	19	30	18	27	13.9	13.8	21.4	12.6	18.5	32	34	44	31	48	3.2	3.4	4.3	2.9	4.5
Region II	F	8	16	7	14	18	2.5	4.9	2.1	4.1	5.2	20	24	25	19	25	14.4	17.2	17.9	13.5	17.7	28	40	32	33	43	2.8	4.0	3.2	3.2	4.2
Region III	F	10	16	11	5	12	3.4	5.4	3.6	1.6	3.7	11	15	13	18	16	9.9	13.3	11.4	15.7	13.7	21	31	24	23	28	2.5	3.7	2.8	2.7	3.2
Region IV	F	4	3	5	3	2	4.0	2.9	4.7	2.7	1.8	5	3	6	6	5	13.5	8.1	15.9	15.7	12.8	9	6	11	9	7	3.2	2.1	3.8	3.1	2.4
Region V	F	4	1	3	0	3	6.3	1.5	4.5	0.0	4.4	5	3	2	7	3	20.4	11.9	7.8	26.8	11.4	9	4	5	7	6	4.9	2.2	2.6	3.7	3.1
Region VI	F	5	4	9	4	4	3.0	2.3	5.1	2.2	2.2	2	5	16	6	13	3.8	9.3	29.1	10.7	23.0	7	9	25	10	17	1.5	2.1	5.7	2.2	3.9
Region VII	F	2	3	2	2	2	2.3	3.3	2.2	2.1	2.1	10	6	6	3	6	29.6	17.5	17.4	8.5	17.0	12	9	8	6	9	4.8	3.5	3.1	2.3	3.5
North	F	15	11	19	9	11	3.6	2.6	4.3	2.0	2.4	22	17	30	22	27	14.9	11.3	19.6	14.2	17.2	37	28	49	32	39	3.3	2.4	4.2	2.7	3.3
South	F	31	46	31	32	51	3.3	4.7	3.1	3.2	4.9	50	58	68	55	68	12.9	14.9	17.3	13.8	16.8	81	105	100	87	119	2.9	3.7	3.5	3.0	4.0
NB	F	46	57	50	41	62	3.4	4.1	3.5	2.8	4.2	72	75	98	77	95	13.5	13.9	17.9	13.9	16.9	118	133	149	119	158	3.0	3.3	3.7	2.9	3.8

Source: Provincial Epidemiology Service, New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database, 1994-1998)

NOTES TO FIGURE 29

Figure 29 shows the average Age-Specific Mortality Rates for malignant neoplasms of the female breast, in two age groups, for females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 - 1998.

35 – 64 year age group

- There were no significant differences between any region and the province, nor between the North and the South.

65+ year age group

- There are no significant differences between any region and the province, nor between the North and the South.

Figure 29 **Average Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for Malignant Neoplasms of the Female Breast by Area and Age Group, New Brunswick: 1994 – 1998**





DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

NOTES TO FIGURE 30

Diseases of the respiratory system were the third leading cause of death in the Province in the 1994 – 1998 period. **Figure 30** shows the average percentage of deaths due to the two leading diagnostic categories in diseases of the respiratory system for males and females during the period 1994 – 1998.

- Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and pneumonia and influenza accounted for over 88 - 89% of all male and female deaths due to disease of the respiratory system.
- The percentage of deaths due to COPD was 16% higher for males than for females.
- The percentage of deaths due to pneumonia and influenza was 15% higher for females than for males.

Figure 30 **Average Percentage of Deaths due to Diseases of the Respiratory System by Leading Diagnostic Classes for Males and Females, New Brunswick: 1994 – 1998**



CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

NOTES TO FIGURE 31

Figure 31 shows the average age-specific mortality rates for COPD in males and females in three age groups during the five-year period 1994 – 1998.

45 – 54 year age group

- There was no considerable year-to-year variability in the COPD mortality rates and no clear trend in the rates for either males or females during the five-year period.

- The average age-specific mortality rates for males were approximately the same as that for females during the five-year period.

55 – 64 year age group

- The average age-specific mortality rates for males showed an average decline of approximately 14% during the five-year period. For females the average age-specific mortality rates declined approximately 6.0% over the five years.

- The average age-specific mortality rate for males (3.6/10,000) was approximately 44% higher than the average for females (2.5/10,000) during the five-year period.

65+ year age group

- The average age-specific mortality rates for males showed a slight increase of approximately 4.5% during the five-year period. For females, the average age-specific mortality rates showed an average increase of approximately 14.7% over the five years.

- The average age-specific mortality rates for males (42.6/10,000) were approximately 134% higher than the average for females (18.2/10,000) during the five-year period.

NOTES TO TABLES 16a-e

Tables 16a-e presents the age-specific mortality rates, per 10,000 population, for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998.

Figure 31 **Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for COPD by Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**



Table 16a **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE* by Sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994**

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	1.4	29.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	11.7
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	62.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	18.0
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	4.5	36.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	25.1
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	33.8
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	13.4	61.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.1	16.3
Region VI	Male	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	78.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.8	2.9	11.5
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	38.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
North	Male	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	7.6	56.3
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	2.1	12.2
South	Male	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.9	42.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.1	17.8
Province	Male	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	4.3	46.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	3.5	16.3

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 16b **Age - Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE* by Sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995**

Age-Specific Mortality Rates

Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	24.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.6	13.1
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	50.4
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	4.1	22.9
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	44.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	12.4
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	18.9
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
Region VI	Male	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	22.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
North	Male	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	41.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.0
South	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	39.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	3.6	16.4
Province	Male	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	39.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	2.9	15.7

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 16c **Age - Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE* by Sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996**

Age-Specific Mortality Rates

Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	15.7
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	44.8
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.6
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.9	5.9	57.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	23.8
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.8
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8
North	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	22.9
South	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	4.6	45.1
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	19.1
Province	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.2	44.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	20.1

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 16d **Age -Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE* by Sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997**

Age-Specific Mortality Rates

Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	23.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	39.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.9	22.0
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	37.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	2.8	20.9
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	65.1
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	32.3
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	23.0
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	35.4
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	18.4
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	22.8
North	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	37.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	20.6
South	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	32.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	2.2	20.6
Province	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	34.4
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.5	20.6

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 16e **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE* by Sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1998**

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	30.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	19.1
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	4.0	53.3
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	19.8
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	48.5
	Female	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.8	19.7
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	67.5
	Female	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	23.1
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	45.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.2
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
North	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	56.5
	Female	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	16.6
South	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2.6	43.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.9	19.5
Province	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	2.4	47.3
	Female	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.3	18.7

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

NOTES TO FIGURE 32

Figure 32 shows the average age-specific mortality rates, per 10,000 population, for COPD, in three age groups, by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick for the five-year period 1994 – 1998.

45 – 54 year age group

- In males, there were no deaths due to COPD in Regions IV and VII during the five-year period.
- In females, there were no deaths due to COPD in Regions IV and VII during the five-year period.
- The average provincial ASMRs for males and females were not significantly different.

55 – 64 year age group

- In males, there were no significant differences between any of the average regional ASMRs and the average provincial ASMR.
- In females, there were no statistically significant differences between the average regional ASMRs and the average provincial ASMR.
- The average provincial ASMR was significantly higher for males than for females.

65+ year age group

- In males, there were no significant differences between any of the average regional ASMRs and the average provincial ASMR.
- In females, the average ASMRs in Region VI was significantly higher than the average provincial ASMR.
- The average provincial ASMR was significantly higher for males than for females.

North and South

- There were no statistically significant differences between the average ASMRs for males or females in the North versus the South of the Province for the 45 - 64 and 65+ age groups. A difference was noted in the 55 - 64 age group for females.

Gender

The average ASMR for males in 65+ year age group was significantly higher than females in Regions II, III, IV & VII as well as in the North and South and Provincial overall.

Figure 32 **Average Age-Specific Mortality Rates, per 10,000 Population, for COPD by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**







EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND POISONING

NOTES TO FIGURE 33

External causes of injury and poisoning was the fourth leading cause of death in New Brunswick during the period 1994 – 1998. **Figure 33** shows the average percentage of deaths due to the two leading diagnostic categories in external causes of injury and poisoning for males and females in New Brunswick during the five-year period 1994 – 1998.

- Motor Vehicle Traffic Accidents was the first leading cause of death due to external causes of injury, and poisoning for females. The percentage of deaths due to motor vehicle traffic accidents was slightly higher for females than for males.
- Suicide was the first leading cause of death due to external causes of injury and poisoning for males. The percentage of deaths due to suicide was consistently higher for males than for females.
- Other external causes of injury included drowning, fire and accidental falls.

Figure 33 **Average Percentage of Deaths due to External Causes of Injury and Poisoning by Leading Causes and Gender, New Brunswick: 1994 – 1998**



MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS

NOTES TO FIGURE 34

Figure 34 shows the average age-specific mortality rate for motor vehicle traffic accidents for males and females, in five-year age groups, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1994 – 1998.

Province

- There were no statistically significant differences between males and females in average provincial age-specific mortality rates for the motor vehicle traffic accidents in any of the five age groups during the period 1994 – 1998.

Regions

- There were no statistically significant differences in any region between the average ASMRs for either males or females, in any of the five-year age groups.

North and South

- There were no statistically significant differences between the average ASMRs for either males or females in the North versus the South of the Province in any of the five year age groups.

Gender

- The average ASMR for the 15 - 24 and 25 - 44 year age groups was significantly higher in males than in females, at the provincial level only. There were no significant differences in any other age groups in both genders.

NOTES TO TABLES 17a-e

Tables 17a-e present the age-specific mortality rate (ASMR), per 10,000 population, for motor vehicle traffic accidents for males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, 1994 – 1998.

Figure 34 **Average Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for Motor Vehicle Traffic Accidents by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**





Figure 34 (continued) **Average Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for Motor Vehicle Traffic Accidents by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**





Figure 34 (continued) **Average Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for Motor Vehicle Traffic Accidents by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**



Table 17a **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994**

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	4.0
	Female	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Region II	Male	0.0	0.8	7.5	4.5	4.9	0.0	1.9	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.9	1.4	0.7
Region III	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.1	1.5	3.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.9
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	3.1	0.0	3.8
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region V	Male	0.0	0.0	7.9	0.0	3.8	0.0	4.7	0.0	5.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.3	1.7	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.8	0.0	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	2.3	3.3	0.0	3.9
	Female	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
North	Male	0.0	0.0	1.0	1.1	2.7	1.5	2.8	0.0	2.6
	Female	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7
South	Male	0.0	0.3	2.6	2.0	2.3	0.5	1.6	1.0	2.5
	Female	0.0	0.0	0.6	0.5	0.2	0.7	0.3	0.5	0.8
Province	Male	0.0	0.2	2.1	1.7	2.4	0.8	2.0	0.7	2.6
	Female	0.0	0.0	0.4	1.1	0.2	0.8	0.4	0.3	0.7

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 17b **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995**

Age-Specific Mortality Rates

Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.8	3.1	5.8	0.0	1.3	2.5	1.3	2.0
	Female	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.7	0.9	0.0	2.2
Region II	Male	0.0	1.6	1.5	6.2	0.7	0.7	0.0	0.0	2.1
	Female	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.7	1.8	1.4	2.1
Region III	Male	0.0	0.0	1.7	3.1	1.4	2.3	2.0	3.0	2.4
	Female	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	0.9
Region IV	Male	0.0	0.0	9.0	4.8	7.2	2.1	11.8	0.0	7.5
	Female	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	2.1	0.0	0.0	2.7
Region V	Male	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	0.0	5.2	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	4.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	4.8	2.3	2.4	0.0	0.0	3.8
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
North	Male	0.0	0.6	4.2	2.3	3.3	1.5	2.7	0.0	4.3
	Female	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.5	0.0	0.0	1.3
South	Male	0.0	0.8	2.1	5.0	0.7	1.4	1.5	1.4	2.2
	Female	0.0	0.0	1.7	0.5	0.2	0.5	1.5	1.4	1.8
Province	Male	0.0	0.8	2.8	4.2	1.5	1.5	1.9	1.0	2.8
	Female	0.0	0.0	1.1	0.7	0.5	0.5	1.1	1.0	1.7

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 17c **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996**

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	4.8	2.9	0.7	0.0	1.6	0.0	3.9
	Female	0.0	0.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4
Region II	Male	0.0	0.8	0.0	3.2	0.7	2.1	0.9	0.0	2.1
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	1.4
Region III	Male	0.0	0.0	1.7	1.5	1.4	2.3	2.8	2.9	2.4
	Female	0.0	0.9	1.9	1.6	0.0	0.0	1.0	1.4	0.9
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	4.0	0.0	0.0	7.4
	Female	0.0	0.0	4.9	5.5	0.0	2.1	2.9	0.0	0.0
Region V	Male	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	5.6	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	9.7	2.5	0.0	0.0	0.0	7.5
	Female	7.2	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.9
North	Male	0.0	0.6	0.0	7.1	1.1	1.0	0.7	1.0	3.4
	Female	1.7	0.0	1.2	1.3	0.6	1.0	0.7	2.1	1.3
South	Male	0.0	0.3	2.2	2.5	0.9	1.4	1.8	0.9	2.8
	Female	0.0	0.6	1.1	0.5	0.2	0.2	0.6	0.4	1.3
Province	Male	0.0	0.4	1.4	3.9	1.0	1.3	1.4	1.0	3.0
	Female	0.5	0.4	1.2	0.7	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 17d **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997**

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	1.7	9.7	4.4	1.4	2.6	3.1	0.0	1.0
	Female	0.0	0.9	1.7	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	1.4
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	4.7	0.8	1.4	0.9	0.0	3.1
	Female	0.0	0.8	0.0	6.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
Region III	Male	1.8	0.0	0.0	0.0	1.4	3.0	0.9	0.0	2.3
	Female	2.0	0.9	0.0	0.0	1.5	2.2	0.9	0.0	1.7
Region IV	Male	0.0	0.0	4.5	0.0	2.5	0.0	2.7	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	2.6
Region V	Male	0.0	0.0	0.0	10.0	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0
	Female	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	5.1	1.5	0.0	2.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	2.4	2.9	4.6	3.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
North	Male	0.0	0.0	2.2	3.5	1.8	2.5	2.5	1.0	1.7
	Female	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.6
South	Male	0.6	0.6	3.3	3.1	1.2	2.3	1.7	0.0	2.1
	Female	0.6	0.9	0.6	3.7	1.7	0.9	0.3	0.0	1.0
Province	Male	0.4	0.4	2.9	3.2	1.4	2.4	2.0	0.3	2.0
	Female	1.4	0.6	0.4	2.6	1.2	0.8	0.6	0.0	0.9

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 17e Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1998

		Age-Specific Mortality Rates								
Location	Sex	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Region I	Male	0.0	0.0	1.6	3.0	0.0	2.6	0.0	2.4	1.9
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7
Region II	Male	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	3.5	0.0	4.0	3.1
	Female	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7
Region III	Male	0.0	0.0	7.0	1.7	2.9	0.7	4.5	1.4	1.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	2.6
Region IV	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	4.5	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4	0.0	2.6	0.0	0.0
Region V	Male	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	2.5	0.0	0.0	4.3
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	2.6	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.8
North	Male	0.0	0.0	2.3	2.4	0.6	1.5	0.6	1.0	1.7
	Female	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	0.0	1.9	1.0	0.6
South	Male	0.0	0.0	2.8	2.1	1.5	2.3	1.4	2.6	2.1
	Female	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.7	0.0	0.9	1.2
Province	Male	0.0	0.0	2.6	2.2	1.2	2.1	1.1	2.1	2.0
	Female	0.0	0.0	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1

Source: New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population

SUICIDE

NOTES TO FIGURE 35

Figure 35 shows the average age-specific mortality rate for deaths by suicide for males and females, in four age groups, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1994–1998. **Figure 35** does not include the 0 – 14 year age group because all of the average age-specific mortality rates in this age group were less than .01 per 10,000 population.

Provincial Average Age-Specific Mortality Rate

- There were no statistically significant differences for males or females in average provincial age-specific mortality rates for suicides in any of the four-year age groups during the period 1994–1998.

Regional Average Age-Specific Mortality Rate

- There were no statistically significant differences in any region between the average age-specific mortality rate for either males or females in any of the four-year age groups.

North and South

- There were no statistically significant differences between the average age-specific mortality rate for either males or females in the North versus the South of the Province in any of the four year age groups.

Gender

- The average age-specific mortality rate for the 15 - 24 year age group was significantly higher in males than for females in the North of the province and in the Province overall.

- The average age-specific mortality rate for the 25 - 44 year age group was significantly higher in males than for females in the North, South and in the Province overall.

- The average age-specific mortality rate for the 45 - 64 year and 65+ year age groups was significantly higher in males than for females in the Province overall.

NOTES TO TABLES 18a-e

Tables 18a-e present the age-specific mortality rate, per 10,000 population, for deaths by suicide for males and females in the seven Health Regions, North, South and the Province of New Brunswick, 1994 – 1998.

Figure 35 **Average Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for Death by Suicide by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**





Figure 35 (Continued) **Average Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for Death by Suicide by Gender, Age Group and Area, New Brunswick: 1994 – 1998**





Table 18a **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *DEATHS BY SUICIDE* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994**

		Age-Specific Mortality Rates				
Location	Sex	0 – 14	15 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
Region I	Male	0.0	1.5	2.0	0.5	3.0
	Female	0.0	0.8	1.0	1.1	0.0
Region II	Male	0.0	3.0	2.5	3.4	1.1
	Female	0.0	0.0	0.7	1.7	0.7
Region III	Male	0.0	1.6	2.2	4.2	3.6
	Female	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Region IV	Male	0.0	9.2	5.5	3.8	7.5
	Female	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
Region V	Male	0.0	4.2	9.3	5.5	0.0
	Female	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	1.4	2.0	3.2	4.6
	Female	0.0	1.5	0.7	1.1	0.0
Region VII	Male	0.0	2.2	3.5	3.9	7.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
North	Male	0.0	3.8	4.2	3.8	5.3
	Female	0.0	0.3	0.7	0.9	0.3
South	Male	0.0	2.0	2.3	2.6	2.5
	Female	0.0	0.3	0.7	0.9	0.3
Province	Male	0.0	2.6	2.9	3.0	3.3
	Female	0.0	0.4	0.7	0.9	0.2

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 18b **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *DEATHS BY SUICIDE* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995**

		Age-Specific Mortality Rates				
Location	Sex	0 – 14	15 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
Region I	Male	0.6	1.5	4.1	3.1	1.0
	Female	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Region II	Male	0.0	1.5	3.2	3.3	1.0
	Female	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0
Region III	Male	0.0	0.8	3.7	1.8	3.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
Region IV	Male	0.0	9.3	10.0	3.6	11.2
	Female	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0
Region V	Male	0.0	4.4	5.7	0.0	0.0
	Female	0.0	4.5	3.8	0.0	0.0
Region VI	Male	0.0	5.5	4.6	8.1	4.6
	Female	0.0	0.3	0.5	0.4	0.0
Region VII	Male	0.0	4.7	5.9	1.9	0.0
	Female	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
North	Male	0.0	6.1	6.3	4.5	4.3
	Female	0.0	0.6	1.1	1.3	0.0
South	Male	0.2	1.3	3.7	2.8	1.8
	Female	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0
Province	Male	0.1	2.8	4.5	3.3	2.5
	Female	0.0	0.4	0.3	0.9	0.0

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 18c **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *DEATHS BY SUICIDE* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996**

		Age-Specific Mortality Rates				
Location	Sex	0 – 14	15 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
Region I	Male	0.0	0.8	5.1	1.0	1.0
	Female	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0
Region II	Male	0.0	0.8	1.4	3.3	1.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region III	Male	0.0	0.8	2.2	1.2	3.6
	Female	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0
Region IV	Male	1.8	2.4	5.5	7.0	0.0
	Female	0.0	2.6	1.1	6.9	0.0
Region V	Male	0.0	0.0	7.7	5.3	5.5
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	1.2	4.2	2.7	3.9	4.5
	Female	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0
Region VII	Male	0.0	2.4	1.2	1.9	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
North	Male	0.9	2.8	3.8	4.4	2.6
	Female	0.0	0.6	0.5	2.0	0.0
South	Male	0.0	0.8	2.9	1.8	1.8
	Female	0.0	0.3	0.1	0.7	0.0
Province	Male	0.3	1.4	3.2	2.6	2.0
	Female	0.0	0.4	0.2	1.1	0.0

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 18d **Age-Specific Mortality Rate,10,000 Population, for *DEATHS BY SUICIDE* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997**

		Age-Specific Mortality Rates				
Location	Sex	0 – 14	15 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
Region I	Male	0.0	3.8	4.0	1.0	1.9
	Female	0.0	1.6	0.0	0.5	0.0
Region II	Male	0.5	2.4	2.5	2.1	1.0
	Female	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0
Region III	Male	0.0	0.8	1.8	2.8	3.5
	Female	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0
Region IV	Male	1.9	0.0	2.2	1.7	3.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region V	Male	0.0	0.0	3.9	2.6	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	1.2	2.9	4.1	2.8	6.6
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	2.5	3.6	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
North	Male	0.9	1.1	3.3	2.7	3.4
	Female	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
South	Male	0.2	2.4	2.8	1.9	2.1
	Female	0.0	0.8	0.2	0.3	0.0
Province	Male	0.4	2.0	3.0	2.2	2.5
	Female	0.0	0.6	0.2	0.5	0.0

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Table 18e **Age-Specific Mortality Rate, per 10,000 Population, for *DEATHS BY SUICIDE* by sex in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1998**

		Age-Specific Mortality Rates				
Location	Sex	0 – 14	15 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
Region I	Male	0.6	1.6	2.7	3.2	1.9
	Female	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0
Region II	Male	0.0	0.8	3.3	1.6	0.0
	Female	0.0	0.8	0.7	2.0	0.0
Region III	Male	0.0	2.6	4.4	2.2	4.6
	Female	0.0	0.0	1.5	1.1	0.9
Region IV	Male	2.0	0.0	1.1	4.9	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Region V	Male	0.0	0.0	2.0	2.6	0.0
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VI	Male	1.3	5.8	4.2	4.6	2.2
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Region VII	Male	0.0	0.0	6.4	3.5	3.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
North	Male	1.0	2.3	3.6	4.1	1.7
	Female	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
South	Male	0.2	1.6	3.4	2.4	2.1
	Female	0.0	0.6	0.7	1.3	0.2
Province	Male	0.4	1.8	3.5	2.9	2.9
	Female	0.0	0.4	0.4	0.8	0.4

Source: *New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistic Database 1994 – 1998). Rates based on 1996 New Brunswick census population.*

Chapter 5

Morbidity in the Population

Highlights

Communicable Diseases

- In 1998, 1 case of rubella (a vaccine-preventable disease) was reported, compared to 2 in the previous year. In 1998, the number of reported cases of pertussis increased to 266 cases from 73 in 1997.

- The immunization rate for Grade 1 students in the Province declined slightly from 97.5% in 1993/94 to 95.8% in 1997/98.

- The leading sexually transmitted disease reported during 1994 - 1998 was chlamydia, followed by gonorrhea and syphilis.

- The number of AIDS deaths rose to 89 in 1998 from 46 in 1993. The number of reported cases of HIV seropositivity has stabilized over the five-year period showing no consistent increasing trend.

- Campylobacteriosis and salmonellosis were the leading enteric diseases reported during the five-year period, followed by giardiasis and E. coli - 0157:H7.

- The largest number of tuberculosis cases were reported in the 60+ year age group over the five-year period, followed by the 40 - 59 year age group.

Hospital Utilization

- The leading causes of hospitalization during the 1993/94 - 1997/98 period were mental disorders, circulatory and respiratory diseases.

- The average cost per patient, per day, for New Brunswick increased by 34.5% from $577 to $776, which was higher than the national estimate, which increased by 33.0% from $628 to $840 during the period 1993/94 - 1997/98.

- In 1993/94 - 1997/98, hospital care days, per 1,000 population, and separations, per 1,000 population, for selected diagnoses decreased by about 7.6% and 9.1% respectively.

- **Among Males,** Mental Disorders and Circulatory Diseases accounted for more hospital care days, per 1,000 population, in the South than in the North, while Respiratory Diseases and Malignant Neoplasms accounted for more hospital care days, per 1,000 population, in the North than in the South.

- **Among Females**, Mental Disorders and Circulatory Diseases accounted for more hospital care days, per 1,000 population, in the South than in the North.

Communicable Diseases

This section presents selected communicable disease data and includes those diseases that are reportable under the New Brunswick Health Act, as well as diseases that are being monitored provincially.

Communicable diseases are presented under the following headings:

(i) Vaccine-Preventable Diseases
(ii) Sexually-Transmitted Diseases
(iii) Enteric Diseases
(iv) Other Communicable Diseases

VACCINE-PREVENTABLE DISEASES

NOTES TO TABLE 19

Table 19 presents the reported number of cases and number of cases per 1,000 population, for four vaccine-preventable diseases (measles, mumps, rubella and pertussis) in New Brunswick during the period 1994 - 1998.

- In 1994, the reported cases for rubella decreased to zero from 84 reported in the previous year.

- Pertussis was the most commonly reported VPD during the 1994 - 1998 period, with 1014 cases, followed by mumps (14 cases) and rubella (8 cases). The number of reported cases of pertussis showed wide variation during the period 1994 - 1998. The sharp rise in pertussis in 1995 represents nearly a six fold (5.8x) increase over the previous year. The increase in 1998 represents 3.6x increase over the previous year.

- There were no reported cases of poliomyelitis, diptheria or tetanus in the five-year period 1994 - 1998.

Table 19 Number of Reported Cases per 1,000 Population for *MEASLES, MUMPS, RUBELLA* and *PERTUSSIS* in New Brunswick: 1994 - 1998

	Total Number of Cases					Cases per 1,000 Population				
Disease	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Measles	0	2	0	4	0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Mumps	2	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubella	0	1	4	2	1	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Pertussis	81	469	125	73	266	0.11	0.62	0.17	0.10	0.35

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness 1994 - 1998. Rates based on 1999 New Brunswick Population Estimates.

NOTES TO TABLE 20

Table 20 presents the reported number of cases of measles, mumps, rubella and pertussis by age group and gender in the Province for the five-year period 1994 - 1998.

- There were no reported cases of measles in 1994, nor any reported cases of rubella in 1994.
- The number of mumps cases reported in 1994 - 1998 (14 cases) was substantially higher than in the previous five years (9 cases).

Table 20 Reported Cases of *MEASLES, MUMPS, RUBELLA,* and *PERTUSSIS* by Age Group and Gender, New Brunswick, 1994 - 1998

		Measles					Mumps					Rubella					Pertussis				
Age	Sex	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0 - 11 Months	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	4	8
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	3	3	9
1 – 4 Years	M	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	12	54	22	11	8
	F	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	14	77	15	8	23
5 – 9 Years	M	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19	85	23	13	32
	F	0	1	0	0	0	0	0	2	.	0	0	0	0	0	0	11	84	18	18	56
10 – 14 Years	M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10	30	4	4	54
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47	15	6	35
15 – 19 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	3
	F	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	6
20 – 24 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3
25 – 29 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
30 – 39 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	3	2	6
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5
40 – 45 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4
60 + Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
All Ages	M	0	0	0	2	0	0	2	1	2	3	0	0	3	1	1	45	212	64	34	121
	F	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	1	1	1	0	36	257	61	39	145

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

Table 20 Reported Cases of *MEASLES, MUMPS, RUBELLA,* and *PERTUSSIS* by Age Group and Gender, New Brunswick, 1994 - 1998

		Measles					Mumps					Rubella					Pertussis				
Age	Sex	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0 - 11 Months	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	4	8
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	3	3	9
1 – 4 Years	M	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	12	54	22	11	8
	F	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	14	77	15	8	23
5 – 9 Years	M	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19	85	23	13	32
	F	0	1	0	0	0	0	0	2	.	0	0	0	0	0	0	11	84	18	18	56
10 – 14 Years	M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10	30	4	4	54
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47	15	6	35
15 – 19 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	3
	F	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	6
20 – 24 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3
25 – 29 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
30 – 39 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	3	2	6
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5
40 – 45 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4
60 + Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
All Ages	M	0	0	0	2	0	0	2	1	2	3	0	0	3	1	1	45	212	64	34	121
	F	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	1	1	1	0	36	257	61	39	145

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

NOTES TO TABLE 21

Table 21 presents immunization data for Grade 1 students during the 1993/94 to 1997/98 school years.

- Since June 1982, all children in the Province entering Grade 1 must be immunized against poliomyelitis, diphtheria, tetanus, measles, mumps and rubella unless they qualify for exemption.

- The immunization rate for the Province during the five-year period, declined from 97.5% in 1993/94 to 95.8% in 1997/98.

Table 21 Number of Grade 1 Students Immunized and Immunization Rate in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

	Number of Students					Immunization Complete					Percentage Complete				
Region	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998
I	2109	2166	2293	N/A	2148	2039	2084	2206	N/A	2057	96.68	97.51	97.68	100	95.8
II	2469	2390	2411	2954	2867	2443	2390	2371	2898	2775	98.95	98.83	98.55	98.59	96.8
III	1769	2206	2026	2323	2182	1652	2090	1865	2091	2021	93.39	94.72	92.35	91.96	92.6
IV	653	673	650	627	599	652	673	649	625	597	99.85	100	99.85	99.68	99.7
V	548	562	456	485	470	536	552	452	476	462	97.81	98.22	99.12	98.14	98.3
VI	1176	501	1000	1076	1016	1170	493	994	1068	1003	99.49	98.40	99.39	99.23	98.7
VII	728	0	1344	N/A	606	725	0	1342	N/A	599	99.59	100	99.85	100	98.8
North	3105	1736	3450	2188	2691	3083	1718	3437	2169	2661	99.29	98.96	99.62	99.13	98.9
South	6347	6762	6730	5277	7197	6134	6531	6442	4989	6853	96.64	96.58	95.72	95.54	95.2
Province	9452	8498	10180	7465	9888	9217	8249	9879	7158	9514	97.51	97.06	97.04	95.88	96.2

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

SEXUALLY-TRANSMITTED DISEASES (STDs)

NOTES TO FIGURE 36

Gonorrhea, chlamydia and syphilis were the major reportable sexually transmitted diseases (STDs) in New Brunswick between 1994 and 1998. **Figure 36** shows the number of cases, per 1,000 population, for these STDs in New Brunswick between 1994 and 1998.

- Chlamydia infections were the most commonly reported STD.
- The rate of gonococcal infection showed a significant increase in New Brunswick between 1994 and 1997, with a noticeable decline in 1998.

NOTES TO TABLE 22A

Table 22A presents the total number of reported cases for ***Gonorrhea, Chlamydia***, and ***Syphilis*** cases in New Brunswick for 1994 - 1998.

NOTES TO TABLE 22B

Table 22B presents the number of reported cases, per 1,000 population, for ***Gonorrhea, Chlamydia*** and ***Syphilis*** in New Brunswick for 1994 - 1998

NOTES TO TABLE 22C

Table 22C presents the reported number of ***Gonorrhea, Chlamydia,*** and ***Syphilis*** cases in New Brunswick by age group and gender for 1994 - 1998.

	Table 22A Total Number of Cases					Table 22B Cases per 1,000 Population				
Disease	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Gonorrhea	13	14	45	47	21	0.02	0.02	0.06	0.06	0.03
Chlamydia	919	798	839	821	1050	1.22	1.06	1.11	1.09	1.39
Syphilis	18	19	15	10	10	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness 1994 - 1998. Rates based on 1999 New Brunswick population estimates.

Table 22C Reported Number of *GONORRHEA, CHLAMYDIA,* and *SYPHILIS* Cases by Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 - 1998

Age	Sex	Gonorrhea					Chlamydia					Syphilis				
		1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0 - 11 Months	M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1 - 4 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - 9 Years	M	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 14 Years	M	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	4	3	7	10	10	0	0	0	0	0
15 – 19 Years	M	2	3	1	1	2	29	25	35	26	48	0	1	0	0	0
	F	4	2	15	9	5	305	225	251	255	341	1	0	0	0	0
20 – 24 Years	M	1	1	6	0	1	87	75	77	96	121	0	0	1	0	0
	F	1	3	5	16	3	324	281	300	247	315	0	0	0	0	0
25 – 29 Years	M	1	0	0	1	1	35	48	41	38	52	0	0	0	0	0
	F	1	0	3	8	1	75	73	76	75	92	0	0	0	0	0
30 – 39 Years	M	2	3	4	2	3	19	21	12	27	22	0	1	1	0	0
	F	1	2	9	8	3	29	34	27	27	31	0	0	0	0	0
40 – 59 Years	M	0	0	0	0	1	2	0	3	5	6	3	2	0	1	0
	F	0	0	2	2	1	3	8	5	8	8	3	0	0	2	1
60 + Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	3
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	10	7	4	6
Gender Not Specified	M, F	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0
All Ages Excluding Gender Not Specified	M	6	7	11	4	8	174	170	169	192	249	8	9	7	4	3
	F	7	7	34	43	13	744	627	668	626	800	10	10	7	6	7

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

Table 22C Reported Number of *GONORRHEA*, *CHLAMYDIA*, and *SYPHILIS* Cases by Age Group and Gender, New Brunswick: 1994 - 1998

Age	Sex	Gonorrhea					Chlamydia					Syphilis				
		1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0 - 11 Months	M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1 - 4 Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - 9 Years	M	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 14 Years	M	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	4	3	7	10	10	0	0	0	0	0
15 – 19 Years	M	2	3	1	1	2	29	25	35	26	48	0	1	0	0	0
	F	4	2	15	9	5	305	225	251	255	341	1	0	0	0	0
20 – 24 Years	M	1	1	6	0	1	87	75	77	96	121	0	0	1	0	0
	F	1	3	5	16	3	324	281	300	247	315	0	0	0	0	0
25 – 29 Years	M	1	0	0	1	1	35	48	41	38	52	0	0	0	0	0
	F	1	0	3	8	1	75	73	76	75	92	0	0	0	0	0
30 – 39 Years	M	2	3	4	2	3	19	21	12	27	22	0	1	1	0	0
	F	1	2	9	8	3	29	34	27	27	31	0	0	0	0	0
40 – 59 Years	M	0	0	0	0	1	2	0	3	5	6	3	2	0	1	0
	F	0	0	2	2	1	3	8	5	8	8	3	0	0	2	1
60 + Years	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	3
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	10	7	4	6
Gender Not Specified	M, F	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0
All Ages Excluding Gender Not Specified	M	6	7	11	4	8	174	170	169	192	249	8	9	7	4	3
	F	7	7	34	43	13	744	627	668	626	800	10	10	7	6	7

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

Figure 36 **Number of Cases, per 1,000 Population, for Major Sexually-Transmitted Diseases in New Brunswick: 1994 – 1998**



NOTES TO FIGURE 37

Figure 37 shows the number of new cases of human immunodeficiency virus (HIV) seropositivity and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) by gender in New Brunswick, for the period 1994 - 1998.

Figure 37 Number of New *HIV* and *AIDS* Cases by Gender in New Brunswick: 1994 - 1998



NOTES TO TABLES 23A & 23B

Tables 23A & 23B shows the number of new cases of HIV seropositivity and AIDS reported in New Brunswick during the five-year period, 1994 - 1998, as well as year end status of all individuals diagnosed with AIDS, reported in New Brunswick during the same time period.

- Between 1994 and 1998 a total of 82 males and 16 females were diagnosed with HIV. During the five-year period, 47 (57%) of the male and 5 (31%) of the female HIV cases were also diagnosed with AIDS.

- At the end of 1998, forty-seven (34%) of the 136 individuals who had been diagnosed with AIDS since 1994 were alive and eighty-nine (65%) were deceased.

Table 23A

Number of New HIV & AIDS Cases in New Brunswick: 1994 -1998

Number of New HIV Cases			Number of New AIDS Cases	
Year	Males	Females	Males	Females
1994	30	5	13	2
1995	14	2	16	1
1996	16	4	9	1
1997	11	1	4	1
1998	11	4	5	0
Total	82	16	47	5

Table 23B

Status of Individual Diagnosed with AIDS in New Brunswick: 1994 - 1998

Status of AIDS Cases		
Total Reported Cases	Dead	Alive
99	74	25
116	84	32
126	87	39
131	88	43
136	89	47
-	-	-

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health & Wellness.

ENTERIC DISEASES

NOTES TO FIGURE 38A

Campylobacteriosis and Salmonellosis were the leading enteric diseases in New Brunswick during the period 1994 - 1998. **Figure 38A** shows the number of reported cases, per 1,000 population, for these diseases during the period 1994 - 1998.

Figure 38A Number of Cases, per 1,000 Population, for Campylobacteriosis and Salmonellosis in New Brunswick: 1994 - 1998



NOTES TO FIGURE 38B

Figure 38B shows the number of reported cases for giardiasis and E. coli - 0157:H7, per 1,000 population, in New Brunswick during the period 1994 - 1998.

Figure 38B **Number of Cases, per 1,000 Population, for Giardiasis and E.coli - 0157:H7 in New Brunswick: 1994 - 1998**



NOTES TO FIGURE 38C

Figure 38C shows the number of reported cases for shigellosis and amebiasis, per 1,000 population, in New Brunswick during the period 1994 - 1998.

Figure 38C Number of Cases, per 1,000 Population, for Shigellosis and Amebiasis in New Brunswick: 1994 - 1998



NOTES TO TABLE 24

Table 24 presents the number of reported cases and number of reported cases, per 1,000 population, of amebiasis, campylobacteriosis, giardiasis, E.coli 0157:H7, salmonellosis and shigellosis in New Brunswick in the five-year period 1994 - 1998.

Table 24 **Number of reported cases, per 1,000 Population, for *AMEBIASIS, CAMPYLOBACTERIOSIS, GIARDIASIS, E. COLI - 0157:H7, SALMONELLOSIS* and *SHIGELLOSIS* in New Brunswick: 1994 - 1998**

	Total Number of Cases					Cases per 1,000 Population				
Disease	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Amebiasis	6	6	2	5	0	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
Campylobacteriosis	354	241	258	250	344	0.47	0.32	0.34	0.33	0.46
Giardiasis	113	98	112	133	76	0.15	0.13	0.15	0.13	0.10
E. coli - 0157:H7	14	22	19	22	51	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01
Salmonellosis	166	154	160	129	156	0.22	0.20	0.21	0.17	0.21
Shigellosis	7	9	4	12	12	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness.

NOTES TO FIGURE 39

Figure 39 shows the number of new cases of tuberculosis, by type of case, reported in New Brunswick from 1994 - 1998.

- Pulmonary tuberculosis was the most commonly reported in each of the five years examined.

Figure 39 **Number of New Cases of Tuberculosis by Type Reported in New Brunswick: 1994 - 1998**



NOTES TO TABLES 25 AND 26

Table 25 presents the number of new cases of tuberculosis reported in the Province by type of case, in ten age groups, for the period 1994 - 1998. **Table 26** presents the number of new cases of tuberculosis reported in the Province, by type of case, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 - 1998.

- The largest number of new cases reported was in the 60+ year age group for each of the five years under consideration.

Table 25: Number of New Cases of *TUBERCULOSIS* Reported by Type of Case and Age Group, New Brunswick: 1994-1998

	Pulmonary					Primary					Pleurisy					Non-respiratory				
Age	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11 Mos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 – 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5 – 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – 19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – 24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
25 – 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30 – 39	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 – 59	2	1	6	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
60+	7	2	4	5	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0
All Ages	10	5	11	6	5	1	2	3	0	0	0	1	1	0	0	7	2	3	2	1

Source: Reportable disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health & Wellness

Table 26: Number of New Cases of *TUBERCULOSIS* Reported by Type of Case and Area, New Brunswick: 1994 - 1998

Health	Pulmonary					Primary					Pleurisy					Non-respiratory				
Regions	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
I	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
II	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
III	4	1	4	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
IV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
VII	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North	2	2	4	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
South	8	3	7	4	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4	1	3	2	1
Province	10	5	11	6	5	1	2	3	0	0	0	1	1	0	1	6	2	3	2	1

Source: Reportable disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health & Wellness

NOTES TO FIGURE 40

Figure 40 shows the average number of new tuberculosis cases, per 1,000 population, reported in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the period 1994 - 1998.

- The average number of new tuberculosis cases showed a considerable variation among the seven health regions, with the lowest average in Regions I & II. The average number of new tuberculosis cases, per 1,000 population, for the seven regions was higher in Region V than the provincial average.

- The average number of new tuberculosis cases per 1,000 cases was considerably higher in the South than in the North of the Province.

Figure 40 Average Number of New Tuberculosis Cases, per 1,000 Population, by Area, New Brunswick: 1994 - 1998



HOSPITAL UTILIZATION

This section presents selected hospital utilization data for New Brunswick between fiscal year 1993/94-1997/98, including comparisons with previous reporting periods and national hospital utilization rates.

NOTES TO FIGURE 41

Figure 41 shows the number of hospital care days, per 100,000 population, and annual per capita spending for care in public hospitals in New Brunswick and Canada between 1993/94 and 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, hospital utilization declined by approximately 24% in New Brunswick and 33% in Canada. Hospital utilization was consistently higher in New Brunswick than in Canada, during the five years examined. In 1997/98 the hospital utilization rate in New Brunswick was approximately 8% higher than the national average.

- Between 1993/94 and 1997/98, annual per capita spending on hospital care decreased by approximately .05% ($976) in New Brunswick, and 11% ($766) in Canada. Annual per capita spending on hospital care was consistently higher in New Brunswick than in Canada, during the five years examined. In 1997/98, annual per capita spending on hospital care in New Brunswick was approximately 27% higher than the national average.

Figure 41 Hospital Care Days, per 100,000 Population, and Annual Per Capita Spending on Hospital Care, New Brunswick and Canada: 1993/94 - 1997/98



NOTES TO FIGURE 42

Figure 42 shows the average cost per patient-day and average length of stay in public hospitals for New Brunswick and Canada between 1993/94 and 1997/98.

- The average cost per patient-day in New Brunswick increased by approximately 34% ($776) from 1993/94 to 1997/98, while the cost per patient-day for Canada as a whole, increased by approximately 33% ($840) during the same time period.

- The average cost per patient-day was consistently higher in Canada than in New Brunswick. In 1993/94, the average cost per patient-day in Canada was approximately 8.3% higher than the provincial average.

- Between 1993/94 and 1997/98, the average length of stay in New Brunswick declined by approximately 30%. During the same time period, the national average length of stay declined by approximately 25%.

- The average length of stay was consistently lower in New Brunswick than in Canada. In 1997/98 the average length of stay in New Brunswick hospitals was approximately 18% lower than the national average.

Figure 42 **Average Cost, per Patient-day, and Average Length of Stay in Public Hospitals: New Brunswick and Canada: 1993/94 - 1997/98**



NOTES TO FIGURE 43

Figure 43 shows the number of separations, per 100,000 population, and average cost per separation for public hospitals in New Brunswick and Canada between 1993/94 and 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of separations, per 100,000 population, decreased 11% in New Brunswick, and by 20% nationally.

- The number of separations, per 100,000 population, was consistently higher in New Brunswick than in Canada. In 1997/98 the number of separations, per 100,000 population, in New Brunswick was approximately 40% higher than the national average.

- In New Brunswick, the average cost per separation increased by approximately 11% ($5846) between 1993/94 and 1997/98. During this time period, the average cost per separation increased by approximately 8% ($7442) in Canada as a whole with maximum increase of 15% ($7910) in 1995/96.

- The average cost per separation was consistently lower in New Brunswick than in Canada. In 1997/98, the average cost per separation in New Brunswick hospitals was approximately 27% lower than the national average.

Figure 43 Hospital Separations per, 100,000 Population, and Average Cost per Separation in Public Hospitals, New Brunswick and Canada: 1993/94- 1997/98



NOTES TO TABLE 27

Table 27 presents selected utilization and financial statistics for public hospitals in New Brunswick and Canada during the period 1993/94 - 1997/98. These statistics do not include cases treated as outpatients or as patients in mental hospitals. They do include patients treated in psychiatric unit of general and allied special hospitals.

Table 27 Selected Hospital Utilization and Financial Statistics, New Brunswick and Canada: 1993/94 - 1997/98

	Area	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
Total Days	N.B.	1,072,883	1,007,887	960,485	927,148	825,215
	Canada	38,786,281	37,406,402	35,517,367	31,460,392	27,380,152
Days per 100,000 Population	N.B.	142,007	133,012	126,369	131,593	108,288
	Canada	135,129	128,365	120,582	105,667	90,947
Total Separations	N.B.	120,431	118,768	117,722	114,457	109,663
	Canada	3,525,625	3,447,778	3,320,662	3,156,728	3,089,372
Separations per 100,000 Population	N.B.	15,940	15,674	15,488	15,010	14,390
	Canada	12,283	11,832	11,274	10,603	10,262
Average Length of Stay (Days)	N.B.	9.87	8.46	8.16	8.39	7.56
	Canada	11.10	10.80	10.70	10.00	8.90
Average Cost per Patient-Day	N.B.	$576.80	$619.62	$660.39	$691.42	$775.83
	Canada	$628.00	$635.00	$740.00	$739.00	$840.00
Average Cost per Separation	N.B.	$5,270	$5,279	$5,388	$5,803	$5,846
	Canada	$6,903	$6,891	$7,910	$7,364	$7,442
Per Capita Spending on Hospital Care	N.B.	$981.05	$935.41	$972.97	$967.45	$975.74
	Canada	$847.93	$818.20	$792.67	$783.39	$766.24

Sources: New Brunswick Data: - Approved Hospitals (New Brunswick) Annual Report of Financial Services: 1993/94 - 1997/98
National Data: - Health Reports, Catalogue 82-003SI, Hospital Morbidity: 1993/94 - 1994/95
- Health Reports, Catalogue 82-216 Annual, Hospital Morbidity: 1995/96 - 1997/98
- Health Reports, Catalogue 83-246 Part 4 Annual, Hospital Indicators, total Expenses: 1995/96 - 1997/98
- National Health Expenditure Trends, 1975 - 1999, Catalogue 1-895581-74-5, CIHI

NOTES TO FIGURE 44

Figure 44 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for ten major disease classifications (ICD-9 Codes), in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- For both males and females, mental disorders accounted for the most hospital care days, per 1,000 population.
- For males, the second leading cause of hospitalization was diseases of the circulatory system, followed by diseases of the respiratory system and digestive system.
- For females, the second leading cause of hospitalization was diseases of the circulatory system, followed by diseases of the digestive system and diseases of the respiratory system.

Figure 44 Five-Year Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, by Disease Classification and Gender, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98



290-319	Mental Disorders
390-459	Diseases of the Circulatory System
460-519	Diseases of the Respiratory System
520-579	Diseases of the Digestive System
630-676	Complications of Pregnancy, Childbirth & Puerperium
140-208	Malignant Neoplasms
320-389	Diseases of the Nervous System & Sense Organs
800-999	Injury & Poisoning
710-739	Diseases of the Musculoskeletal System & Connective Tissue
580-629	Diseases of the Genitourinary System
240-279	Endocrine, Nutritional & Metabolic Disorders
680-709	Skin & Subcutaneous Tissue

NOTES TO FIGURE 45

Figure 45 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for ten major disease classifications (ICD-9 Codes) in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- For males, the leading cause of hospital separations was diseases of the digestive system, followed by diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory system and genitourinary system.

- For females, the leading cause of hospital separations was complications of pregnancy, childbirth and the puerperium, followed by diseases of the genitourinary system, diseases of the digestive system, and diseases of the respiratory system.

Figure 45 Five-Year Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, by Disease Classification and Gender, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98



ICD - 9 Codes

630-676	Complications of Pregnancy, Childbirth & Puerperium
520-579	Diseases of the Digestive System
390-459	Diseases of the Circulatory System
460-519	Diseases of the Respiratory System
580-629	Diseases of the Genitourinary System
800-999	Injury & Poisoning
320-389	Diseases of the Nervous System
710-739	Diseases of the Musculoskeletal System & Connective Tissue
140-208	Malignant Neoplasms
290-319	Mental Disorders
680-709	Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue
240-279	Endocrine, Nutritional & Metabolic Disorders

NOTES TO TABLE 28

Tables 28 presents hospital utilization data for the major disease classifications during the period 1993/94 to 1997/98. Hospital utilization data provides a broad picture of morbidity in the population. It is important to note that the number of person treated for a given condition is not indicated, an individual could be hospitalized more than once for the same condition in any given year.

The utilization data presented in table 28 includes:

(i) Total hospital care days
(ii) Hospital care days per 1,000 Population
(iii) Total hospital separations
(iv) Hospital separations per 1,000 population

NOTES TO TABLES 29a-e AND TABLES 30a-e

Tables 29a-e present the number of hospital care days per 1,000 population for major disease classifications for males and females in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick in 1993/94 – 1997/98.

Tables 30a-e present the separation rates per 1,000 population for major disease classifications for males and females in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick in 1993/94 – 1997/98.

When comparing regional data, it should be noted that differences in hospital care days (per 1,000 population) and separation rates for some disease categories (e.g., psychiatric care and cancer treatment) may be influenced by the location of treatment centers for these diseases.

A detailed comparison of hospital utilization rates for the five leading disease classifications in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick is provided in the next section of the report.

Table 28

Hospital Utilization for Major Disease Classification by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS and TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 population, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

		Total Hospital Care Days					Care Days per 1,000 Population					Total Number of Separations					Separations per 1,000 Population				
Major Disease Classification	**Sex**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**
Infectious & Parasitic Diseases (001-139)	M	8575	5838	8123	5853	21024	23.1	15.7	18.4	15.7	56.2	1148	1248	1200	1081	1098	3.1	3.3	3.2	2.9	2.9
	F	7965	7479	8357	5834	6608	21.1	19.8	18.8	15.4	17.4	1280	1362	1330	1175	1183	3.4	3.6	3.5	3.1	3.1
Neoplasms: Malignant (140-208) **All Causes**	M	43099	40782	39416	34756	33690	115.9	100.9	105.6	93.0	90.1	3865	4008	3858	3658	3510	10.4	10.8	10.3	9.8	9.4
	F	39335	38185	32208	30718	30709	104.1	100.9	85.0	81.0	80.5	3158	3260	3151	3080	3082	8.4	8.6	8.3	8.1	8.1
Digestive organs & peritoneum (150-159)	M	9359	9230	9235	8376	7382	25.2	24.8	24.8	22.4	19.7	675	719	721	651	557	1.8	1.9	1.8	1.7	1.5
	F	9510	8936	7129	6355	8417	25.2	23.6	18.8	16.8	22.1	532	560	512	480	532	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4
Respiratory & intrathoracic organs (160-165)	M	10291	10125	10179	7774	6861	27.7	27.2	27.3	20.8	18.4	778	771	753	680	612	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6
	F	5466	4757	4436	4210	3439	14.5	12.6	11.7	11.1	9.0	322	335	310	310	312	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
Breast (174-175)	M	57	18	17	17	9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7	3	4	5	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	6500	6251	4211	4073	3231	17.2	16.5	11.1	10.7	8.5	782	776	757	788	701	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8
Genitourinary organs (179-189)	M	12503	10087	8193	7037	7145	33.6	27.1	22.0	18.8	19.1	1314	1264	1193	1037	1088	3.5	3.4	3.2	2.8	2.9
	F	5273	5446	4021	3957	4105	14.0	14.4	10.6	10.4	10.8	549	522	477	450	442	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
Other & unspecified sites (190-199)	M	5181	4841	5651	5378	5611	13.9	13.0	15.1	14.4	15.0	380	435	409	458	478	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3
	F	7279	6940	7140	6346	6536	19.2	18.3	18.9	16.7	17.2	464	502	498	483	487	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases & Immunity Disorders (240-279)	M	14275	9438	10475	8968	10300	38.4	25.3	28.1	24.0	27.6	1053	972	1011	1051	1117	2.8	2.6	2.7	2.8	3.0
	F	14264	11289	10535	10222	10931	37.8	29.8	27.8	27.0	27.6	1282	1325	1393	1321	1443	3.4	3.5	3.7	3.5	3.8
Diseases of Blood & Blood Forming Organs (280-299)	M	3212	2722	2834	2976	2808	8.6	7.3	7.6	8.0	7.5	409	433	467	442	456	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2
	F	3959	3988	4028	3733	3764	10.5	10.5	10.6	9.8	9.9	482	518	609	579	553	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5
Mental Disorders (290-319)	M	53948	102631	266520	174326	98188	145.1	275.5	714.4	466.4	262.8	2341	2666	2789	2747	2767	6.3	7.2	7.5	7.3	7.4
	F	97315	77327	152355	186456	143709	257.6	204.4	402.3	491.7	378.1	3197	3353	3494	3498	3408	8.5	8.9	9.2	9.2	9.0
Other psychoses (295-299)	M	21174	29789	90117	53066	33267	57.0	80.0	241.5	142.0	89.0	792	906	995	1042	1146	2.1	2.4	2.7	2.8	3.1
	F	30071	33614	55984	54775	66279	79.8	88.8	147.8	144.4	174.4	1076	1225	1284	1325	1455	2.8	3.2	3.4	3.5	3.8
Neurotic disorders, personality disorders & other non psychotic (300-316)	M	13956	23267	27672	14053	10823	37.5	62.4	74.2	37.6	28.9	1236	1410	1382	1266	1259	3.3	3.8	3.7	3.4	3.4
	F	25244	27448	26869	19721	23231	66.8	72.5	70.3	52.0	61.1	1837	1847	1841	1764	1568	4.9	4.9	4.9	4.7	4.1

Table 28
(Continued)

Hospital Utilization for Major Disease Classification by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS and TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 population, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

Major Disease Classification	Sex	Total Hospital Care Days					Care Days per 1,000 Population					Total Number of Separations					Separations per 1,000 Populati			
		93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97
Disease of the Nervous System & Sense Organs (320-389) All Causes	M	36616	23636	23349	50070	30483	98.5	63.4	62.6	134.0	81.5	4430	4623	5065	4858	5099	11.9	12.4	13.6	13.0
	F	24628	22394	27085	17975	25219	65.2	59.2	71.5	47.4	66.4	5390	5944	6580	6241	6738	14.3	15.7	17.4	16.5
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system (330-337)	M	14716	4836	10426	25815	20904	39.6	13.0	27.9	69.1	55.9	165	130	182	178	227	0.4	0.3	0.5	0.5
	F	8784	7260	6252	6717	12156	23.2	19.2	16.5	17.7	32.0	192	170	192	200	265	0.5	0.4	0.5	0.5
Other disorders of the central nervous system (340-349)	M	14869	11275	3724	17969	3009	40.0	30.3	10.0	48.1	8.0	393	410	387	352	318	1.1	1.1	1.0	0.9
	F	7118	4569	11227	3187	4203	18.8	12.1	29.6	8.4	11.1	413	424	427	452	465	1.1	1.1	1.1	1.2
Disorders of the eye & adnexa (360-379)	M	5457	5646	5428	5080	5110	14.7	15.2	14.5	13.6	13.7	3382	3552	4012	3821	4040	9.1	9.5	10.8	10.2
	F	6805	7692	7625	6447	6874	18.0	20.3	20.1	17.0	18.1	3953	4411	5182	4792	5232	10.5	11.7	13.7	12.6
Diseases of the Circulatory System (390-459) All Causes	M	101292	88299	88095	92605	75619	272.5	237.0	236.1	247.7	202.3	9269	8590	9291	9227	9322	24.9	23.1	24.9	24.7
	F	90212	83149	73325	66366	69418	238.8	219.8	193.6	175.0	182.6	7230	7158	7469	7434	7412	19.1	18.9	19.7	19.6
Ischemic heart disease (410-414)	M	31394	25586	25977	25151	24112	84.4	68.7	69.6	67.3	64.5	4220	3836	4061	4208	4132	11.4	10.3	10.9	11.3
	F	20579	18457	19042	16877	17266	54.5	48.8	50.3	44.5	45.4	2283	2220	2354	2395	2392	6.0	5.9	6.2	6.3
Other forms of heart disease (420-429)	M	18929	17180	19181	20302	17855	50.9	46.1	51.4	54.3	47.8	2109	1986	2209	2240	2275	5.7	5.3	5.9	6.0
	F	21999	20573	19290	18754	20553	58.2	54.4	50.9	49.5	54.1	2090	2027	2079	2167	2245	5.5	5.4	5.5	5.7
Cerebrovascular disease (430-438)	M	35141	29415	25649	34966	18627	94.5	78.0	68.7	93.5	49.8	1067	1072	1104	1131	1110	2.9	2.9	3.0	3.0
	F	32431	30295	22543	17675	19443	85.9	80.1	59.5	46.6	51.2	983	1040	1126	1131	1110	2.6	2.7	3.0	3.0
Diseases of the Respiratory System (460-519) All Causes	M	57448	51702	54599	49658	45100	154.5	136.8	146.3	132.8	120.9	8683	8442	8652	7853	8172	23.4	22.7	23.2	21.0
	F	48545	45578	46309	39735	42648	128.5	120.5	122.3	104.8	112.2	7839	7899	8108	7142	7291	20.8	20.9	21.4	18.8
Acute respiratory infections (460-466)	M	5859	5446	4840	4180	3907	15.8	14.6	13.0	11.2	10.5	1680	1561	1420	1299	1368	4.5	4.2	3.8	3.5
	F	4945	5465	4215	4017	3371	13.1	14.4	11.1	10.6	8.9	1348	1369	1168	1130	983	3.6	3.8	3.1	3.0
Pneumonia & influenza (480-487)	M	13225	13471	12982	13603	15133	35.6	36.2	34.8	36.4	40.5	1623	1690	1703	1664	1764	4.4	4.5	4.6	4.5
	F	14085	12756	13363	11645	13596	37.3	33.7	35.3	30.7	35.8	1587	1598	1642	1499	1690	4.2	4.2	4.3	4.0
Chronic obstructive pulmonary disease & allied conditions (490-496)	M	28030	21708	21099	16681	17324	75.4	58.3	56.6	44.6	46.3	2787	2485	2529	2385	2453	7.5	6.7	6.8	6.4
	F	20510	17742	18859	16306	17061	54.3	46.9	49.8	43.0	44.9	2539	2491	2395	2117	2220	7.0	6.6	6.3	5.6

Table 28
(Continued)

Hospital Utilization for Major Disease Classification by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS and TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 population, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

		Total Hospital Care Days					Care Days per 1,000 Population					Total Number of Separations					Separations per 1,000 Population				
Major Disease Classification	**Sex**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**
Diseases of the Digestive System (520-579)	M	43272	40486	40474	38692	36295	116.4	108.0	108.5	103.5	97.1	9683	10368	11299	10080	9756	26.0	27.8	30.3	27.0	26.1
	F	49586	47533	47325	44056	43127	131.3	125.6	125.0	116.2	113.5	10679	11337	12383	10793	10581	28.2	30.0	32.7	28.5	27.8
Diseases of oesophagus, stomach and duodenum (530-537)	M	8125	8346	7717	7151	6641	21.9	22.4	20.7	19.1	17.8	2072	2387	2838	2389	2090	5.6	6.4	7.6	6.4	5.6
	F	8125	7990	8376	8061	7012	21.5	21.1	22.1	21.3	18.4	2089	2349	2985	2434	2155	5.5	6.2	7.8	6.4	5.7
Non-infective enteritis & colitis (555-558)	M	5425	5684	5507	4759	4758	14.6	15.2	14.8	12.7	12.7	1120	1265	1347	980	973	3.0	3.4	3.6	2.6	2.6
	F	8975	8841	8782	6980	6821	23.7	23.4	23.2	18.4	17.9	1665	1726	1911	1421	1289	4.4	4.6	5.0	3.7	3.4
Other diseases of the intestines & the peritoneum (560-569)	M	8263	7082	7837	7192	7670	22.2	19.0	21.0	19.2	20.5	1336	1498	1620	1480	1494	3.6	4.0	4.3	3.9	4.0
	F	11807	11499	11759	12028	11909	31.3	30.4	31.1	31.7	31.3	1957	2134	2406	2048	2048	5.2	5.6	6.4	5.4	5.4
Other diseases of digestive system (570-579)	M	12246	11218	11773	11018	10623	32.9	30.1	31.0	29.5	28.4	1700	1706	1893	1773	1726	4.6	4.6	5.1	4.7	4.6
	F	14550	13350	12993	12132	12309	38.5	35.3	34.3	32.0	32.4	2695	2729	2896	2777	2847	7.1	7.2	7.6	7.3	7.5
Diseases of the Genitourinary System (580-629)	M	25930	19513	18899	16584	16165	69.7	52.4	50.7	44.4	43.2	6821	6812	6441	6126	5805	18.3	18.3	17.3	16.4	15.5
	F	37436	34707	33042	30585	28439	99.1	91.7	87.3	80.7	74.8	11494	12417	11866	11219	10052	30.4	32.8	31.3	29.6	26.4
Other diseases of the urinary system (590-599)	M	9938	8380	8897	8134	7299	26.7	22.5	23.8	21.8	19.5	3394	3372	3344	3136	2949	9.1	9.1	9.0	8.4	7.9
	F	10063	10348	9814	9081	8348	26.6	27.3	25.9	23.9	22.0	4271	4782	4106	3898	3288	11.3	12.7	10.8	10.5	8.6
Diseases of the male genital organs (600-608)	M	9462	8299	7002	5252	5302	25.5	22.3	18.8	14.1	14.2	3131	3101	2742	2628	2507	8.4	8.3	7.3	7.0	6.7
	F	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Other disorders of female genital tract (617-629)	M	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	18111	16893	16105	14552	13510	47.9	44.6	42.5	38.4	35.5	5212	5303	5405	5085	4647	13.8	14.0	14.3	13.4	12.2
Complications of Pregnancy, Childbirth & the Peurperium (630-676)	M	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	48752	42124	36972	33666	32250	129.1	111.3	97.6	88.8	84.8	12613	12072	11437	10794	10629	33.4	31.9	30.2	28.5	28.0
Complications mainly related to pregnancy (640-648)	M	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	11563	9566	8259	7193	7618	30.6	25.3	21.8	19.0	20.0	2801	2569	2348	2060	2141	7.4	6.8	6.2	5.4	5.6
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery (650-659)	M	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	20457	16600	14207	12990	11976	54.2	43.9	37.5	34.3	31.5	4646	4219	3884	3726	3576	12.3	11.2	10.3	9.8	9.4
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery (660-669)	M	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	14047	13542	12349	11502	10570	37.2	35.8	32.6	30.3	27.8	3552	3794	3772	3663	3487	9.4	10.0	9.9	9.7	9.2

Table 28
(Continued)

Hospital Utilization for Major Disease Classification by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS and TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 population, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

		Total Hospital Care Days					Care Days per 1,000 Population					Total Number of Separations					Separations per 1,000 Population				
Major Disease Classification	**Sex**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**	**93/94**	**94/95**	**95/96**	**96/97**	**97/98**
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue (680-709)	M	7123	7635	6909	6488	7431	19.2	20.5	18.5	17.4	19.9	1194	1334	1390	1275	1264	3.2	3.6	3.7	3.4	3.4
	F	8532	8727	8716	8256	8788	22.6	17.8	17.7	16.5	15.2	1256	1301	1254	1195	1309	3.3	3.4	3.3	3.2	3.4
Diseases of the Musculoskeletal System & Connective Tissue (710-739)	M	20958	19933	17968	23004	17963	56.4	53.5	48.2	61.5	48.0	4285	4490	4355	4615	4719	11.5	12.1	11.7	12.3	12.6
	F	33279	27979	26985	27373	25673	88.1	73.9	71.3	72.2	67.5	4770	4792	4764	5135	5234	12.6	12.7	12.6	13.5	13.8
Arthropathies & related disorders (710-719)	M	8959	8578	8442	9515	7935	24.1	23.0	22.6	25.5	21.2	2027	2143	2160	2382	2424	5.5	5.8	5.8	6.4	6.5
	F	16562	12252	13031	12379	11927	43.8	32.4	34.4	32.6	31.4	2086	2104	2227	2397	2446	5.5	5.6	5.9	6.3	6.4
Dorsopathies (720-724)	M	6992	6062	4672	4771	5010	18.8	16.3	13.1	12.8	13.4	993	902	821	819	801	2.7	2.4	2.2	2.2	2.1
	F	7718	7181	6022	6024	5364	20.4	19.0	15.9	15.9	14.1	969	810	814	857	817	2.6	2.1	2.1	2.3	2.1
Osteopathies, chondropathies & acquired musculoskeletal deformities (730-739)	M	3116	3137	2729	6733	2302	8.4	8.4	7.3	18.0	6.2	465	496	483	507	458	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2
	F	6074	5479	4847	5668	4627	16.1	14.5	12.8	14.9	12.2	739	756	722	743	724	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9
Congenital Anomalies (740-749)	M	1324	2052	10020	1216	1567	3.6	5.5	26.9	3.3	4.2	470	522	514	480	485	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
	F	1894	1713	1374	1429	1045	5.0	4.5	3.6	3.8	2.7	472	439	438	385	371	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period (760-779)	M	570	530	320	908	1116	1.5	1.4	0.9	2.4	3.0	75	82	68	141	121	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
	F	1795	1758	1121	361	667	4.8	4.6	3.0	1.0	1.8	163	193	183	81	88	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions (780-799)	M	22987	20225	21872	19684	19376	61.8	54.3	58.8	52.7	51.8	4211	4415	4699	4422	4537	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
	F	25425	26905	25357	23793	26943	67.3	71.1	67.0	62.6	70.9	4838	5182	5409	5122	5233	12.8	13.7	14.3	13.5	13.8

Table 28
(Continued)

Hospital Utilization for Major Disease Classification by Sex According to TOTAL HOSPITAL CARE DAYS and TOTAL NUMBER OF SEPARATIONS, per 1,000 population, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98

		Total Hospital Care Days					Care Days per 1,000 Population					Total Number of Separations					Separations per 1,000 Population				
Major Disease Classification	Sex	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98
Injury & Poisoning (800-999)	M	37997	32933	28392	26932	26507	102.2	88.4	76.1	72.1	70.9	5224	5211	5100	4996	4854	14.1	14.0	13.7	13.4	13.0
	F	41726	33068	33564	29998	26581	110.5	87.4	88.9	79.1	75.2	3887	3857	3955	3921	3757	10.3	10.2	10.4	10.3	9.9
Fracture of skull (800-804)	M	1456	1136	1475	1270	1041	3.9	3.0	4.0	3.4	2.8	335	300	312	296	300	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
	F	508	353	342	432	236	1.3	0.9	0.9	1.1	0.6	77	97	81	90	73	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
Fracture of spine & trunk (805-809)	M	3054	2619	2425	2959	2555	8.2	7.0	6.5	7.9	6.8	245	255	215	258	244	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	F	3261	3027	3059	3302	2239	8.6	8.0	8.1	8.7	5.9	207	197	204	229	181	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
Fracture of upper limb (810-819)	M	1282	1474	1395	1788	1408	3.4	4.0	3.7	4.8	3.8	530	596	544	621	633	1.4	1.6	1.5	1.7	1.7
	F	2356	1908	1777	2535	1989	6.2	5.0	4.7	6.7	5.2	407	407	391	461	472	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2
Fracture of lower limb (820-829)	M	7025	6545	6443	5858	6247	18.9	17.6	17.3	15.7	16.7	731	750	654	708	702	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9
	F	13925	13445	12608	11489	11296	36.9	35.5	33.3	30.3	29.7	829	789	866	870	844	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2
Sprains & strains of joints & adjacent muscles (840-848)	M	1041	818	664	831	789	2.8	2.2	1.8	2.2	2.1	263	257	240	221	231	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	F	976	740	633	592	530	2.6	2.0	1.7	1.6	1.4	174	168	137	142	130	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
Intracranial injury, excluding those with skull fracture (850-854)	M	1872	4517	1626	1071	1096	5.0	12.1	4.4	2.9	2.9	315	293	280	256	221	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
	F	7660	832	2208	886	637	20.3	2.2	5.8	2.3	1.7	166	140	136	147	138	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Internal injury of chest, abdomen & pelvis(860-869)	M	746	711	614	542	666	2.0	1.9	2.2	1.5	2.4	100	96	111	86	106	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	F	348	251	387	250	294	0.9	0.7	1.0	0.7	0.8	23	31	34	26	37	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Contusion with intact skin surface (920-924)	M	632	976	512	712	598	1.7	2.6	1.4	1.9	1.6	182	171	152	165	167	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	F	930	700	1010	802	620	2.5	1.9	2.7	2.1	1.6	134	143	151	145	120	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Burns (940-949)	M	1323	1328	1229	1316	1483	3.6	3.6	3.3	3.5	4.0	124	100	94	118	93	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	F	495	634	593	190	462	1.3	1.7	1.6	0.5	1.2	37	46	35	26	31	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Certain traumatic complications & unspecified injuries (958-959)	M	423	377	419	490	386	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	112	83	105	102	82	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	F	600	437	607	309	279	1.6	1.2	1.6	0.8	0.7	75	66	90	70	53	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Poisoning by drugs, medicaments & biological substances (960-979)	M	1182	1031	988	974	799	3.2	2.8	2.6	2.6	2.1	279	319	306	265	249	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
	F	2195	1839	1513	1257	1233	5.8	4.8	4.0	3.3	3.2	453	454	394	367	347	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source (980-989)	M	157	360	528	112	136	0.4	1.0	1.4	0.3	0.4	73	64	59	64	45	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	F	119	201	132	104	224	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6	43	52	32	32	42	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Complications of surgical & medical care not elsewhere classified (996-999)	M	9155	7917	6376	6364	6512	24.6	21.2	17.1	17.0	17.4	844	819	877	859	873	2.3	2.2	2.0	2.3	2.3
	F	7333	6941	7204	6117	7161	19.4	18.3	19.0	16.1	18.8	777	775	895	840	893	2.1	2.0	2.4	2.2	2.3
In error / unknown	M	193681	199979	320870	273080	262172	519.8	536.0	858.4	730.4	702.6	26089	27824	29428	27475	27700	70.2	74.7	78.9	73.5	74.1
	F	245334	198457	232939	280511	234993	648.4	524.1	614.3	738.0	618.6	31519	36393	35124	31940	32397	83.4	96.2	92.8	84.2	85.2

Source: N.B. Department of Health and Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database.

Table 29a

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	23.1	25.2	22.1	14.6	15.1	38.0	38.6	22.2	15.9	29.3
	F	21.1	25.6	19.1	14.7	18.8	24.4	13.3	41.5	21.0	36.4
Neoplasms: Malignant	M	115.9	119.6	114.2	130.3	121.0	89.3	118.4	134.0	98.9	147.6
All causes	F	104.1	95.5	107.9	125.0	103.5	93.7	86.7	141.7	68.6	121.4
Digestive organs & peritoneum	M	13.6	13.6	13.7	15.0	12.1	14.0	18.9	16.9	7.9	15.8
	F	15.0	14.3	15.3	15.5	15.8	14.6	16.0	16.8	10.0	18.2
Respiratory & intra-thoracic organs	M	25.6	31.4	23.0	28.7	18.9	21.3	49.6	38.8	21.8	24.6
	F	14.3	15.6	13.7	17.7	11.7	11.5	13.1	30.6	12.6	13.6
Breast	M	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
	F	17.2	16.7	17.4	26.0	12.1	14.0	11.1	28.6	17.1	14.1
Genitourinary organs	M	25.0	18.1	28.2	22.2	45.5	15.8	9.4	28.9	14.6	26.1
	F	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Other & unspecified sites	M	51.5	56.6	49.2	64.0	44.3	38.2	40.5	49.3	54.4	81.1
	F	57.6	49.0	61.4	65.9	63.9	53.6	46.5	65.7	29.0	75.6
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	38.4	30.1	42.1	63.2	36.3	25.3	27.0	48.3	27.6	26.0
	F	37.8	40.7	36.5	37.1	41.4	30.3	35.9	58.4	40.4	34.3
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	8.6	10.0	8.0	9.1	7.6	7.3	11.1	7.7	10.7	9.1
	F	10.5	12.1	9.8	10.3	9.2	9.9	12.7	19.8	10.6	8.8
Mental Disorders	M	145.1	110.9	160.6	167.6	153.8	160.3	180.8	97.6	97.4	71.0
	F	257.6	179.9	291.6	254.7	484.1	115.5	223.2	353.5	122.2	118.0
Other psychoses	M	57.0	50.2	60.0	81.3	41.5	56.7	89.3	28.6	64.7	19.4
	F	79.6	72.5	82.7	120.4	79.1	44.6	85.8	121.3	61.8	44.2
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	37.5	48.0	33.7	49.7	16.6	34.8	75.7	61.9	26.9	38.6
	F	67.6	79.5	62.4	85.0	54.6	46.0	105.4	114.1	55.2	70.6
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	98.5	63.1	114.5	80.5	121.5	144.2	68.0	116.6	55.0	38.3
	F	65.2	71.7	62.3	55.5	91.1	37.6	112.3	111.9	41.7	53.5
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	39.6	29.2	44.3	39.9	54.2	38.2	36.3	81.5	19.2	6.3
	F	23.2	21.8	23.8	11.6	50.9	6.8	50.2	18.5	11.9	10.6
Other disorders of the central nervous systm	M	40.0	11.2	53.0	22.2	50.7	89.4	11.5	6.5	14.0	9.0
	F	18.8	24.0	16.6	18.5	21.7	8.7	37.1	63.1	6.5	14.2
Disorders of the eye & adnexa	M	14.7	18.5	13.0	15.3	11.4	12.1	17.0	23.8	18.4	16.7
	F	18.0	21.4	16.5	19.4	13.1	17.2	19.4	26.8	19.0	24.3

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	272.5	247.0	283.9	255.1	382.5	208.5	255.3	279.7	238.3	233.0
	F	238.8	227.3	243.8	197.5	346.0	180.2	282.6	294.2	184.5	197.7
Ischemic heart disease	M	84.4	87.1	83.2	75.8	96.4	77.2	91.7	78.4	92.2	79.2
	F	54.5	62.2	51.1	51.8	51.0	50.4	68.7	92.3	49.9	56.6
Other forms of heart disease	M	50.9	52.1	50.4	55.8	50.9	43.8	58.7	45.6	50.7	52.0
	F	58.2	57.1	58.7	58.1	66.4	50.8	80.2	68.0	42.2	51.1
Cerebrovascular disease	M	94.5	80.1	110.0	88.5	185.4	51.8	56.2	94.5	50.6	58.9
	F	85.9	48.1	103.2	66.1	194.3	42.0	49.8	71.6	36.1	42.7
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	154.5	192.3	137.4	124.2	149.8	138.6	157.4	212.3	224.7	159.6
	F	128.5	173.3	108.9	104.8	116.1	105.4	133.5	214.7	175.3	185.4
Acute respiratory infections	M	15.8	22.2	12.8	14.6	10.7	13.2	21.1	12.1	25.0	25.1
	F	13.1	20.4	9.9	11.6	6.6	11.7	22.1	14.2	21.8	20.1
Pneumonia & influenza	M	35.6	43.2	32.1	26.0	35.9	34.8	25.7	47.8	51.6	43.9
	F	37.3	49.0	32.2	29.3	34.0	33.3	33.5	62.9	45.2	63.1
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	75.4	92.3	67.8	57.1	79.3	67.0	84.8	131.9	98.4	64.6
	F	54.3	73.2	46.0	38.1	56.9	42.6	46.9	120.9	71.6	72.7
Diseases of the Digestive System	M	116.4	160.0	96.7	98.3	103.8	87.2	141.3	213.1	156.6	151.6
	F	131.3	181.4	109.3	98.6	107.0	124.1	155.7	249.1	186.5	155.0
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	21.9	36.0	15.5	12.5	19.1	14.9	26.4	69.0	33.3	29.6
	F	21.5	37.4	14.6	10.6	13.2	20.5	28.3	60.9	36.8	32.6
Non-infective enteritis & colitis	M	14.6	23.0	10.8	10.1	11.4	10.9	18.9	32.5	27.9	13.0
	F	23.8	34.5	19.1	15.2	20.4	21.8	30.4	39.1	41.8	23.0
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	22.2	28.7	19.3	18.8	22.5	16.4	22.6	28.6	27.6	36.8
	F	31.3	40.8	27.1	21.9	28.2	31.5	38.0	57.7	43.2	28.6
Other diseases of digestive system	M	32.9	42.1	28.8	30.8	26.4	27.1	39.5	50.8	38.8	44.8
	F	38.5	47.1	34.7	36.9	31.3	36.3	39.8	72.0	42.3	46.5
Diseases of the Genitourinary System	M	69.7	70.0	69.6	57.5	98.1	51.9	69.0	75.7	75.5	58.1
	F	99.1	138.8	81.7	87.3	77.5	80.2	125.6	118.6	144.3	157.0
Other diseases of the urinary system	M	26.7	28.6	25.9	28.2	30.5	20.6	15.4	37.8	34.8	25.5
	F	26.6	27.7	26.2	27.5	30.2	20.2	19.6	33.7	26.0	29.9
Diseases of male genital organs	M	25.5	30.1	23.3	24.5	19.4	26.3	33.9	29.9	30.0	26.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	47.9	68.5	38.9	36.6	37.1	43.7	88.1	61.8	53.1	78.8
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	129.1	133.5	127.1	125.5	125.5	130.7	124.2	134.0	123.5	160.9
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.6	34.0	29.1	32.6	27.7	27.0	28.6	31.5	28.7	50.9
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	54.2	57.8	52.5	51.4	55.8	50.1	46.6	66.9	54.9	69.2
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	37.2	34.8	38.2	33.4	37.0	45.0	42.8	28.6	34.5	31.0
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	19.2	15.7	20.7	22.6	18.5	21.0	12.4	33.8	14.0	10.5
	F	22.6	18.9	24.2	23.8	20.2	29.2	16.7	29.8	17.8	15.7
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	56.4	61.2	54.2	52.0	50.4	60.7	64.4	70.5	51.8	68.3
	F	88.1	103.9	81.2	66.1	79.5	100.0	173.5	113.0	63.5	93.2
Arthropathies & related disorders	M	24.1	22.8	24.7	20.8	22.7	31.1	30.9	22.5	15.2	27.7
	F	43.8	51.8	40.3	27.5	42.3	52.5	103.2	50.3	24.8	44.5
Dorsopathies	M	18.8	23.3	16.8	17.0	15.7	17.7	21.5	27.8	21.7	25.0
	F	20.4	25.5	18.2	14.1	18.6	22.3	19.5	37.7	23.0	28.3
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	8.4	9.8	7.7	8.6	8.6	5.8	8.1	13.0	8.4	12.0
	F	16.1	16.9	15.7	16.2	12.9	18.3	38.0	8.7	8.5	14.3
Congenital Anomalies	M	3.6	4.6	3.1	3.8	2.5	2.9	2.6	2.8	5.2	6.8
	F	5.0	8.2	3.6	2.9	4.0	3.9	2.8	6.6	8.0	15.7
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	1.5	1.6	1.5	0.7	0.3	3.7	2.6	1.6	1.5	0.7
	F	4.8	6.9	3.8	8.0	1.6	1.6	4.2	5.6	8.1	8.9
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	61.8	53.8	65.4	81.8	38.1	77.3	65.3	51.7	51.1	48.0
	F	67.3	70.6	65.9	75.4	66.3	54.7	92.9	93.0	50.3	67.0

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	102.2	135.7	87.1	79.3	104.9	76.3	96.8	90.0	87.5	287.0
	F	110.5	87.3	120.6	105.7	165.5	86.6	109.7	106.5	65.9	87.6
Fracture of skull	M	3.9	4.5	3.7	5.1	3.4	2.3	2.7	2.5	5.5	5.8
	F	1.3	1.2	1.4	3.0	0.5	0.5	0.1	0.2	1.7	2.4
Fracture of spine & trunk	M	8.2	11.4	6.8	6.8	4.4	9.4	12.1	14.3	10.7	10.0
	F	8.6	9.4	8.3	8.1	7.3	9.5	15.5	16.5	4.6	6.6
Fracture of upper limb	M	3.4	4.5	3.0	2.7	2.9	3.3	6.0	2.4	3.9	5.4
	F	6.2	3.9	7.3	8.8	5.3	7.8	5.5	7.2	1.5	4.1
Fracture of lower limb	M	18.9	18.0	19.3	21.9	17.9	17.9	18.7	25.9	13.3	20.5
	F	35.2	25.1	39.6	51.1	36.6	30.1	30.9	36.7	19.3	21.4
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	2.8	4.2	2.2	2.1	1.7	2.7	4.4	4.1	3.5	5.3
	F	2.6	4.6	1.7	1.1	1.5	2.5	2.4	8.6	3.5	6.2
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	5.0	5.3	4.9	5.6	5.3	3.8	10.0	0.6	5.2	3.5
	F	20.3	1.4	28.5	5.0	76.1	1.2	0.6	0.8	0.9	3.5
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.9	2.0	4.0	0.4	3.3
	F	0.9	0.4	1.1	1.4	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.4
Contusion with intact skin surface	M	1.7	2.3	1.4	0.8	1.6	1.8	2.9	0.9	2.4	2.6
	F	2.5	3.0	2.2	2.5	2.6	1.5	3.9	5.5	2.0	2.0
Burns	M	3.6	4.0	3.4	2.9	4.4	2.7	2.8	6.4	4.0	3.8
	F	1.3	1.4	1.3	1.2	1.8	0.7	0.6	0.0	2.7	0.8
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	1.1	1.9	0.8	0.6	0.6	1.3	2.6	1.3	1.3	2.5
	F	1.6	2.4	1.3	0.6	0.6	2.8	0.8	0.5	2.3	5.5
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	3.2	4.6	2.5	1.8	3.2	2.7	6.4	5.0	4.5	2.5
	F	5.8	10.2	3.9	2.5	3.6	5.7	18.3	7.5	7.4	8.3
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.4	0.5	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2	0.9	0.3	0.8
	F	0.3	0.4	0.3	0.1	0.6	0.1	0.6	0.7	0.2	0.4
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	24.6	18.8	27.3	18.0	44.7	18.4	15.1	16.3	21.7	19.1
	F	19.4	19.2	19.5	16.1	24.3	17.9	24.5	17.8	14.7	22.4

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29b

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	15.7	20.0	13.7	13.8	12.4	15.1	13.2	23.4	23.4	19.1
	F	19.8	22.3	18.7	20.3	18.2	17.4	15.7	34.7	21.2	23.0
Neoplasms: Malignant All causes	M	109.5	117.7	105.8	150.7	85.5	78.2	120.2	123.3	101.9	138.9
	F	100.9	107.2	98.2	114.8	95.8	82.3	91.0	160.5	101.0	99.9
Digestive organs & peritoneum	M	13.5	14.8	12.8	19.0	8.1	11.2	22.1	11.6	8.6	20.0
	F	13.4	11.4	14.3	14.8	15.0	13.1	8.7	16.2	12.0	9.9
Respiratory & intra-thoracic organs	M	23.1	31.1	19.5	23.5	19.5	15.3	42.4	47.3	17.0	33.7
	F	12.3	12.3	12.4	14.1	11.2	11.7	8.0	23.4	7.3	18.1
Breast	M	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	16.5	16.7	15.6	21.1	17.1	7.7	10.4	45.8	16.2	14.0
Genitourinary organs	M	17.3	16.2	17.9	26.1	13.8	13.2	9.6	16.8	17.1	20.8
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	55.5	55.6	55.5	82.2	44.1	38.4	46.1	47.6	59.1	64.4
	F	58.6	64.8	55.9	64.8	52.6	49.8	63.8	75.1	65.4	57.9
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	25.3	29.7	23.4	18.4	28.8	23.0	28.2	35.7	27.9	30.4
	F	29.8	41.3	24.8	21.4	23.8	29.8	34.8	51.4	39.4	45.2
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	7.3	8.7	6.7	8.4	5.4	6.2	10.6	11.6	7.5	6.9
	F	10.5	13.0	9.5	9.4	10.5	8.5	10.3	16.4	14.5	10.9
Mental Disorders	M	275.5	422.8	209.5	192.2	316.3	113.3	903.6	213.4	407.1	85.4
	F	204.4	271.8	175.1	167.1	202.8	152.9	261.1	393.1	299.7	153.4
Other psychoses	M	80.0	138.7	53.7	76.2	44.7	38.5	415.3	56.0	60.5	40.3
	F	88.8	128.6	71.5	81.1	75.9	56.0	136.2	105.9	167.6	67.2
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	62.4	83.9	52.9	102.6	28.9	24.1	224.7	69.7	34.3	33.2
	F	72.5	88.1	65.8	68.5	47.7	83.0	99.1	183.3	52.4	75.1
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	63.4	93.1	50.2	65.4	52.4	31.0	43.4	34.3	170.4	47.9
	F	59.2	53.0	61.9	52.9	81.6	49.9	71.1	60.6	43.6	44.5
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	13.0	6.5	15.9	33.5	5.7	7.5	6.4	3.8	9.6	3.1
	F	19.2	9.2	23.5	13.5	43.8	12.1	14.8	20.3	3.3	5.8
Other disorders of the central nervous systm	M	30.3	64.5	14.9	6.4	31.0	7.0	10.7	10.9	138.4	26.0
	F	12.1	15.2	10.7	10.0	13.2	8.7	23.0	14.7	11.8	12.9
Disorders of the eye & adnexa	M	15.2	16.5	14.6	20.2	10.5	12.7	16.3	14.9	16.6	17.6
	F	20.3	23.3	19.0	20.9	18.4	17.7	25.9	21.0	22.6	22.9

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	237.0	214.4	247.1	229.8	225.1	289.9	201.4	209.4	214.1	231.6
	F	219.8	208.5	224.7	196.1	297.2	175.6	198.7	234.7	190.4	233.3
Ischemic heart disease	M	68.7	77.3	64.8	73.9	53.4	67.1	79.4	86.0	67.2	87.3
	F	48.8	52.3	47.2	51.0	45.9	44.5	52.1	46.7	45.6	68.1
Other forms of heart disease	M	46.1	48.4	45.1	46.7	47.0	41.3	48.7	51.3	55.1	34.7
	F	54.4	54.2	54.5	54.8	59.1	48.8	59.1	74.2	44.6	52.2
Cerebrovascular disease	M	79.0	51.2	91.4	61.8	85.7	130.1	28.8	48.3	53.9	71.4
	F	80.1	54.2	91.3	57.7	161.1	50.9	39.4	58.8	51.4	72.0
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	138.8	165.2	126.9	116.2	128.0	137.6	154.6	174.9	174.5	154.0
	F	120.5	152.5	106.5	101.5	90.1	130.5	134.7	164.4	148.2	171.3
Acute respiratory infections	M	14.6	22.8	11.0	14.4	7.9	10.5	20.2	16.1	28.5	16.7
	F	14.4	20.3	11.9	13.3	8.1	14.7	20.0	15.7	22.1	19.6
Pneumonia & influenza	M	36.2	42.6	33.3	36.2	30.7	32.8	38.4	33.7	46.7	45.5
	F	33.7	38.4	31.7	31.8	30.5	33.0	29.2	36.9	37.8	50.4
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	58.3	67.5	54.1	42.1	70.6	49.6	65.7	96.6	66.8	52.4
	F	46.9	66.7	38.3	32.2	38.6	44.6	56.9	94.0	58.5	73.7
Diseases of the Digestive System	M	108.7	141.5	94.0	99.1	93.1	89.3	130.9	171.2	137.9	140.0
	F	125.6	172.8	105.1	98.8	104.4	113.0	163.5	205.7	183.4	142.6
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	22.4	34.4	17.0	19.4	18.9	12.5	26.0	44.0	33.8	38.1
	F	21.1	36.7	14.4	11.0	16.9	15.2	34.2	62.6	32.6	29.1
Non-infective enteritis & colitis	M	15.2	22.7	11.9	11.6	12.3	11.7	14.7	28.2	26.5	26.1
	F	23.4	35.3	18.2	16.6	16.0	22.4	30.6	35.6	42.8	21.4
Other diseases of the intestines & pertoneum	M	19.0	21.3	18.0	17.3	18.2	18.4	18.5	32.0	21.3	17.7
	F	30.4	40.8	25.9	22.4	28.1	27.2	42.8	43.7	43.4	32.0
Other diseases of digestive system	M	30.1	34.3	28.2	28.7	26.2	30.0	34.1	36.5	31.4	38.0
	F	35.3	41.7	32.5	34.1	29.5	34.0	39.4	38.7	45.5	39.7
Diseases of the Genitourinary System	M	52.4	59.7	49.1	56.8	46.5	43.4	53.3	63.1	69.0	48.1
	F	91.7	116.6	80.9	84.3	79.9	78.4	121.0	147.7	99.3	121.2
Other diseases of the urinary system	M	22.5	24.4	21.7	22.6	23.7	18.3	13.7	32.5	28.8	22.6
	F	27.3	29.3	26.5	26.2	31.4	21.4	21.4	51.5	23.8	32.6
Diseases of male genital organs	M	22.3	27.9	19.8	25.2	15.5	18.4	33.7	27.4	31.7	15.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	44.6	62.6	36.8	35.4	33.9	41.7	77.4	64.4	52.6	62.8
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	111.3	114.2	110.1	110.7	103.2	117.0	107.0	117.9	109.6	127.7
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	25.3	30.0	23.2	26.9	23.4	18.9	26.8	34.4	26.7	36.4
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	43.9	47.6	42.2	42.0	45.3	39.1	36.2	51.3	47.2	58.4
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	35.8	30.4	38.1	34.9	30.5	50.3	37.1	26.6	31.1	24.3
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	20.5	18.7	21.3	18.7	22.3	23.0	15.5	24.4	22.1	12.6
	F	17.8	17.9	17.7	14.4	18.1	20.9	16.4	20.6	17.6	18.4
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	53.5	51.2	54.5	47.5	55.4	61.3	65.2	54.5	43.1	48.7
	F	73.9	77.3	72.5	58.9	76.7	82.9	88.2	97.9	62.2	78.2
Arthropathies & related disorders	M	23.0	18.1	25.2	20.2	22.7	33.4	24.4	16.2	15.3	17.7
	F	32.4	29.6	33.6	23.8	36.2	41.6	30.0	46.3	22.6	30.3
Dorsopathies	M	16.3	20.6	14.4	11.2	17.1	14.9	26.0	28.9	15.7	18.1
	F	19.0	24.1	16.7	13.3	18.3	18.9	26.8	34.0	19.2	23.1
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	8.4	6.2	9.4	10.0	11.1	7.0	7.0	5.6	5.5	6.7
	F	14.5	14.1	14.8	14.1	15.3	14.6	19.1	8.8	10.4	18.7
Congenital Anomalies	M	5.5	8.2	4.3	3.9	2.6	6.6	7.0	9.9	10.5	4.3
	F	4.5	4.9	4.4	4.3	2.9	6.1	2.9	5.5	5.7	5.2
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	1.4	2.4	1.0	1.2	0.3	1.4	2.8	3.8	2.2	1.7
	F	4.6	8.6	2.9	3.9	2.8	2.0	7.6	4.1	10.1	10.0
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	54.3	58.2	52.5	66.7	40.8	49.6	54.4	68.0	57.0	58.2
	F	71.1	81.2	66.7	94.0	45.1	60.4	81.1	124.3	61.7	86.8

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days* , per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	88.4	88.0	88.6	116.3	79.1	68.4	104.1	90.1	67.9	104.5
	F	87.4	86.6	87.8	102.1	85.1	74.7	86.2	106.4	68.7	105.0
Fracture of skull	M	3.0	2.2	3.4	2.3	5.4	2.6	1.7	1.8	2.2	2.9
	F	0.9	1.2	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4
Fracture of spine & trunk	M	7.0	8.2	6.5	4.2	6.2	9.4	15.0	4.8	3.6	11.3
	F	8.0	9.8	7.2	8.3	7.1	6.0	7.6	9.4	7.9	16.0
Fracture of upper limb	M	4.0	5.1	3.4	3.7	2.8	3.8	6.9	7.0	3.5	4.9
	F	5.0	5.2	5.0	5.7	4.1	5.1	2.9	12.1	4.2	4.8
Fracture of lower limb	M	17.6	18.5	17.1	18.9	15.2	17.3	21.4	30.4	14.5	15.0
	F	35.5	28.2	38.7	51.7	34.7	28.7	32.8	50.4	20.3	22.4
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	2.2	2.9	1.9	2.5	1.4	1.7	3.0	4.2	2.0	3.5
	F	2.0	2.8	1.6	1.3	1.3	2.3	1.6	4.1	3.5	2.0
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	12.1	3.8	15.9	33.3	10.6	2.4	3.0	3.8	4.8	2.8
	F	2.2	1.1	2.7	4.1	1.5	2.4	2.1	0.5	0.9	0.9
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	1.9	3.0	1.4	1.7	1.1	1.5	3.3	2.7	3.9	1.3
	F	0.7	0.5	0.7	0.9	0.3	1.0	0.6	0.7	0.6	0.0
Contusion with intact skin surface	M	2.6	4.0	2.0	2.4	1.4	2.3	7.0	2.4	1.4	6.2
	F	1.9	2.4	1.6	1.2	1.6	2.1	1.9	1.9	3.4	1.3
Burns	M	3.6	5.9	2.5	3.2	2.1	2.2	7.0	6.6	3.2	9.1
	F	1.7	3.0	1.1	1.3	1.7	0.1	0.2	1.0	1.1	11.0
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	1.0	1.6	0.8	1.0	0.5	0.9	0.6	2.9	1.9	1.1
	F	1.2	2.0	0.8	0.4	0.7	1.5	1.8	0.0	2.0	3.4
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	2.8	4.6	1.9	2.0	1.5	2.3	6.3	3.4	3.8	5.3
	F	4.9	7.0	4.0	3.9	3.3	4.7	7.9	6.9	5.6	8.4
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	1.0	1.1	0.9	1.8	0.3	0.7	1.1	0.5	0.6	2.1
	F	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.1	0.3	0.5	0.4	0.7
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	21.2	16.5	23.4	33.9	23.1	12.2	17.3	12.0	10.7	28.6
	F	18.3	16.2	19.3	18.1	24.1	15.1	15.1	14.1	13.6	23.2

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29c

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	16.4	19.1	15.2	15.9	13.8	16.0	17.4	26.3	18.0	18.3
	F	16.8	20.2	15.3	15.0	10.6	20.8	19.6	24.4	19.8	18.8
Neoplasms: Malignant	M	105.6	124.5	97.3	144.2	65.6	79.6	128.7	177.3	109.8	112.6
All causes	F	85.0	89.2	83.2	115.4	61.5	71.5	72.2	131.7	91.1	76.1
Digestive organs & peritoneum	M	11.7	12.3	11.5	14.3	9.1	11.0	11.0	19.8	10.8	11.6
	F	11.8	11.2	12.0	15.8	9.3	10.7	10.6	12.9	11.5	10.3
Respiratory & intra-thoracic organs	M	24.5	35.3	19.8	30.8	13.7	14.1	52.1	61.8	26.3	16.8
	F	11.2	10.2	11.6	19.0	7.5	8.0	8.7	25.6	6.4	8.1
Breast	M	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3
	F	11.1	14.9	9.5	13.7	7.7	6.8	9.0	15.0	16.5	18.4
Genitourinary organs	M	13.3	15.9	12.1	20.2	7.2	8.4	11.8	9.9	16.8	22.5
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	56.0	60.9	53.9	78.8	35.6	46.1	53.8	85.8	55.9	61.5
	F	51.0	52.9	50.1	66.9	37.0	46.0	43.9	78.1	56.7	39.3
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	28.1	23.9	29.9	31.1	32.6	25.9	19.3	32.0	22.9	25.2
	F	27.8	36.9	23.9	19.3	26.5	26.2	41.5	44.1	38.3	24.6
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	7.6	10.8	6.2	8.2	6.3	3.9	8.0	12.1	12.3	10.3
	F	10.6	13.3	9.5	11.0	9.4	7.9	8.6	18.4	17.1	8.5
Mental Disorders	M	714.4	1761.5	251.1	240.1	257.9	256.0	629.3	9970.1	107.0	664.4
	F	402.3	897.1	189.6	160.1	226.0	182.1	860.3	2626.7	665.6	182.4
Other psychoses	M	241.5	608.1	79.4	148.9	57.6	26.2	78.3	3924.2	61.6	28.1
	F	147.8	322.7	72.6	83.8	68.6	64.6	143.1	1410.6	149.2	96.0
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	74.2	170.4	31.6	33.1	29.7	32.0	55.6	948.1	30.6	44.5
	F	76.3	135.5	50.8	52.3	61.8	36.9	174.1	314.9	84.5	62.8
Diseases of the Nervous System & Sense Organs	M	62.6	34.2	75.2	112.7	35.1	76.8	37.2	33.7	33.2	32.7
	F	71.5	42.5	84.0	37.3	174.1	36.4	46.5	35.4	40.5	46.5
All Causes											
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	27.9	6.4	37.5	46.4	14.0	52.7	4.3	6.6	8.8	4.3
	F	16.5	8.9	19.8	3.5	48.3	6.4	7.8	7.8	10.1	8.8
Other disorders of the central nervous systm	M	10.0	9.5	10.2	16.5	4.2	9.7	11.7	12.6	8.3	7.2
	F	29.6	8.7	38.6	6.1	99.9	7.2	11.1	8.1	7.5	8.8
Disorders of the eye & adnexa	M	14.5	15.9	14.0	17.2	12.1	12.4	18.1	12.6	14.6	17.7
	F	20.1	21.6	19.5	23.4	16.8	18.3	21.8	14.9	20.9	27.0

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	236.1	219.0	243.7	307.4	209.5	210.1	224.1	[illegible]	197.0	230.5
	F	193.6	205.9	188.4	212.4	194.9	154.3	218.5	249.3	[illegible]	210.6
Ischemic heart disease	M	69.6	74.2	67.6	79.8	53.9	68.8	70.7	78.0	73.3	77.2
	F	50.3	58.2	46.9	47.4	42.1	51.5	52.9	70.4	50.0	70.6
Other forms of heart disease	M	51.4	49.7	52.2	66.0	47.8	41.6	49.7	54.9	46.9	51.2
	F	50.9	54.3	49.5	56.3	50.1	41.2	60.3	68.9	46.6	51.6
Cerebrovascular disease	M	68.7	51.1	76.6	96.5	66.5	65.4	52.9	71.5	36.7	61.6
	F	59.5	50.2	63.6	80.6	71.7	35.5	55.3	68.5	40.3	49.6
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	146.3	152.8	143.5	104.1	115.5	216.7	149.6	130.4	165.2	148.6
	F	122.3	151.5	109.7	114.3	106.0	106.8	120.1	179.3	157.1	157.3
Acute respiratory infections	M	13.0	20.1	9.8	10.3	6.8	12.4	18.0	16.5	24.0	17.8
	F	11.1	16.3	8.9	10.6	4.0	12.4	15.9	12.4	18.2	16.1
Pneumonia & influenza	M	34.8	40.7	32.2	30.2	33.7	32.8	30.4	36.3	47.7	42.0
	F	35.3	41.5	32.6	28.6	35.4	33.9	22.7	57.3	43.1	49.1
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	56.6	63.3	53.6	35.5	52.5	74.6	72.2	64.5	58.1	62.4
	F	49.8	65.0	43.3	45.5	36.9	45.6	53.9	91.4	58.0	71.6
Diseases of the Digestive System	M	108.5	135.9	96.3	112.1	85.1	91.0	107.3	157.4	140.5	144.5
	F	125.0	175.3	103.3	106.3	97.0	106.9	169.8	218.0	179.8	144.7
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	20.7	26.9	17.9	23.2	15.7	14.4	17.4	36.7	26.9	30.7
	F	22.1	32.9	17.5	19.7	18.2	14.2	24.2	64.7	27.5	30.8
Non-infective enteritis & colitis	M	14.8	21.2	11.9	14.8	8.8	12.0	14.8	22.6	27.3	16.3
	F	23.2	35.9	17.7	16.5	15.6	21.4	30.2	42.1	38.2	34.0
Other diseases of the intestines & pertoneum	M	21.0	26.2	18.7	20.4	18.5	17.1	19.0	27.5	31.6	23.5
	F	31.1	45.9	24.6	24.6	25.6	23.7	52.2	54.6	50.6	24.7
Other diseases of digestive system	M	31.6	37.9	28.8	31.5	24.8	30.0	26.3	48.3	35.0	48.6
	F	34.3	44.2	30.1	29.6	24.7	36.6	45.0	38.0	48.3	40.1
Diseases of the Genitourinary System	M	50.7	57.8	47.5	52.0	51.0	38.7	35.2	67.4	66.1	60.9
	F	87.3	103.9	80.1	81.4	83.0	75.5	113.0	122.6	85.7	113.5
Other diseases of the urinary system	M	23.8	27.2	22.3	22.0	25.2	19.7	14.3	32.5	33.6	26.2
	F	25.9	28.4	24.9	23.9	30.6	19.5	24.3	35.5	23.4	37.0
Diseases of male genital organs	M	18.8	22.0	17.3	20.9	16.3	14.5	15.3	26.3	25.0	21.3
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services – Hospital Utilization Database

Table 29c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	42.5	54.0	37.6	35.1	37.2	40.8	66.6	51.6	45.9	56.1
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	97.6	100.8	96.3	99.4	86.7	103.4	101.4	102.8	90.4	117.4
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	21.8	25.4	20.3	23.4	19.6	17.4	20.3	34.1	20.5	34.0
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	37.5	43.5	34.9	36.5	35.8	32.3	40.8	44.5	39.3	53.3
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	32.6	26.8	35.1	33.0	27.0	46.4	34.8	19.3	26.9	23.1
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	18.5	20.5	17.6	17.2	15.3	20.6	18.3	26.2	16.9	25.7
	F	17.7	14.7	19.0	20.4	16.5	20.4	8.3	17.6	14.2	20.6
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	48.2	50.8	47.0	42.0	47.4	52.0	57.8	69.9	43.0	44.8
	F	71.3	73.2	70.4	64.6	74.8	72.0	88.3	100.1	58.0	65.6
Arthropathies & related disorders	M	22.6	21.6	23.1	20.8	22.5	26.2	24.1	31.2	16.0	22.8
	F	34.4	31.1	35.8	29.7	39.6	38.4	38.7	39.2	24.6	28.9
Dorsopathies	M	13.1	17.4	11.2	9.3	12.1	12.1	16.1	24.8	16.8	15.0
	F	15.9	21.2	13.6	11.1	15.7	14.2	21.2	29.5	19.0	19.7
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	7.3	6.5	7.7	7.6	6.4	9.1	12.0	7.7	5.2	2.4
	F	12.8	11.6	13.4	16.3	12.7	10.8	18.6	21.4	5.4	7.8
Congenital Anomalies	M	28.9	79.0	3.8	2.1	4.7	4.8	4.1	1.8	4.6	336.3
	F	3.6	4.3	3.3	3.8	3.0	3.2	0.8	2.0	8.2	3.0
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.9	1.4	0.6	0.7	0.3	1.0	1.0	1.3	1.6	1.4
	F	3.0	6.8	1.3	1.5	0.7	1.7	3.1	4.4	9.1	8.6
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	58.6	64.3	56.1	79.7	37.3	50.3	55.8	55.1	57.0	91.9
	F	67.0	84.1	59.6	72.2	46.0	60.8	91.1	84.8	69.3	102.6

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	76.1	81.4	73.7	89.6	58.9	72.2	89.3	97.8	66.9	88.3
	F	88.9	85.7	90.2	98.9	93.8	76.6	90.4	109.9	73.1	86.5
Fracture of skull	M	4.0	5.8	3.1	2.6	3.5	3.2	2.1	14.0	3.2	9.2
	F	0.9	0.8	0.9	1.2	0.6	1.1	0.3	0.4	1.5	0.6
Fracture of spine & trunk	M	6.5	9.1	5.3	5.4	3.3	7.4	16.4	16.3	4.0	5.9
	F	8.1	12.7	6.1	6.8	6.5	4.9	12.2	23.0	12.3	6.9
Fracture of upper limb	M	3.7	5.6	2.9	2.3	2.7	3.8	6.1	5.6	4.6	4.5
	F	4.7	5.3	4.4	5.1	3.8	4.3	4.7	4.7	4.4	8.0
Fracture of lower limb	M	17.3	17.1	17.3	23.7	10.9	17.3	17.4	24.1	14.7	16.6
	F	33.3	24.5	37.1	47.0	32.5	31.1	28.7	18.1	19.9	32.3
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	1.8	3.3	1.1	1.0	1.1	1.2	2.7	5.9	2.9	3.1
	F	1.7	3.0	1.1	1.0	1.1	1.1	2.8	9.9	1.7	1.0
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	4.4	2.7	5.1	9.8	2.0	3.1	2.6	2.9	2.1	3.8
	F	5.8	2.0	7.5	2.7	17.4	2.0	0.9	6.3	0.7	2.4
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	2.2	2.3	2.1	1.3	2.3	2.8	3.0	0.7	2.3	2.5
	F	1.0	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.8	1.5	0.9	1.0
Contusion with intact skin surface	M	1.4	2.2	1.0	1.1	0.8	1.1	2.8	1.2	1.3	3.9
	F	2.7	3.2	2.4	2.3	1.4	3.7	3.6	4.5	2.4	3.3
Burns	M	3.3	2.2	3.8	5.0	2.7	3.7	2.7	0.6	2.8	1.6
	F	1.6	2.6	1.1	1.8	1.4	0.1	4.2	0.1	3.6	0.8
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	1.1	1.3	1.1	1.6	0.8	0.7	0.7	0.6	1.2	2.4
	F	1.6	2.1	1.4	0.6	2.0	1.6	3.7	1.5	0.9	2.8
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	2.6	4.7	1.7	1.8	1.5	1.9	4.9	3.8	3.4	7.4
	F	4.0	6.9	2.8	2.4	2.9	3.0	6.1	7.1	8.6	4.4
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	1.4	0.9	1.7	0.1	4.6	0.2	1.6	0.1	0.9	0.6
	F	0.3	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.9	0.1
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	17.1	11.9	19.4	23.7	17.9	16.2	12.8	13.1	9.7	14.2
	F	19.0	15.3	20.6	23.3	19.4	18.9	16.1	26.0	10.6	15.7

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29d

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to HOSPITAL CARE *Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	16.7	17.1	15.0	17.4	12.0	15.6	21.2	18.1	15.7	14.8
	F	18.4	18.0	14.3	12.7	15.2	15.1	10.6	33.3	16.0	19.4
Neoplasms: Malignant	M	93.0	111.4	85.0	115.5	68.4	68.9	98.4	115.2	107.3	129.7
All causes	F	81.0	95.0	75.0	107.7	59.8	55.2	83.4	138.4	89.5	88.5
Digestive organs & peritoneum	M	11.1	10.5	11.4	15.9	8.2	9.8	10.0	8.6	11.1	11.2
	F	10.7	9.3	11.3	15.1	8.8	9.6	8.8	17.6	7.6	7.3
Respiratory & intra-thoracic organs	M	20.0	28.3	16.4	22.8	10.2	16.0	33.3	29.6	24.7	28.6
	F	10.8	13.7	9.6	11.9	11.5	5.1	14.9	13.9	9.8	19.2
Breast	M	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
	F	10.7	14.0	9.4	14.3	4.7	9.0	8.1	27.2	14.7	10.4
Genitourinary organs	M	11.1	14.5	9.6	13.4	7.5	7.6	6.9	9.5	11.5	31.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	50.7	58.0	47.5	63.3	42.6	35.4	48.2	67.6	60.3	58.5
	F	48.7	58.1	44.7	66.4	34.9	31.3	51.6	79.7	57.5	51.6
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	24.0	26.3	23.0	19.8	26.0	23.3	20.7	34.1	27.4	25.4
	F	27.0	33.4	24.2	17.1	30.8	25.0	21.4	39.1	42.5	26.4
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	8.0	10.2	7.0	8.2	7.0	5.6	11.7	13.2	8.8	9.1
	F	9.8	11.7	9.0	9.0	10.9	7.0	15.3	13.3	10.8	8.9
Mental Disorders	M	486.4	1042.2	215.3	153.8	386.5	102.1	1170.9	2189.5	760.4	671.8
	F	491.7	1122.6	222.3	268.4	180.1	217.2	1186.6	888.5	999.6	1430.2
Other psychoses	M	142.0	344.4	53.7	65.4	56.3	38.0	153.1	1959.5	55.6	30.7
	F	144.4	316.6	70.9	85.6	64.3	61.9	288.7	599.7	65.0	606.4
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	37.6	74.3	21.6	20.2	24.3	20.2	126.2	151.8	30.1	45.7
	F	52.0	65.8	46.1	48.5	50.9	38.2	65.9	135.1	43.5	56.8
Diseases of the Nervous System & Sense Organs	M	134.0	154.5	125.0	35.8	190.8	153.4	21.8	34.2	26.7	601.0
All Causes	F	47.4	67.1	39.0	32.8	49.6	34.2	160.4	54.8	29.7	38.4
Hereditary & degener-ative disease of the central nervous system	M	69.1	129.5	42.7	12.4	93.7	22.2	2.2	8.0	3.9	567.0
	F	17.7	38.8	8.7	6.8	14.2	4.8	130.9	21.7	6.0	6.5
Other disorders of the central nervous systm	M	48.1	7.7	65.7	4.8	80.0	117.3	3.5	8.7	7.9	11.2
	F	8.4	8.1	8.5	5.9	11.5	8.1	9.1	11.1	6.2	8.5
Disorders of the eye & adnexa	M	13.6	15.1	12.9	14.4	12.7	11.5	13.8	15.0	13.5	19.4
	F	17.0	17.6	16.7	16.3	16.6	17.4	17.9	16.7	16.2	20.3

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to HOSPITAL CARE *Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	247.7	232.9	254.2	325.1	270.6	159.2	208.3	215.1	198.5	331.9
	F	175.0	208.9	160.6	164.6	167.3	148.7	187.9	266.7	186.3	233.5
Ischemic heart disease	M	67.3	79.0	62.2	74.9	48.2	63.0	83.7	74.6	80.3	74.4
	F	44.5	49.5	42.4	45.8	32.7	49.1	48.3	50.3	40.7	66.1
Other forms of heart disease	M	54.3	47.7	57.2	47.7	83.3	40.0	52.6	44.6	49.9	40.7
	F	49.5	59.4	45.2	43.6	47.3	44.7	63.4	94.3	51.0	46.3
Cerebrovascular disease	M	93.5	69.6	104.0	169.6	101.9	34.2	37.9	39.5	33.6	186.9
	F	46.6	58.6	41.5	40.1	53.7	29.8	48.9	67.9	48.2	81.6
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	132.8	129.0	134.5	139.3	160.6	101.7	144.4	120.6	131.4	113.6
	F	104.8	119.6	98.5	102.1	96.8	96.2	109.7	135.2	126.0	108.6
Acute respiratory infections	M	11.2	14.8	9.6	11.1	6.4	11.4	12.8	18.3	16.2	12.0
	F	10.6	15.6	8.4	10.5	5.3	9.6	18.1	16.4	15.4	12.8
Pneumonia & influenza	M	36.4	36.1	36.5	29.2	49.8	30.5	27.5	46.6	43.0	26.4
	F	30.7	33.0	29.7	28.1	31.2	30.0	17.7	38.8	40.1	33.4
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	44.6	50.7	42.0	49.9	36.4	39.1	62.6	41.3	45.5	53.2
	F	43.0	50.1	40.0	34.3	45.2	40.5	51.4	65.3	45.7	46.3
Diseases of the Digestive System	M	103.5	117.3	97.5	114.1	86.6	90.7	92.3	137.3	125.5	116.7
	F	116.2	150.9	101.3	94.3	97.9	113.0	165.0	204.9	140.1	117.8
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	19.1	23.5	17.2	14.8	19.3	17.6	17.2	24.9	25.7	25.7
	F	21.3	30.2	17.4	16.5	18.5	17.3	23.9	55.2	27.3	25.5
Non-infective enteritis & colitis	M	12.7	16.0	11.3	13.0	9.7	11.1	8.3	15.8	20.1	17.3
	F	18.4	25.6	15.3	9.0	15.1	22.6	20.3	38.8	26.9	20.5
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	19.2	21.9	18.1	18.8	17.0	18.5	20.3	20.4	24.7	19.4
	F	31.7	38.3	28.9	28.4	25.0	33.7	41.6	48.4	39.3	26.0
Other diseases of digestive system	M	29.5	35.1	27.0	29.5	25.3	26.1	20.0	56.3	36.7	35.1
	F	32.0	40.1	28.5	29.5	27.6	28.5	60.8	42.3	30.8	32.3
Diseases of the Genitourinary System	M	44.4	49.0	42.3	43.7	41.4	42.0	47.1	46.9	51.6	47.7
	F	80.7	107.2	69.3	72.6	70.1	64.8	125.3	118.4	90.6	109.1
Other diseases of the urinary system	M	21.8	21.0	22.1	17.7	22.9	26.1	10.4	21.8	25.6	23.6
	F	23.9	27.0	22.6	19.8	29.4	18.2	19.2	39.8	28.4	24.7
Diseases of male genital organs	M	14.1	15.1	13.6	15.6	13.3	11.7	13.3	18.7	15.2	14.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to HOSPITAL CARE *Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	38.4	53.2	32.1	34.7	27.6	33.9	65.3	50.0	44.9	56.7
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	88.8	87.3	89.4	84.3	82.7	102.4	82.0	82.8	78.0	112.9
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	19.0	18.6	19.1	17.6	21.8	17.9	16.4	22.0	14.1	26.8
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	34.3	36.2	33.4	29.4	32.8	38.7	30.3	30.6	32.9	52.3
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.3	27.4	31.6	31.5	24.6	39.3	30.8	23.9	27.8	25.3
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	17.4	16.5	17.7	18.6	18.0	16.5	12.1	24.7	16.5	16.1
	F	16.5	16.0	16.7	19.3	13.4	17.4	6.3	21.4	18.9	18.3
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	61.5	44.5	69.0	45.4	109.6	51.9	44.6	63.1	32.9	53.1
	F	72.2	83.1	67.5	59.2	72.4	71.5	97.7	96.0	63.5	92.9
Arthropathies & related disorders	M	25.5	17.0	29.1	22.1	36.8	28.7	17.4	27.9	12.9	17.0
	F	32.6	36.2	31.1	25.1	37.8	30.5	50.2	49.5	21.8	37.6
Dorsopathies	M	12.8	15.6	11.5	8.5	15.3	10.8	13.4	22.9	10.0	23.3
	F	15.9	19.3	14.4	11.1	14.2	18.3	14.9	20.4	16.6	28.4
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	18.0	6.5	23.0	9.0	51.9	8.0	8.0	5.8	5.0	8.0
	F	14.9	17.1	14.0	13.7	14.4	14.0	15.7	16.7	16.8	15.8
Congenital Anomalies	M	3.3	2.7	3.5	3.6	3.8	3.0	2.4	1.7	3.0	3.2
	F	3.8	6.4	2.7	2.6	2.6	2.7	4.0	2.9	11.0	3.0
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	2.4	3.5	1.9	1.3	2.3	2.3	1.6	1.9	6.6	1.1
	F	1.0	1.2	0.9	1.4	0.6	0.6	0.7	0.0	1.8	1.5
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	52.7	55.4	51.5	57.0	51.8	45.2	45.7	56.3	54.3	67.0
	F	62.7	76.8	56.8	65.8	48.9	55.3	65.3	97.8	54.5	115.2

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	72.1	82.8	67.5	65.1	68.0	69.4	90.7	88.1	78.2	78.0
	F	79.1	82.5	77.7	84.1	82.0	65.7	82.0	102.3	58.7	112.1
Fracture of skull	M	3.4	4.4	3.0	2.6	3.0	3.2	3.5	3.7	6.5	2.0
	F	1.1	0.6	1.4	1.9	1.4	0.8	0.5	1.1	0.4	0.7
Fracture of spine & trunk	M	7.9	9.8	7.1	6.6	7.2	7.5	13.2	12.4	8.4	6.8
	F	8.7	11.2	7.6	8.2	7.9	6.7	13.0	13.3	7.4	14.6
Fracture of upper limb	M	4.8	6.7	4.0	3.8	3.8	4.3	8.3	4.4	6.9	5.9
	F	6.7	8.2	6.0	7.0	6.3	4.6	9.3	6.0	3.8	16.5
Fracture of lower limb	M	15.7	19.1	14.2	15.2	13.8	13.5	21.7	22.6	15.7	20.0
	F	30.3	27.6	31.5	38.2	35.7	19.2	27.0	37.5	19.7	35.5
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	2.2	2.6	2.1	1.0	3.2	2.0	2.4	2.7	2.7	2.7
	F	1.6	2.6	1.1	0.6	0.7	2.2	0.9	5.2	2.0	3.6
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	2.9	1.8	3.3	3.8	3.0	3.1	2.0	2.4	1.1	2.5
	F	2.3	2.2	2.3	1.3	3.7	2.0	5.0	0.9	0.8	2.6
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	1.5	1.5	1.4	1.7	0.8	1.9	1.1	2.4	1.6	1.0
	F	0.7	0.6	0.7	1.3	0.5	0.2	0.2	2.4	0.4	0.3
Contusion with intact skin surface	M	1.9	3.4	1.3	1.0	1.3	1.6	2.9	4.5	4.1	2.0
	F	2.1	2.1	2.1	1.4	2.7	2.3	1.6	4.1	1.6	2.3
Burns	M	3.5	3.1	3.7	4.4	3.2	3.6	1.1	5.1	3.0	4.0
	F	0.5	0.7	0.4	0.5	0.1	0.7	1.2	0.1	1.0	0.2
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	1.3	2.2	0.9	0.3	1.5	1.0	3.6	0.5	2.5	1.3
	F	0.8	1.5	0.5	0.6	0.3	0.7	0.3	2.0	2.1	1.6
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	2.6	4.2	1.9	2.2	1.6	1.9	3.9	2.6	5.0	4.0
	F	3.3	5.9	2.2	1.6	1.2	4.0	7.9	3.8	6.1	5.1
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3	1.0
	F	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.7
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	17.0	13.6	18.5	17.3	19.7	18.5	18.3	13.1	11.0	13.6
	F	16.1	12.5	17.7	18.9	18.3	15.6	11.0	22.7	8.7	14.1

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29e **Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998**

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	56.2	17.0	73.2	14.0	190.6	14.7	17.1	22.4	16.8	14.0
	F	17.4	20.5	16.1	14.2	19.1	14.8	21.6	25.1	16.5	23.3
Neoplasms: Malignant	M	90.1	97.2	87.0	105.7	93.5	59.8	68.5	95.3	97.3	129.3
All causes	F	80.3	75.4	83.1	91.8	87.9	68.0	54.4	90.1	84.7	72.4
Digestive organs & peritoneum	M	10.5	3.7	6.8	2.5	2.6	1.8	1.1	0.6	1.3	0.7
	F	13.9	12.5	14.5	14.7	17.7	10.7	9.2	14.7	13.9	12.2
Respiratory & intra-thoracic organs	M	16.8	21.9	14.6	14.8	18.9	9.9	14.1	18.6	23.5	29.8
	F	8.7	9.3	8.5	8.7	8.7	8.0	9.2	7.2	9.5	10.5
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	F	8.5	10.3	7.7	11.2	4.5	7.3	8.3	11.1	11.3	10.4
Genitourinary organs	M	11.6	10.9	11.8	14.4	13.9	6.8	7.4	5.7	12.0	16.1
	F	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Other & unspecified sites	M	51.2	52.2	50.8	66.2	49.7	34.9	32.3	56.0	50.9	73.6
	F	49.7	43.3	52.4	57.2	57.0	42.1	27.7	57.1	50.0	39.2
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	27.6	23.4	29.4	18.1	45.3	25.0	14.2	28.6	25.4	26.2
	F	28.8	31.3	27.7	29.3	28.6	24.7	27.4	45.1	27.4	33.5
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	7.5	11.6	5.7	5.5	6.0	5.7	9.8	13.2	13.7	8.9
	F	9.9	12.5	8.8	8.1	9.0	9.4	10.4	17.2	14.0	8.8
Mental Disorders	M	262.6	502.5	158.5	125.6	270.9	76.4	1260.7	173.6	142.8	535.2
	F	378.1	772.7	210.5	214.1	160.1	261.7	1034.9	692.7	459.4	1095.5
Other psychoses	M	89.0	120.4	75.3	68.8	109.1	46.9	207.3	65.0	63.3	163.7
	F	174.4	423.6	68.6	78.2	62.5	64.5	958.6	98.7	68.9	681.3
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	28.9	39.6	24.3	31.0	20.2	21.3	48.0	63.1	20.8	49.2
	F	61.1	121.8	35.3	29.1	39.5	37.8	58.4	535.3	29.5	78.6
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	81.5	139.0	56.6	35.2	105.5	28.5	34.3	758.0	31.6	49.8
	F	66.4	95.2	54.1	43.6	78.5	39.1	35.0	421.7	40.9	39.1
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	55.9	113.1	31.1	11.6	74.7	6.6	10.3	725.0	10.8	17.1
	F	32.0	65.1	17.9	13.6	30.0	9.5	2.8	387.7	14.2	7.6
Other disorders of the central nervous systm	M	8.0	8.9	7.7	5.2	12.2	5.6	4.7	13.4	5.9	15.7
	F	11.1	7.3	12.6	7.0	21.9	8.8	12.1	6.4	5.4	6.2
Disorders of the eye & adnexa	M	13.7	13.7	13.7	13.9	14.4	12.6	13.2	15.1	12.9	14.8
	F	18.1	18.0	18.1	18.5	19.0	16.8	15.4	21.5	18.3	18.1

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	202.3	217.3	195.8	207.7	210.9	166.6	182.4	258.7	172.4	308.2
	F	182.6	192.3	178.5	180.6	211.3	140.4	177.4	245.8	172.3	208.5
Ischemic heart disease	M	64.5	76.5	59.3	61.4	48.3	58.6	76.6	79.6	67.5	90.3
	F	45.4	53.5	42.0	45.6	38.7	41.4	49.7	62.0	48.7	60.7
Other forms of heart disease	M	47.8	50.2	46.7	49.5	44.8	45.7	51.7	70.5	40.3	53.2
	F	54.1	62.9	50.3	48.3	60.4	41.5	53.4	96.3	55.5	64.2
Cerebrovascular disease	M	49.8	47.1	51.0	48.6	76.8	26.5	17.4	41.7	30.7	111.6
	F	51.2	41.7	55.2	54.5	76.2	33.0	42.2	42.4	34.6	53.2
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	120.6	140.1	112.2	123.6	115.5	96.1	131.1	138.6	149.7	133.9
	F	112.2	129.8	104.7	104.2	104.8	105.3	124.5	136.8	137.2	117.6
Acute respiratory infections	M	10.5	14.6	8.6	11.1	5.7	9.0	12.7	17.9	15.3	13.4
	F	8.9	14.2	6.6	7.0	4.2	8.7	13.7	12.1	16.5	12.2
Pneumonia & influenza	M	40.5	41.4	40.1	48.9	40.0	30.5	24.7	48.3	50.3	39.0
	F	35.8	41.2	33.5	30.6	36.5	33.4	17.2	48.0	48.3	50.6
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	46.3	58.7	41.0	38.4	45.8	38.7	66.3	57.9	52.3	62.4
	F	44.9	52.9	41.5	40.2	42.4	41.9	67.5	68.3	44.9	40.5
Diseases of the Digestive System	M	97.1	119.6	87.3	83.9	96.4	81.5	110.5	146.7	120.6	110.4
	F	113.5	139.1	102.6	90.7	107.9	110.0	131.4	196.3	132.4	120.9
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	17.8	21.7	16.1	11.7	20.2	16.5	23.3	32.3	19.9	16.5
	F	18.4	23.3	16.4	12.6	19.3	17.4	23.0	43.6	21.2	13.7
Non-infective enteritis & colitis	M	12.7	17.6	10.6	10.9	10.1	10.9	11.8	18.6	23.4	13.0
	F	17.9	24.0	15.4	14.2	13.6	18.6	18.8	37.0	24.0	21.3
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	20.5	25.9	18.2	19.8	20.7	13.7	24.9	29.7	29.4	18.5
	F	31.3	38.8	28.2	25.8	28.0	31.0	32.0	63.8	36.6	33.5
Other diseases of digestive system	M	26.4	35.2	25.5	23.8	28.3	24.4	27.8	45.0	33.0	40.7
	F	32.4	37.5	30.2	26.1	35.1	29.6	41.2	35.1	38.5	33.0
Diseases of the Genitourinary System	M	43.2	46.1	42.0	51.7	37.9	35.5	29.7	48.1	56.9	40.0
	F	74.8	92.1	67.5	77.6	58.1	66.3	90.0	102.8	81.5	106.3
Other diseases of the urinary system	M	19.5	19.8	19.4	19.6	20.0	18.5	12.4	19.7	25.6	17.7
	F	22.0	24.4	20.9	19.7	20.8	22.4	21.0	26.6	27.3	21.7
Diseases of male genital organs	M	14.2	16.9	13.0	14.0	11.0	14.0	12.5	17.1	21.2	13.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	35.5	47.4	30.5	34.6	24.9	32.1	54.2	50.0	37.5	55.6
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	84.8	91.1	82.2	79.2	72.9	95.7	81.9	96.4	85.4	107.8
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	20.0	22.5	19.0	18.7	19.4	19.0	16.9	28.2	19.4	30.4
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	31.5	35.7	29.7	25.3	29.8	34.6	28.6	36.9	33.4	46.9
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	27.8	27.0	28.1	28.7	20.9	35.4	32.6	22.7	27.8	22.4
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	19.9	22.0	19.0	22.2	14.4	20.2	15.9	19.1	19.9	34.0
	F	15.5	15.8	15.3	11.7	18.2	16.1	10.5	23.1	15.5	17.5
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	48.0	52.2	46.2	43.6	47.8	47.5	50.9	79.4	34.9	67.1
	F	67.5	64.3	68.9	68.0	66.4	72.6	72.5	79.0	52.7	66.0
Arthropathies & related disorders	M	21.2	20.6	21.5	18.4	23.3	22.9	20.3	29.0	14.9	25.9
	F	31.4	26.8	33.3	26.7	37.5	36.2	30.7	36.4	21.3	25.7
Dorsopathies	M	13.4	18.6	11.1	8.6	13.0	12.0	17.6	33.7	7.8	29.3
	F	14.1	16.6	13.1	12.1	13.7	13.4	13.5	22.9	14.8	18.9
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	6.2	5.6	6.4	5.5	7.0	6.8	7.7	7.7	4.1	4.6
	F	12.2	12.5	12.0	13.5	9.8	12.8	16.5	10.8	9.7	14.2
Congenital Anomalies	M	4.2	3.5	4.5	5.2	4.8	3.4	2.4	1.2	4.3	4.6
	F	2.7	2.8	2.7	3.1	3.3	1.7	1.4	3.2	2.8	3.7
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	3.0	4.8	2.2	1.4	4.4	0.7	4.8	6.9	6.1	1.3
	F	1.8	4.4	0.6	1.0	0.2	0.7	6.0	5.2	2.7	5.2
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	51.8	53.7	51.0	72.9	35.5	43.3	52.2	53.7	43.8	72.6
	F	70.9	66.8	72.6	109.6	49.1	56.9	56.6	87.2	55.9	84.1

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 29e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to *HOSPITAL CARE Days*, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	70.9	75.1	69.1	71.2	62.2	73.9	65.6	93.9	61.0	98.4
	F	75.2	75.0	75.3	84.2	77.7	62.8	70.2	97.4	54.2	102.2
Fracture of skull	M	2.8	1.9	3.2	4.8	2.5	2.2	1.2	1.2	2.3	2.2
	F	0.6	0.6	0.6	0.3	1.1	0.5	0.2	0.2	0.5	1.5
Fracture of spine & trunk	M	6.8	9.2	5.8	5.5	5.9	6.1	6.6	17.4	5.2	14.0
	F	5.9	5.6	6.0	6.3	4.4	7.5	6.4	6.2	3.8	7.5
Fracture of upper limb	M	3.8	4.1	3.6	3.6	2.9	4.5	6.6	3.1	3.1	3.6
	F	5.2	7.4	4.3	3.3	4.9	4.8	9.4	15.6	3.0	7.4
Fracture of lower limb	M	16.7	16.0	17.0	20.1	15.6	15.1	17.7	16.2	11.8	21.5
	F	29.7	26.1	31.3	43.0	33.1	16.3	21.6	24.0	21.5	40.5
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	2.1	2.4	2.0	1.6	2.1	2.3	2.0	3.4	2.2	2.3
	F	1.4	1.9	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	2.9	1.9	2.1
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	2.9	2.7	3.0	5.2	1.6	2.2	1.4	4.1	3.4	0.9
	F	1.7	1.6	1.7	1.2	1.3	2.7	0.7	4.4	1.5	2.0
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	2.4	2.7	2.3	2.0	2.0	2.8	0.8	4.7	3.5	2.0
	F	0.8	1.5	0.5	0.4	0.2	0.7	0.8	0.8	1.9	1.9
Contusion with intact skin surface	M	1.6	2.3	1.3	1.3	1.5	1.1	2.3	4.2	2.0	1.8
	F	1.6	2.2	1.4	1.6	1.2	1.5	1.2	5.5	1.5	2.2
Burns	M	4.0	3.7	4.1	5.2	3.9	3.2	4.1	2.2	1.2	8.4
	F	1.2	2.2	0.8	0.7	1.0	0.7	0.5	3.2	0.2	6.8
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	1.3	0.6	2.7	0.9	1.0
	F	0.7	1.3	0.5	0.2	0.4	1.0	0.3	0.7	1.1	3.1
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	2.1	4.8	1.0	1.1	0.6	1.2	4.9	2.9	3.4	8.5
	F	3.2	4.5	2.7	4.0	1.2	3.0	3.8	4.8	3.3	7.1
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.6	0.2
	F	0.6	0.4	0.7	0.1	0.1	1.9	0.3	0.3	0.5	0.4
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	17.4	14.9	18.5	14.6	17.4	24.0	11.2	22.5	14.0	15.5
	F	18.8	14.8	20.5	19.2	24.8	17.4	20.5	18.2	10.6	13.7

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30a

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	3.1	4.1	2.7	2.2	3.1	2.7	4.0	4.1	3.1	5.9
	F	3.4	4.7	2.8	2.0	2.4	4.1	3.3	5.7	4.3	6.4
Neoplasms: Malignant	M	10.4	10.6	10.3	10.8	10.5	9.6	9.7	13.5	9.5	11.4
All causes	F	8.4	7.7	8.6	8.1	9.2	8.6	5.5	10.2	6.5	10.6
Digestive organs & peritoneum	M	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.3	0.7	1.2
	F	0.9	0.7	0.9	0.9	1.1	0.8	0.5	1.1	0.6	1.0
Respiratory & intra-thoracic organs	M	1.8	2.2	1.7	1.8	1.6	1.6	2.8	2.9	1.7	2.0
	F	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6	1.1	0.8	0.9
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	2.0	2.1	2.0	2.2	1.7	2.1	1.4	3.3	1.7	2.6
Genitourinary organs	M	2.2	2.1	2.2	2.5	2.0	2.0	2.0	3.4	1.8	2.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	5.3	5.3	5.3	5.3	5.8	4.9	3.9	5.9	5.3	6.1
	F	4.6	4.1	4.9	4.3	5.5	4.9	3.0	4.7	3.4	6.0
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	2.8	3.2	2.7	2.0	3.0	3.0	3.1	4.7	2.7	3.3
	F	3.4	4.6	2.9	2.6	2.7	3.4	3.8	6.3	4.3	5.1
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	1.1	1.5	0.9	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.3	1.9
	F	1.3	1.5	1.2	0.8	1.4	1.3	1.4	2.1	1.5	1.4
Mental Disorders	M	6.3	8.9	5.1	5.4	4.8	5.2	12.2	8.5	7.5	8.2
	F	8.5	12.4	6.7	7.0	6.6	6.7	13.7	17.7	10.1	11.5
Other psychoses	M	2.1	2.8	1.8	2.3	1.5	1.6	4.0	2.0	3.3	1.5
	F	2.8	3.6	2.5	3.2	2.4	2.0	4.0	5.2	3.0	3.0
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	3.3	5.2	2.5	2.4	2.3	2.7	7.3	5.6	3.8	5.5
	F	4.9	8.4	3.3	3.4	3.0	3.7	9.1	11.7	6.7	8.2
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	11.9	12.1	11.9	11.7	11.6	12.2	15.7	12.0	9.9	12.1
	F	14.3	14.2	14.3	14.2	13.0	15.9	19.4	13.8	10.9	14.6
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3
	F	0.5	0.6	0.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6
Other disorders of the central nervous systm	M	1.1	1.3	0.9	0.7	0.9	1.2	1.7	1.0	1.0	1.5
	F	1.1	1.5	0.9	0.8	0.9	1.2	1.7	2.5	1.0	1.5
Disorders of the eye & adnexa	M	9.1	9.2	9.1	9.0	8.7	9.5	11.9	8.5	7.8	9.3
	F	10.5	10.3	10.6	10.7	9.3	11.8	15.1	8.7	7.7	10.6

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	24.9	27.5	23.8	20.3	25.7	25.5	27.2	30.0	26.6	27.6
	F	19.1	22.4	17.7	14.8	18.2	20.4	21.4	30.7	19.7	22.8
Ischemic heart disease	M	11.4	12.3	10.9	9.7	11.0	12.2	11.6	12.2	12.6	12.3
	F	6.0	6.6	5.8	5.4	5.4	6.7	5.9	7.8	5.7	7.9
Other forms of heart disease	M	5.7	6.1	5.5	4.7	6.1	5.7	6.6	5.5	5.9	6.1
	F	5.5	5.9	5.4	4.6	5.7	5.8	5.3	8.2	5.0	6.5
Cerebrovascular disease	M	2.9	2.9	2.9	2.3	3.2	3.2	2.5	3.8	2.5	3.2
	F	2.6	2.5	2.6	2.3	2.5	3.2	3.0	3.0	2.1	2.4
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	23.4	30.3	20.2	17.6	20.0	23.4	24.1	31.7	34.3	28.8
	F	20.8	27.3	17.9	15.3	17.7	21.0	20.3	29.0	30.3	28.6
Acute respiratory infections	M	4.5	5.9	3.9	3.8	3.3	4.8	5.9	3.9	6.0	7.0
	F	3.6	5.1	2.9	2.9	2.3	3.7	4.5	4.8	5.1	5.9
Pneumonia & influenza	M	4.4	5.4	3.9	3.2	3.9	4.7	3.6	6.6	5.9	5.7
	F	4.2	5.8	3.5	3.0	3.6	3.9	3.8	8.2	5.7	6.6
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	7.5	10.1	6.3	5.1	6.3	7.7	7.9	14.1	10.3	9.6
	F	7.0	9.1	6.0	4.9	6.0	7.4	5.6	11.6	9.9	9.9
Diseases of the Digestive System	M	26.0	31.9	23.4	18.6	29.7	21.8	30.7	38.1	28.7	34.7
	F	28.3	35.2	25.2	17.8	31.8	26.2	30.9	43.1	32.9	38.5
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	5.6	7.7	4.6	2.2	6.8	4.9	7.4	11.2	5.4	10.0
	F	5.5	8.2	4.4	1.7	5.6	6.0	6.8	13.4	6.1	9.8
Non-infective enteritis & colitis	M	3.0	4.9	2.2	1.6	2.7	2.3	4.8	5.0	5.5	4.0
	F	4.4	6.3	3.6	2.6	4.5	3.6	5.9	6.3	7.1	5.5
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	3.7	4.2	3.4	2.3	4.6	3.3	4.0	5.6	3.8	4.3
	F	5.2	6.5	4.6	2.3	6.5	5.1	5.9	8.1	6.2	6.4
Other diseases of digestive system	M	4.6	5.5	4.2	3.7	4.8	4.0	5.0	6.5	5.1	6.0
	F	7.1	8.1	6.7	5.7	7.4	7.2	7.5	9.3	7.2	9.4
Diseases of the Genitourinary System	M	18.3	17.0	18.9	18.4	21.1	17.3	19.3	25.9	14.4	13.6
	F	30.4	33.9	28.9	24.7	34.3	27.5	33.7	41.2	28.2	39.4
Other diseases of the urinary system	M	9.1	7.5	9.9	7.6	12.4	9.7	6.7	11.9	6.8	6.6
	F	11.3	8.8	12.4	11.5	17.0	8.3	8.0	16.3	7.0	7.6
Diseases of male genital organs	M	8.4	8.7	8.3	10.0	8.0	6.8	11.6	13.2	6.8	6.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	13.8	18.6	11.7	8.8	13.4	13.1	20.3	16.4	14.0	26.2
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	33.4	32.8	33.7	31.9	31.9	37.6	32.0	31.4	30.2	39.1
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	7.4	8.9	6.8	6.9	6.5	7.0	8.2	8.6	7.2	12.6
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	12.3	12.0	12.4	11.9	13.2	12.2	10.2	13.0	11.6	13.7
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.4	8.3	9.9	8.0	9.4	12.5	10.2	6.6	8.3	7.3
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	3.2	3.4	3.1	2.4	3.4	3.6	3.2	6.0	3.1	2.6
	F	3.3	3.7	3.1	2.3	3.2	4.0	2.9	6.8	3.4	3.2
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	11.5	10.8	11.8	10.5	10.3	15.0	10.4	13.9	8.9	12.6
	F	12.6	12.1	12.9	10.2	11.9	17.0	13.6	12.6	9.5	14.8
Arthropathies & related disorders	M	5.5	3.7	6.2	5.4	5.1	8.3	3.0	4.9	2.9	5.3
	F	5.5	4.6	5.9	4.2	5.4	8.4	4.5	4.7	3.3	6.8
Dorsopathies	M	2.7	3.7	2.2	1.7	2.4	2.6	3.9	5.5	3.1	3.3
	F	2.6	3.3	2.3	1.9	2.2	2.7	3.7	3.7	2.7	3.5
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.2	1.3	1.1	1.8
	F	2.0	1.6	2.1	1.8	1.7	2.9	1.7	1.5	1.3	2.1
Congenital Anomalies	M	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1	0.7	1.2	1.7	1.7
	F	1.2	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.6	1.6	2.0
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
	F	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	0.9
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	11.3	11.3	11.3	9.9	11.8	12.4	9.9	11.5	10.9	13.5
	F	12.8	12.7	12.9	10.3	14.0	14.4	10.2	16.4	10.5	16.7

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30a
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993 - 1994

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	**M**	14.1	16.1	13.1	10.1	14.4	15.2	16.3	14.4	13.9	20.6
	F	10.3	11.3	9.8	7.7	10.6	11.5	10.4	13.3	9.3	14.4
Fracture of skull	**M**	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	1.0	1.2	1.2
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
Fracture of spine & trunk	**M**	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1
	F	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.3	0.5
Fracture of upper limb	**M**	1.4	1.7	1.3	1.3	1.1	1.6	2.4	1.4	1.1	2.1
	F	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	1.7	1.4	1.5	0.6	1.5
Fracture of lower limb	**M**	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.3	2.0	2.5	1.5	2.5
	F	2.2	1.8	2.4	2.1	2.4	2.6	1.7	2.6	1.5	1.7
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	**M**	0.7	0.9	0.6	0.4	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	1.1
	F	0.5	0.8	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	1.2	0.7	1.1
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	**M**	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	1.0	0.9	0.4	0.9	1.5
	F	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	1.3
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	**M**	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.8
	F	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Contusion with intact skin surface	**M**	0.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.3	0.5	0.5	0.6
	F	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0	0.6	0.3	0.4
Burns	**M**	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
Certain traumatic complications & unspecified injuries	**M**	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
	F	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	**M**	0.8	1.1	0.6	0.4	0.6	0.7	1.3	1.0	1.2	0.9
	F	1.2	2.1	0.8	0.5	0.8	1.2	2.0	1.7	2.1	2.3
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	**M**	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3
Complications of surgical & medical care not else where classified	**M**	2.3	2.0	2.4	1.8	3.2	2.2	1.6	2.0	1.9	2.6
	F	2.1	1.9	2.1	1.6	2.8	2.0	1.1	2.1	1.6	2.9

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30b **Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995**

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	3.3	4.6	2.8	2.4	2.7	3.3	3.4	6.1	4.9	4.2
	F	3.6	5.0	3.0	2.7	2.3	4.0	3.8	6.8	5.2	4.8
Neoplasms: Malignant	M	10.8	10.7	10.8	11.9	10.5	9.9	9.2	14.6	9.0	12.5
All causes	F	8.6	8.1	8.8	8.7	8.9	8.9	5.7	11.0	7.9	9.1
Digestive organs & peritoneum	M	1.1	1.1	1.1	1.4	1.0	1.0	1.3	1.3	0.7	1.6
	F	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9
Respiratory & intra-thoracic organs	M	1.9	2.4	1.6	1.6	1.7	1.5	2.5	4.8	1.5	2.5
	F	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	1.3	0.5	1.3
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	1.9	1.6	3.1	2.0	2.2
Genitourinary organs	M	1.9	1.8	1.9	2.5	1.8	1.4	1.3	2.2	1.9	2.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	5.9	5.2	6.2	6.5	6.1	5.9	4.1	6.4	4.9	6.3
	F	4.9	4.5	5.1	4.9	5.3	5.1	3.4	5.7	4.6	4.7
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	2.6	3.0	2.4	1.7	2.8	2.8	2.8	3.8	2.5	3.7
	F	3.5	5.1	2.8	2.3	2.6	3.6	4.3	6.1	4.8	5.7
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	1.2	1.4	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.7
	F	1.4	1.9	1.1	0.9	1.2	1.3	2.8	1.8	1.6	1.6
Mental Disorders	M	7.2	10.0	5.9	6.2	5.8	5.7	13.0	10.9	8.5	9.0
	F	8.9	13.0	7.1	7.4	7.0	6.8	14.8	20.2	9.6	12.0
Other psychoses	M	2.4	3.2	2.1	2.3	2.0	1.9	4.5	3.1	3.3	1.9
	F	3.2	4.4	2.7	3.0	2.6	2.6	5.6	6.1	3.5	3.7
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	3.8	5.8	2.9	3.1	2.6	3.0	7.6	6.6	4.5	5.6
	F	4.9	7.9	3.6	3.8	3.3	3.6	8.4	13.2	5.7	7.6
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	12.4	12.4	12.4	11.8	12.4	13.2	15.2	12.2	10.1	13.5
	F	15.7	15.8	15.8	15.7	14.6	17.3	22.4	14.8	10.7	16.9
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4
	F	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	0.3
Other disorders of the central nervous systm	M	1.1	1.4	1.0	0.7	0.9	1.4	1.6	1.4	1.1	1.8
	F	1.1	1.4	1.0	0.9	0.8	1.3	1.1	1.9	1.2	1.6
Disorders of the eye & adnexa	M	9.5	9.5	9.6	9.1	9.1	10.6	11.9	8.4	7.8	10.5
	F	11.7	12.0	11.5	11.2	10.6	12.9	17.8	11.1	8.2	12.8

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	23.1	25.4	22.0	20.7	21.1	24.4	25.2	29.6	23.1	27.1
	F	18.9	22.0	17.6	15.0	18.4	19.6	19.4	25.1	20.1	26.1
Ischemic heart disease	M	10.3	11.6	9.7	9.5	8.5	11.3	11.3	13.0	10.4	13.1
	F	5.9	6.3	5.7	5.1	5.4	6.5	5.4	4.8	5.7	9.6
Other forms of heart disease	M	5.3	5.5	5.3	4.9	4.8	6.1	5.1	7.4	5.2	5.2
	F	5.4	5.6	5.2	4.5	5.6	5.8	4.7	6.8	5.0	6.8
Cerebrovascular disease	M	2.9	3.0	2.8	2.6	2.7	3.1	3.2	3.5	2.5	3.5
	F	2.7	2.9	2.7	2.3	2.8	3.0	2.6	3.2	2.7	3.4
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	22.7	29.3	19.7	17.6	19.3	22.5	26.2	26.8	31.6	27.9
	F	20.9	27.1	18.2	14.8	17.7	22.4	24.3	25.3	26.9	31.6
Acute respiratory infections	M	4.2	6.3	3.2	3.6	2.6	3.6	6.3	4.9	7.1	5.8
	F	3.6	5.2	2.9	2.7	2.2	4.0	5.1	4.4	5.5	5.3
Pneumonia & influenza	M	4.5	5.7	4.0	3.8	3.9	4.5	4.9	4.9	6.4	5.7
	F	4.2	5.1	3.8	3.0	3.8	4.8	3.9	4.8	5.0	6.9
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	6.7	8.7	5.8	4.5	5.7	7.3	8.4	10.4	9.0	7.5
	F	6.6	8.9	5.6	4.2	5.4	7.2	6.5	12.1	8.2	10.8
Diseases of the Digestive System	M	27.8	32.9	25.6	23.7	29.3	23.6	29.9	41.2	29.8	36.1
	F	30.0	36.0	27.3	23.5	32.2	26.2	31.3	44.2	33.2	40.5
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	6.4	8.3	5.6	4.8	7.1	4.8	6.8	12.6	5.8	11.6
	F	6.2	8.3	5.3	3.8	7.2	4.9	7.0	13.1	5.5	11.4
Non-infective enteritis & colitis	M	3.4	4.9	2.7	2.6	3.2	2.4	3.6	4.9	5.9	4.3
	F	4.6	6.9	3.5	3.1	3.6	4.0	5.6	6.9	7.8	6.6
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	4.0	4.3	3.9	3.3	4.8	3.5	4.1	5.6	3.7	4.8
	F	5.6	6.5	5.3	4.1	6.6	5.2	5.4	7.2	6.5	7.2
Other diseases of digestive system	M	4.6	5.2	4.3	3.7	4.4	4.9	4.5	5.9	5.1	5.6
	F	7.2	8.0	6.9	6.1	7.1	7.5	7.8	8.3	7.6	8.6
Diseases of the Genitourinary System	M	18.3	18.2	18.3	19.9	19.9	15.0	17.2	31.0	17.1	13.0
	F	32.8	35.5	31.7	29.0	36.5	29.2	34.9	55.2	29.2	34.0
Other diseases of the urinary system	M	9.1	7.8	9.6	8.4	11.8	8.5	5.9	14.5	7.3	6.5
	F	12.7	10.6	13.6	13.3	17.9	9.0	8.9	22.3	8.0	9.0
Diseases of male genital organs	M	8.3	9.4	7.8	10.3	7.4	5.7	10.7	15.9	8.6	5.3
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	14.0	18.0	12.3	10.2	13.1	13.6	20.8	23.1	14.0	18.6
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	31.9	30.7	32.4	30.2	30.7	36.7	28.5	29.3	30.4	34.7
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	6.8	8.2	6.2	6.3	6.5	5.7	7.6	8.5	7.4	10.3
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	11.2	11.5	11.0	10.4	12.3	10.2	8.5	11.4	12.2	13.6
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.0	7.7	11.0	8.9	9.5	15.2	9.3	6.7	8.1	6.0
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	3.6	3.8	3.5	3.4	3.0	4.0	3.6	6.6	3.6	2.7
	F	3.4	3.5	3.4	3.8	2.6	3.9	3.2	6.4	2.6	3.5
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	12.1	10.9	12.6	10.6	11.6	15.8	12.1	12.4	8.5	12.7
	F	12.7	12.2	12.9	10.1	11.8	17.2	13.8	15.1	9.5	13.1
Arthropathies & related disorders	M	5.8	4.1	6.5	5.5	5.7	8.6	3.8	4.4	3.3	5.5
	F	5.6	4.4	6.1	4.0	5.8	8.6	4.2	5.7	3.5	5.4
Dorsopathies	M	2.4	3.2	2.1	1.9	2.1	2.2	4.1	5.2	2.1	2.9
	F	2.1	3.0	1.8	1.5	1.5	2.2	3.5	4.8	2.3	2.7
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	1.3	1.2	1.4	1.1	1.3	1.8	1.4	1.2	1.0	1.4
	F	2.0	1.8	2.1	2.0	1.7	2.6	2.2	1.8	1.6	2.0
Congenital Anomalies	M	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	1.3	1.8	1.3
	F	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.7	0.2	0.3
	F	0.5	1.0	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	1.3
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	11.8	12.4	11.6	10.9	10.9	13.2	11.3	13.6	10.5	16.1
	F	13.7	14.8	13.2	12.4	11.6	16.0	14.9	17.0	11.9	18.2

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30b
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1994 - 1995

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	14.0	16.1	13.0	11.0	13.6	14.5	16.6	18.2	13.7	18.6
	F	10.2	11.6	9.6	7.9	10.1	10.8	10.6	12.6	9.5	15.9
Fracture of skull	M	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.3
	F	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Fracture of spine & trunk	M	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	0.8	0.4	1.0
	F	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	1.0
Fracture of upper limb	M	1.6	2.0	1.4	1.3	1.2	1.9	2.1	2.9	1.7	1.9
	F	1.1	1.2	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.5	0.9	1.7
Fracture of lower limb	M	2.0	2.1	2.0	1.8	2.0	2.1	2.6	2.8	1.6	2.1
	F	2.1	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	1.4	2.8	1.5	2.2
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.3	0.5	0.9
	F	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	F	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
Contusion with intact skin surface	M	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	0.8	0.3	0.6
	F	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3
Burns	M	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.5
	F	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.5
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	0.9	1.5	0.6	0.5	0.5	0.8	1.4	1.5	1.2	1.9
	F	1.2	2.0	0.8	0.6	0.9	1.2	2.2	1.5	1.8	2.6
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	2.2	1.8	2.4	2.2	2.8	2.1	1.9	1.8	1.4	2.3
	F	2.0	1.8	2.1	1.7	2.5	2.2	1.7	1.9	1.4	2.5

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30c

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	3.2	4.4	2.7	2.4	2.6	3.1	3.9	6.9	3.8	4.4
	F	3.5	4.9	2.9	2.8	2.0	4.0	4.9	6.2	4.5	4.8
Neoplasms: Malignant	M	10.3	10.8	10.1	11.4	9.2	9.8	7.9	16.3	10.1	11.6
All causes	F	8.3	8.5	8.2	8.9	7.8	8.0	6.2	12.0	7.7	10.1
Digestive organs & peritoneum	M	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	0.9	0.8	1.3	0.8	1.4
	F	0.9	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.3	1.1	0.7	1.0
Respiratory & intra-thoracic organs	M	1.8	2.3	1.6	1.8	1.3	1.6	2.5	4.0	1.9	1.4
	F	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	1.4	0.4	0.9
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	F	2.0	2.3	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	2.0	2.5	3.0
Genitourinary organs	M	1.6	1.9	1.4	2.0	1.0	1.3	1.0	2.0	2.1	2.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	5.9	5.6	6.1	6.2	5.9	6.0	3.5	9.0	6.2	6.4
	F	4.7	4.7	4.7	4.8	4.5	4.7	3.6	7.6	4.1	5.1
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	2.7	3.1	2.5	2.5	2.4	2.8	2.4	3.4	3.3	3.2
	F	3.7	4.8	3.2	3.1	2.9	3.6	3.8	6.0	5.1	4.4
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	1.3	1.5	1.1	1.5	1.1	0.8	1.5	1.8	1.4	1.5
	F	1.6	1.9	1.5	1.9	1.3	1.3	1.3	2.1	2.1	1.8
Mental Disorders	M	7.5	10.8	6.0	6.5	6.1	5.3	13.8	14.7	8.3	9.4
	F	9.2	13.7	7.3	7.5	7.2	7.1	17.2	20.0	11.0	10.4
Other psychoses	M	2.7	3.8	2.2	2.5	2.5	1.5	4.9	5.3	3.7	1.7
	F	3.4	4.6	2.9	3.3	2.5	2.8	7.6	4.6	3.0	4.0
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	3.7	5.9	2.7	2.9	2.4	2.9	8.0	7.0	4.0	6.5
	F	4.9	8.3	3.4	3.4	3.2	3.5	8.9	14.2	7.3	5.6
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	13.6	12.6	14.0	15.4	13.0	13.5	16.0	11.2	10.5	13.6
	F	17.4	15.4	18.2	19.4	16.3	19.0	18.2	13.2	13.4	17.4
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4
	F	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4
Other disorders of the central nervous systm	M	1.0	1.2	0.9	0.6	0.5	1.5	1.3	1.1	1.2	1.3
	F	1.1	1.3	1.0	0.6	1.0	1.5	1.2	1.1	1.2	1.8
Disorders of the eye & adnexa	M	10.8	10.0	11.1	12.5	10.4	10.3	13.1	8.5	8.2	10.9
	F	13.7	12.1	14.4	16.0	12.4	14.7	14.4	9.8	10.6	13.7

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	24.9	27.2	23.9	23.5	22.2	26.2	25.2	32.3	24.1	31.3
	F	19.7	22.3	18.6	17.5	18.2	20.3	19.9	28.1	19.5	25.8
Ischemic heart disease	M	10.9	11.7	10.5	9.9	9.4	12.5	9.9	12.7	11.3	13.6
	F	6.2	6.7	6.0	5.2	5.4	7.6	4.7	8.2	6.1	9.1
Other forms of heart disease	M	5.9	6.4	5.7	6.0	4.9	6.1	5.8	7.2	6.0	7.4
	F	5.5	6.1	5.2	5.0	5.2	5.5	6.2	7.2	5.2	6.9
Cerebrovascular disease	M	3.0	3.1	2.9	2.4	3.1	3.3	3.3	3.8	2.5	3.3
	F	3.0	2.8	3.0	2.9	3.2	3.0	2.8	3.6	2.4	3.0
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	23.2	27.8	21.2	20.7	19.4	23.6	26.4	24.0	29.7	28.2
	F	21.4	26.0	19.4	19.4	16.8	22.3	21.2	28.7	27.4	27.2
Acute respiratory infections	M	3.8	5.5	3.1	3.0	2.2	4.1	5.4	3.7	6.4	5.1
	F	3.1	4.4	2.5	2.7	1.2	3.7	3.9	3.6	5.0	4.4
Pneumonia & influenza	M	4.6	5.5	4.1	3.6	3.8	5.1	4.4	6.2	5.6	6.2
	F	4.3	5.5	3.9	3.0	3.7	4.9	2.9	6.8	5.6	7.1
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	6.8	8.3	6.1	5.5	5.7	7.2	7.3	9.2	8.3	8.7
	F	6.3	8.2	5.5	5.1	4.4	7.3	5.7	12.4	7.7	8.9
Diseases of the Digestive System	M	30.3	33.1	29.0	33.6	29.6	23.4	27.5	42.1	29.5	39.5
	F	32.7	38.2	30.3	33.4	31.7	25.3	33.3	47.1	34.1	45.0
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	7.6	7.7	7.6	10.0	7.5	5.1	5.6	11.0	5.2	12.0
	F	7.8	8.7	7.5	8.9	8.2	5.1	7.2	13.9	5.0	13.5
Non-infective enteritis & colitis	M	3.6	5.2	2.9	3.6	2.9	2.1	4.0	5.2	6.3	4.6
	F	5.0	7.6	4.0	4.6	3.6	3.6	6.2	7.9	8.0	8.1
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	4.3	4.5	4.3	5.4	4.2	3.1	3.5	5.9	4.2	5.1
	F	6.4	7.2	6.0	6.9	6.4	4.6	6.2	9.7	6.8	7.0
Other diseases of digestive system	M	5.1	6.0	4.7	4.6	4.8	4.6	4.8	9.0	5.1	7.0
	F	7.6	8.9	7.1	7.0	6.6	7.8	8.2	8.0	9.0	9.9
Diseases of the Genitourinary System	M	17.3	16.5	17.6	19.1	20.2	13.2	11.9	30.5	14.9	15.2
	F	31.3	30.6	31.7	29.7	35.0	30.2	27.9	45.3	26.9	30.2
Other diseases of the urinary system	M	9.0	7.5	9.6	8.9	12.0	7.8	4.8	14.7	6.9	7.1
	F	10.8	8.5	11.9	10.6	16.5	8.2	7.0	17.7	6.8	6.7
Diseases of male genital organs	M	7.3	7.9	7.1	9.1	7.3	4.7	6.4	14.2	7.2	6.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	14.3	16.0	13.5	12.3	13.8	14.6	16.2	18.4	14.2	17.4
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.2	28.8	30.8	29.9	28.5	34.4	28.6	28.5	26.3	33.5
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	6.2	7.6	5.6	5.4	5.5	5.9	7.1	9.1	5.4	11.0
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.3	10.8	10.0	9.9	11.3	8.8	9.6	10.2	11.0	12.3
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.0	7.5	11.0	9.7	9.3	14.4	9.2	6.3	7.3	6.5
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	3.7	3.8	3.7	3.9	3.0	4.2	3.5	6.7	3.1	3.5
	F	3.3	3.5	3.2	3.7	2.5	3.5	2.0	5.3	3.4	4.0
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	11.7	10.3	12.3	9.9	12.6	14.5	10.4	15.0	8.3	10.9
	F	12.6	11.0	13.3	11.4	12.7	15.9	10.8	14.2	9.1	12.4
Arthropathies & related disorders	M	5.8	3.9	6.6	4.6	7.0	8.4	3.7	5.3	2.9	4.8
	F	5.9	4.1	6.7	4.8	6.8	8.6	3.5	5.2	3.3	5.3
Dorsopathies	M	2.2	2.8	1.9	1.7	2.0	2.0	2.8	5.2	2.1	2.6
	F	2.1	2.9	1.8	1.7	1.8	2.0	2.5	4.2	2.4	3.3
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	1.3	1.1	1.4	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.0	0.7
	F	1.9	1.5	2.1	2.4	1.8	2.1	1.7	2.0	1.1	1.4
Congenital Anomalies	M	1.4	1.4	1.4	1.0	2.0	1.2	1.2	1.0	1.6	1.3
	F	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	0.5	0.9	1.5	1.3
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5
	F	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	0.8
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	12.6	14.1	11.9	11.8	10.5	13.6	11.8	14.1	11.7	20.6
	F	14.3	15.8	13.6	12.7	12.4	16.0	13.9	15.8	12.9	23.1

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30c
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995 - 1996

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	13.7	16.0	12.6	11.7	12.0	14.3	15.1	17.7	14.5	18.7
	F	10.4	11.6	10.0	8.6	9.7	11.7	11.0	14.7	9.9	13.1
Fracture of skull	M	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	1.0	0.6	1.3	1.0	1.0
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2
Fracture of spine & trunk	M	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.9	0.5	0.8
	F	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.5	0.7	0.6
Fracture of upper limb	M	1.5	1.8	1.3	1.3	1.1	1.6	2.3	2.0	1.5	1.6
	F	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	1.4	1.5	0.9	0.9	1.2
Fracture of lower limb	M	1.8	2.0	1.6	1.5	1.5	1.9	1.8	2.6	1.7	2.3
	F	2.3	2.0	2.4	2.4	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	2.5
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	0.6	1.0	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	1.3	1.0	1.0
	F	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	1.5	0.5	0.4
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	0.8	1.0	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	1.6
	F	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.8
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Contusion with intact skin surface	M	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7
	F	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	0.3	0.2
Burns	M	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8
	F	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	0.8	1.3	0.6	0.5	0.5	0.7	1.3	1.7	1.0	1.7
	F	1.0	1.8	0.7	0.4	0.6	1.1	1.6	1.7	2.1	1.7
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2
	F	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	2.4	1.9	2.6	2.3	2.7	2.6	1.9	2.5	1.3	2.6
	F	2.4	1.7	2.6	2.4	2.5	3.1	1.4	2.7	1.1	2.6

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30d

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	2.9	3.5	2.6	2.6	2.2	3.0	3.4	5.6	3.0	3.1
	F	3.1	4.2	2.6	2.5	2.0	3.5	3.5	6.8	4.0	3.5
Neoplasms: Malignant	M	9.8	10.5	9.5	10.9	8.9	8.6	8.7	11.4	10.2	12.2
All causes	F	8.1	8.3	8.0	8.8	7.8	7.5	6.0	12.0	8.1	8.9
Digestive organs & peritoneum	M	1.0	0.8	1.0	1.1	1.1	0.8	0.9	1.0	0.6	1.1
	F	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.4	1.4	0.5	0.8
Respiratory & intra-thoracic organs	M	1.7	2.2	1.5	1.8	1.1	1.5	2.1	2.4	2.2	2.3
	F	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.4	0.9	1.1
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	F	2.0	2.0	2.0	2.4	1.3	2.4	1.5	2.9	2.0	2.1
Genitourinary organs	M	1.5	1.6	1.4	2.0	1.1	1.1	1.5	1.1	1.5	2.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	5.6	5.7	5.6	6.0	5.5	5.2	4.2	7.0	5.9	6.4
	F	4.5	4.6	4.5	4.8	4.8	3.6	3.3	6.2	4.7	4.9
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	2.8	3.1	2.7	2.4	2.8	2.9	2.2	3.8	3.2	3.3
	F	3.5	4.4	3.1	2.5	3.3	3.5	3.0	5.1	5.1	4.2
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	1.2	1.6	1.0	1.0	1.2	0.8	1.3	1.5	1.4	2.1
	F	1.5	1.7	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.6	1.6	1.7
Mental Disorders	M	7.3	10.7	5.9	6.5	5.9	5.2	12.7	15.0	8.6	9.5
	F	9.2	12.7	7.8	8.1	7.8	7.3	14.7	19.5	9.6	11.2
Other psychoses	M	2.8	3.9	2.3	2.9	2.1	1.8	6.0	4.3	3.5	2.2
	F	3.5	4.8	2.9	3.4	2.7	2.7	6.6	6.3	3.5	4.1
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	3.4	5.9	2.3	2.2	2.2	2.6	6.0	8.8	4.5	6.1
	F	4.7	7.0	3.6	3.5	3.6	3.8	7.2	12.0	5.5	6.3
Diseases of the Nervous System & Sense Organs All Causes	M	13.0	11.9	13.5	12.7	14.3	13.4	11.7	11.6	11.0	14.1
	F	16.5	14.4	17.3	15.4	19.0	17.7	16.9	13.6	12.3	16.0
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6
	F	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	0.4
Other disorders of the central nervous systm	M	0.9	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3	0.6	1.1	1.0	2.0
	F	1.2	1.4	1.1	0.8	0.9	1.5	1.3	1.7	1.1	2.1
Disorders of the eye & adnexa	M	10.2	9.6	10.5	10.0	11.3	10.3	10.0	8.6	9.0	10.6
	F	12.6	11.3	13.2	12.0	14.5	13.2	13.7	9.7	10.0	11.9

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	24.7	27.8	23.3	22.8	23.1	24.1	28.5	30.6	25.8	28.9
	F	19.6	22.8	18.2	17.1	17.7	20.1	20.5	29.0	19.9	26.4
Ischemic heart disease	M	11.3	13.0	10.5	10.3	9.4	11.8	13.1	12.9	12.2	14.4
	F	6.3	6.9	6.1	6.0	4.9	7.4	5.9	6.7	6.0	9.7
Other forms of heart disease	M	6.0	6.5	5.8	5.7	5.3	6.3	7.2	6.4	6.3	6.4
	F	5.7	6.6	5.3	4.7	5.2	6.0	6.7	9.6	6.0	6.4
Cerebrovascular disease	M	3.0	3.2	2.9	2.7	3.2	2.9	3.4	3.3	2.9	3.5
	F	3.0	3.3	2.9	2.5	3.2	2.9	3.5	3.8	2.8	3.6
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	21.0	24.5	19.5	18.8	18.4	21.4	25.1	23.3	25.3	23.2
	F	18.8	22.6	17.2	15.7	16.0	20.3	20.9	23.3	24.4	21.1
Acute respiratory infections	M	3.5	4.8	2.9	3.3	2.0	3.5	4.6	5.5	5.0	4.1
	F	3.0	4.4	2.4	2.6	1.6	3.0	4.4	4.5	4.6	4.1
Pneumonia & influenza	M	4.5	4.9	4.2	3.7	4.4	4.7	4.0	5.6	5.6	5.2
	F	4.0	4.6	3.7	3.2	3.5	4.4	2.2	5.2	5.4	4.5
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	6.4	7.6	5.9	5.5	5.0	7.1	7.7	7.9	6.9	8.3
	F	5.6	6.8	5.1	4.7	4.0	6.5	6.6	9.1	6.3	6.3
Diseases of the Digestive System	M	27.0	31.0	25.2	21.8	29.3	24.5	27.7	36.7	28.7	35.3
	F	28.5	33.3	26.4	21.3	31.5	26.6	32.0	43.2	28.7	36.1
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	6.4	6.8	6.2	3.9	8.6	6.2	6.0	8.8	4.7	10.3
	F	6.4	7.5	6.0	3.7	8.6	5.6	7.5	12.1	4.2	10.2
Non-infective enteritis & colitis	M	2.6	3.9	2.1	1.8	2.5	1.9	2.5	4.1	4.6	4.2
	F	3.7	5.3	3.1	2.3	3.4	3.6	4.3	5.6	6.0	5.1
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	3.9	4.5	3.7	3.0	4.5	3.5	4.2	4.8	4.5	4.6
	F	5.4	6.2	5.1	3.8	6.2	5.1	6.8	8.9	5.4	5.3
Other diseases of digestive system	M	4.7	5.9	4.2	4.1	4.3	4.3	4.2	8.1	6.0	6.3
	F	7.3	7.9	7.1	6.9	6.7	7.7	7.8	8.8	7.0	9.2
Diseases of the Genitourinary System	M	16.4	15.1	16.9	17.0	19.3	14.5	14.3	23.1	13.3	14.0
	F	29.6	31.4	28.8	25.6	32.8	28.0	29.2	43.5	27.0	33.6
Other diseases of the urinary system	M	8.4	6.9	9.1	8.0	11.0	8.2	4.9	11.9	6.0	7.2
	F	10.5	8.3	11.5	9.3	16.4	8.8	7.1	15.6	7.4	6.5
Diseases of male genital organs	M	7.0	7.0	7.0	8.0	7.6	5.4	8.2	10.2	6.2	5.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	13.4	16.6	12.0	10.9	12.1	13.1	17.3	19.2	13.5	19.4
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	28.5	26.7	29.2	27.3	27.6	33.1	25.0	26.9	24.1	33.1
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	5.4	6.2	5.1	4.4	5.5	5.4	5.7	8.2	4.5	8.4
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.8	9.6	9.9	8.4	11.1	10.3	7.8	8.3	9.3	13.1
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.7	7.8	10.4	10.0	9.0	12.4	8.6	7.7	8.0	6.8
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	3.4	3.8	3.3	3.4	2.9	3.4	2.9	6.2	3.7	3.3
	F	3.2	3.4	3.0	3.2	2.5	3.4	2.2	5.1	3.7	3.3
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	12.3	10.4	13.2	11.1	13.0	15.6	9.2	15.0	8.4	12.2
	F	13.5	12.1	14.2	11.9	13.6	17.2	12.5	15.1	9.7	14.0
Arthropathies & related disorders	M	6.4	4.0	7.4	5.4	7.4	9.6	3.4	6.2	3.1	4.8
	F	6.3	4.4	7.1	5.1	7.5	9.0	3.8	6.4	3.4	5.5
Dorsopathies	M	2.2	2.6	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	4.1	1.9	3.6
	F	2.3	2.5	2.2	2.0	2.0	2.6	2.4	2.8	2.1	3.2
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	1.4	1.3	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3
	F	2.0	2.0	1.9	2.1	1.7	2.1	2.3	3.0	1.7	1.5
Congenital Anomalies	M	1.3	1.3	1.3	1.2	1.6	1.1	0.8	1.0	1.8	1.1
	F	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.0	0.9	0.7	1.1	0.8
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.2
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	11.8	12.8	11.4	11.6	10.2	12.5	11.8	12.0	11.3	17.1
	F	13.5	14.4	13.1	11.9	12.4	15.3	11.7	18.3	10.4	22.0

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30d
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1996 - 1997

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	13.4	16.8	11.9	10.6	11.4	13.7	18.8	17.2	15.5	16.5
	F	10.3	11.7	9.7	8.7	9.7	10.9	10.5	15.0	9.9	14.3
Fracture of skull	M	0.8	1.1	0.7	0.7	0.5	0.8	1.1	0.9	1.4	0.8
	F	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
Fracture of spine & trunk	M	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	1.0	0.6	0.7	0.9
	F.	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.9
Fracture of upper limb	M	1.7	2.2	1.4	1.4	1.2	1.8	3.6	1.4	1.9	1.7
	F	1.2	1.5	1.1	1.2	0.9	1.2	2.1	1.4	1.0	1.5
Fracture of lower limb	M	1.9	2.3	1.7	1.5	1.7	1.9	2.7	2.7	2.2	2.1
	F	2.3	2.1	2.4	2.2	2.8	2.2	1.9	2.9	1.6	2.7
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	0.6	0.8	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8
	F	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	1.3	0.6	0.8
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	1.1	0.5	1.1
	F	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.8
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
Contusion with intact skin surface	M	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0	1.1	0.7	0.4
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.6
Burns	M	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6
	F	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6
	F	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	0.7	1.1	0.5	0.4	0.6	0.6	1.1	0.7	1.3	1.0
	F	1.0	1.8	0.6	0.5	0.4	1.0	1.7	2.1	1.8	1.6
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	2.3	2.0	2.4	2.2	2.6	2.4	2.4	3.0	1.4	2.1
	F	2.2	1.7	2.4	2.2	2.6	2.5	1.7	2.8	1.2	1.9

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30e **Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998**

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Infectious & Parasitic Diseases	M	2.9	4.2	2.4	2.0	2.5	2.7	3.6	6.5	4.1	3.8
	F	3.1	4.3	2.5	2.2	2.1	3.3	3.5	5.4	4.0	4.9
Neoplasms: Malignant	M	9.4	10.1	9.1	9.1	9.8	8.2	7.4	11.2	10.3	12.1
All causes	F	8.1	7.9	8.2	8.0	8.8	7.8	5.1	9.4	8.9	8.2
Digestive organs & peritoneum	M	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	0.6	1.0
	F	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	1.3	0.7	1.0
Respiratory & intra-thoracic organs	M	1.5	2.0	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	2.2	2.1	2.2
	F	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8
Breast	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	1.8	2.0	1.8	1.8	1.6	1.9	1.3	1.7	2.5	2.4
Genitourinary organs	M	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.1	1.0	1.1	1.6	1.7
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Other & unspecified sites	M	5.6	5.9	5.5	5.5	5.8	5.2	4.3	6.9	5.9	7.2
	F	4.6	4.2	4.7	4.5	5.3	4.4	2.5	5.5	4.9	4.1
Endocrine, Nutritional & Metabolic diseases & Immunity Disorders	M	3.0	3.2	2.9	2.8	3.0	2.9	2.2	3.7	3.3	3.6
	F	3.8	4.5	3.5	3.7	3.1	3.7	3.7	6.3	4.4	4.3
Diseases of Blood & Blood Forming Organs	M	1.2	1.7	1.0	1.0	0.9	1.1	1.5	1.6	2.1	1.4
	F	1.5	1.7	1.4	1.1	1.5	1.5	1.1	2.2	1.9	1.4
Mental Disorders	M	7.4	10.8	5.9	6.9	5.7	5.1	15.0	12.9	8.4	9.3
	F	9.0	13.0	7.3	7.5	6.8	7.5	17.4	20.0	8.9	10.7
Other psychoses	M	3.1	4.3	2.5	3.2	2.3	2.0	6.7	4.4	4.2	1.9
	F	3.8	5.5	3.1	3.9	2.4	3.0	9.3	6.8	4.3	2.7
Neurotic disorders, personality disorders, & other non psychotic disorders	M	3.4	5.6	2.4	2.6	2.2	2.4	7.5	7.0	3.5	6.4
	F	4.1	6.8	3.0	2.6	2.9	3.6	7.6	12.1	3.9	7.4
Diseases of the Nervous System & Sense Organs	M	13.6	13.2	13.8	13.3	14.9	13.3	13.2	15.2	12.1	13.7
All Causes	F	17.7	16.1	18.4	16.9	19.7	18.7	15.4	18.9	15.5	16.1
Hereditary & degenerative disease of the central nervous system	M	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8
	F	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.2	1.3	0.9	0.4
Other disorders of the central nervous systm	M	0.9	1.1	0.7	0.6	0.5	1.1	1.0	1.4	0.9	1.5
	F	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.5	1.2	1.0	1.5
Disorders of the eye & adnexa	M	10.8	10.2	11.1	10.7	12.1	10.4	10.2	11.2	9.8	10.5
	F	13.8	12.8	14.2	13.0	15.2	14.4	12.1	14.7	12.6	12.6

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Disease of the Circulatory System All Causes	M	24.9	28.1	23.5	22.3	22.3	26.2	26.4	34.9	25.7	30.1
	F	19.5	22.5	18.2	17.3	18.4	19.0	20.7	27.2	21.1	24.1
Ischemic heart disease	M	11.1	12.6	10.4	9.5	8.8	12.9	12.1	13.6	12.3	13.1
	F	6.3	7.4	5.8	5.6	5.2	6.7	6.4	8.2	7.0	8.8
Other forms of heart disease	M	6.1	7.1	5.6	5.4	5.0	6.5	6.7	9.2	6.7	6.9
	F	5.9	6.9	5.5	5.0	5.3	6.1	6.5	8.5	6.6	7.0
Cerebrovascular disease	M	3.0	3.1	2.9	2.8	2.9	3.0	2.4	4.2	2.4	4.5
	F	2.9	2.9	2.9	2.8	3.1	2.8	2.8	3.2	2.6	3.4
Diseases of the Respiratory System All Causes	M	21.9	26.6	19.8	19.3	18.7	21.5	23.7	26.2	28.3	26.9
	F	19.2	23.1	17.5	16.4	16.0	20.3	20.1	21.8	25.3	23.7
Acute respiratory infections	M	3.7	5.1	3.0	3.3	1.9	3.9	4.6	5.7	4.8	5.5
	F	2.6	3.8	2.1	2.1	1.2	2.9	3.4	3.4	4.2	3.8
Pneumonia & influenza	M	4.8	6.0	4.3	4.0	4.2	4.7	3.5	7.1	7.0	6.0
	F	4.4	5.6	4.0	3.5	4.1	4.4	2.4	6.0	6.3	7.4
Chronic obstructive pulmonary disease allied conditions	M	6.6	8.4	5.8	5.2	5.4	6.7	7.7	9.6	8.3	8.5
	F	5.8	7.0	5.3	5.0	4.4	6.8	6.3	8.9	7.1	6.4
Diseases of the Digestive System	M	26.1	29.2	24.7	20.5	29.8	24.1	30.3	35.4	27.3	27.7
	F	27.8	31.7	26.1	20.0	32.6	25.9	31.4	40.1	29.0	31.1
Diseases of oesphagus, stomach & duodenum	M	5.6	5.2	5.7	3.4	7.9	6.1	7.4	7.6	3.8	4.0
	F	5.7	5.3	5.8	3.1	8.9	5.6	7.1	8.0	4.2	3.2
Non-infective enteritis & colitis	M	2.6	4.1	2.0	1.7	2.2	2.0	3.3	4.1	5.0	3.3
	F	3.4	5.3	2.6	2.1	2.7	3.0	4.6	5.7	5.7	5.4
Other diseases of the intestines & peritoneum	M	4.0	4.2	3.9	3.5	4.8	3.2	4.1	4.5	4.5	3.8
	F	5.4	6.3	5.0	4.1	6.2	4.8	6.0	9.8	5.3	5.8
Other diseases of digestive system	M	4.6	5.8	4.1	3.5	4.5	4.3	4.6	8.1	5.6	6.2
	F	7.5	8.5	7.1	6.2	7.7	7.3	7.2	9.5	8.2	9.9
Diseases of the Genitourinary System	M	15.5	14.4	16.0	17.0	16.3	14.5	13.5	18.0	15.1	12.1
	F	26.4	28.2	25.7	24.4	25.6	27.2	26.5	33.6	25.6	29.1
Other diseases of the urinary system	M	7.9	6.7	8.4	7.7	9.6	7.8	6.3	8.7	6.7	6.0
	F	8.6	7.6	9.0	8.6	9.9	8.4	9.4	8.9	7.5	4.9
Diseases of male genital organs	M	6.7	6.6	6.8	8.1	5.9	6.2	6.6	7.9	7.2	4.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Other disorders of female genital tract	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	12.2	14.1	11.4	11.0	10.9	12.5	14.2	16.2	11.6	17.3
Complications of Pregnancy, Child birth & the Peurperium	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	28.0	27.9	28.0	26.0	25.4	33.0	25.2	28.4	26.3	33.6
Complications mainly related to pregnancy	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	5.6	7.1	5.0	3.9	5.2	6.0	5.6	8.9	6.0	9.5
Normal delivery & other indications for care in labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.4	9.5	9.4	7.7	10.4	10.0	7.8	9.4	8.8	12.9
Complications occuring mainly in the course of labour & delivery	M	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.2	8.0	9.7	9.3	8.0	12.0	9.3	7.2	8.3	6.4
Diseases of the Skin & Subcutaneous Tissue	M	3.4	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4	2.9	5.2	3.1	3.7
	F	3.4	3.6	3.4	3.1	3.3	3.8	3.1	5.6	3.3	3.4
Diseases of the Musculo-skeletal System & Connective Tissue	M	12.6	11.5	13.1	11.2	12.9	15.5	10.7	14.9	10.1	12.7
	F	13.8	12.4	14.4	12.9	14.0	16.4	12.5	16.2	10.5	13.0
Arthropathies & related disorders	M	6.5	4.6	7.3	5.5	7.5	9.0	3.8	5.7	4.1	5.6
	F	6.4	4.3	7.3	5.6	7.9	8.7	3.3	5.7	3.5	6.0
Dorsopathies	M	2.1	2.6	1.9	2.2	1.7	1.8	2.3	4.2	1.7	3.6
	F	2.1	2.5	2.0	2.4	1.8	1.8	2.1	3.4	2.4	2.6
Osteopathies, chondro-pathies & acquired musculoskeletal deformities	M	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	1.3	1.7	1.2	0.8
	F	1.9	2.0	1.9	2.0	1.6	1.9	2.4	2.7	1.8	1.4
Congenital Anomalies	M	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.1	1.0	0.7	1.7	1.4
	F	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.7	1.3	1.0
Certain Conditions Originating in the Perinatal Period	M	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.9	0.2
	F	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5
Symptoms, Signs & Ill-defined Conditions	M	12.1	12.6	11.9	12.0	10.6	13.2	11.1	12.2	11.2	17.1
	F	13.8	13.5	13.9	13.0	12.9	16.0	11.6	16.9	11.4	17.1

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

Table 30e
(continued)

Hospital Utilization for Selected Diagnosis by Sex According to SEPARATIONS, per 1,000 population, in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1997 - 1998

Selected Diagnosis	Sex	NB	North	South	Regions I	II	III	IV	V	VI	VII
Injury & Poisoning	M	13.0	15.3	12.0	11.0	11.2	14.0	15.2	17.7	14.2	15.7
	F	9.9	10.6	9.6	8.6	9.2	11.2	9.9	12.6	9.4	12.2
Fracture of skull	M	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	1.1	1.0
	F	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
Fracture of spine & trunk	M	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.2	0.5	0.9
	F	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
Fracture of upper limb	M	1.7	2.1	1.5	1.4	1.1	2.1	2.9	1.9	2.1	1.4
	F	1.2	1.5	1.1	0.9	0.9	1.6	2.4	1.4	1.1	1.1
Fracture of lower limb	M	1.9	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	2.1	3.2	1.8	2.0
	F	2.2	1.9	2.4	2.4	2.4	2.2	1.7	2.0	1.7	2.4
Sprains & strains of joints & adjacent muscles	M	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7	0.8
	F	0.3	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5
Intracranial injury, excluding those with skull fracture	M	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.9	0.2	0.3
Internal injury of chest, abdomen & pelvis	M	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Contusion with intact skin surface	M	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6	0.6	0.6
	F	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4
Burns	M	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2
Certain traumatic complications & unspecified injuries	M	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
Poisoning by drugs, medicaments biological substances	M	0.7	1.3	0.4	0.4	0.3	0.5	1.3	1.1	1.3	1.3
	F	0.9	1.6	0.6	0.5	0.5	0.9	1.1	2.0	1.5	1.9
Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	M	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Complications of surgical & medical care not else where classified	M	2.3	2.0	2.5	1.9	2.5	3.0	1.9	3.1	1.8	2.0
	F	2.3	1.9	2.5	2.3	2.4	3.0	1.7	2.6	1.7	1.9

Source: N.B. Department of Health & Wellness, Program Support Services - Hospital Utilization Database

NOTES TO FIGURE 46

Figure 46 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for mental disorders in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, there was considerable year-to-year variation in the number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders, with highest number of disorders in the male population during the year 1995/96.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for mental disorders increased by approximately 9% in females. In males, for the same time period, hospital separation per 1,000 population increased 14% in 1994/95, then remained relatively stable thereafter.

Figure 46 Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Mental Disorders by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98



NOTES TO FIGURE 47

Figure 47 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average for males in Regions IV, V, and VII. In the remaining regions, there were no significant differences between any of the regional averages and the provincial average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders in males during the period 1993/94 to 1997/98.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average for females in Regions IV, V, VI, and VII. In the remaining regions, there were no significant differences between any of the regional and provincial averages for mental disorders in females during the period from 1993/94 - 1997/98.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders was significantly higher for both males and females in the North of the Province than the South of the Province during the period 1993/94 - 1997/98.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders was significantly higher for males than for females in Regions II, IV & V. In Region VII, there was no significant difference between males and females in the average number of hospital care days. The average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders was significantly higher in males than for females in the North of the Province and in the Province overall.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for mental disorders was significantly higher for females than for males in Region I, IV & VII and in the South of the Province.

Figure 47 Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Mental Disorders by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98



NOTES TO FIGURE 48

Figure 48 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for mental disorders in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- For males, the average number of hospital separations, per 1,000 population, in Regions IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- For females, the average number of hospital separations, per 1,000 population, in Regions IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for mental disorders was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital separations for mental disorders was significantly higher for females than for males in all Regions, in the North compared to the South and in the Province overall.

Figure 48 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Mental Disorders by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

NOTES TO FIGURE 49

Figure 49 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system (all causes), ischemic heart disease (IHD) and cerebrovascular disease (CVD) in males and females in the Province of New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

Diseases of the Circulatory System (All Causes)

- Between 1993/94 and 1997/98, hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system declined by approximately 24% in both males and females. During the same time period, the number of separations, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system remained essentially unchanged in both males and females between 1993/94 – 1997/98.

Ischemic Heart Disease

- Hospital care days, per 1,000 population, for IHD declined by approximately 23% in males and 18% in females between 1993/94 and 1997/98. The number of hospital separations, per 1,000 population, in females increased by 13% during the five-year period. In males, the number of separations, per 1,000 population, showed an overall increase of approximately 3% between 1993/94 – 1997/98.

Cerebrovascular Disease

- Hospital care days, per 1,000 population, for CVD increased by approximately 20% in males in 1996/97 and then declined almost 47%. The hospital care days, per 1,000 population, for CVD declined by approximately 40% in females between 1993/94 and 1997/1998. Although there was some year-to-year fluctuation, there was little overall change in the number of hospital separations, per 1,000 population, for CVD in either males or females during the five-year period.

Figure 49 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Populations, for Diseases of the Circulatory System by Gender, New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**







NOTES TO FIGURE 50

Figure 50 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system (all causes) in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males in Regions I, II, V, and VII was significantly higher than the provincial average for males.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for females in Regions II, IV, V, and VII was significantly higher than the provincial average for females.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system was significantly higher in the South than in the North of the Province for males.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system was significantly higher in the North than in the South of the Province for females.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for disease of the circulatory system was significantly higher for males than for females in Regions I, II, III, VI and VII. In Region IV, where there was no significant difference in either males or females. However, the average number of hospital care days, per 1,000 population, for disease of the circulatory system was significantly higher for females than for males in Region V.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for disease of the circulatory system was significantly higher for males than for females in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 51

Figure 51 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system (all causes) in males and females in the Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- For males, the average number of separations, per 1,000 population, in Regions IV, V and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- For females, the average number of separations, per 1,000 population, in Regions V and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the circulatory system was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital separations for diseases of the circulatory system was significantly higher for males than for females, at the provincial level, and in the North and South of the Province.

- The average number of hospital separations for diseases of the circulatory system was significantly higher for males than for females in all Regions except Region V.

Figure 50 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Diseases of the Circulatory System – All Causes by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 51 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Circulatory System – All Causes by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



CEREBROVASCULAR DISEASE

NOTES TO FIGURE 52

Figure 52 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for cerebrovascular disease in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males was significantly higher than the provincial average for males in Regions I, II, and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for females was significantly higher than the provincial average for females in Region II.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for both males and females was significantly higher in the South than the North of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days for cerebrovascular diseases was significantly higher in males versus females in Regions I, III, and VII. There was no significant difference in the average number of hospital care day, per 1,000 population, between males and females for cerebrovascualr diseases in Regions V and VI. However, the average number of hospital care days, per 1,000 population, for cerebrovascular diseases was significantly higher in females versus males in Region II.

- The average number of hospital care days for cerebrovascular diseases was significantly higher in males versus females in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 53

Figure 53 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for cerebrovascular disease in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for males in Regions III, V and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for females significantly higher than the provincial average in Regions III, V, and VII.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for cerebrovascular disease was significantly higher in the North than in the South of the Province for males.

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for cerebrovascular disease among females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations for diseases of the cerebrovascular disease was significantly higher for males than for females, at the provincial level, in the North and in the South of the Province.

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for cerebrovascular diseases was significantly higher for males than for females in all regions.

Figure 52 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Cerebrovascular Diseases by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 53 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Cerebrovascular Diseases by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



ISCHEMIC HEART DISEASE

NOTES TO FIGURE 54

Figure 54 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for ischemic heart disease in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- For males, the average number of hospital care days, per 1,000 population, for Regions I, IV, V, VI, and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- For females, the average number of hospital care days, per 1,000 population, for Regions IV, V, and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for both males and females was significantly higher in the North than in the South of the Province.

Gender Differences

- Average number of hospital care days, per 1,000 population, for ischemic heart disease was significantly higher for males than for females in all regions, in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 55

Figure 55 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for ischemic heart disease in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for ischemic heart disease in males was significantly higher in Region VII. None of the other regional averages were significantly greater than the provincial average for males.

Regions: Females

- There was no significant difference in average number of hospital separations, per 1,000 population, for females between any of the regional averages and the provincial average.

North and South

- There were no significant North/South differences in the number of hospital separations, per 1,000 population, for ischemic heart disease in either males or females.

Gender Differences

- There were no significant differences between males and females for ischemic heart diseases in any of the regions, in the North, South and in the Province overall.

Figure 54 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Ischemic Heart Disease by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 55 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Ischemic Heart Disease by gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

NOTES TO FIGURE 56

Figure 56 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system (all causes), and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in males and females in the Province of New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

Diseases of the Respiratory System (All Causes)

- Between 1993/94 and 1997/98, hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system declined by approximately 21% in males and 12% in females. During the same time period, the number of separations, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system decreased by approximately 6% in males, and 7% in females.

- **Chronic Obstructive Pulmonary Disease**

  Hospital care days, per 1,000 population, for COPD declined by approximately 38% in males and 17% in females between 1993/94 - 1997/98. The number of hospital separations, per 1,000 population, for COPD declined by approximately 12% in males and 16% in females.

Figure 56 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population for Diseases of the Respiratory System by Gender: New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**





NOTES TO FIGURE 57

Figure 57 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males in Regions IV, V, VI, and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for females in Regions IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for both males and females was significantly higher in the North than in the South of the Province.

Gender Difference

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system was significantly higher for males than for females in all regions, in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 58

Figure 58 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for males in Regions IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for females in Regions V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the respiratory system was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital separations for diseases of the respiratory system was significantly higher for males than for females in Regions I, II, IV and VI.

- The average number of hospital separations for the diseases of the respiratory system was significantly higher for males than for females in the North, South and in the Province overall.

Figure 57 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population for Diseases of the Respiratory System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



Figure 58 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population for Diseases of the Respiratory System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

NOTES TO FIGURE 59

Figure 59 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for chronic obstructive pulmonary disease in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-years period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for chronic obstructive pulmonary disease in males was significantly higher than the provincial average in Regions IV, V, VI and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for chronic obstructive pulmonary diseases in females was significantly higher than the provincial average in Regions IV, V, VI and VII.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for chronic obstructive pulmonary diseases was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- There was no significant difference between males and females in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for COPD in Region VII. The average number of hospital care days for COPD was significantly higher for the males than for the females in Regions I, II, III, IV and VI, but was significantly higher for females than for males in Region V.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for COPD was significantly higher in males versus the females in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 60

Figure 60 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population for COPD in males and females in the seven Health Regions, North, South and the Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of separations for COPD, per 1,000 population, for males in Regions IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of separations for COPD, per 1,000 population, for females in Regions III, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for chronic obstructive pulmonary disease was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital separations for COPD was significantly higher for males than for females in Regions II and IV. In all other regions there was no significant gender differences in the average number of hospital separations, per 1,000 population.

- The average number of hospital separations for COPD was significantly higher for males than for females at the Provincial level, but there was no significant difference between the average number of hospital separations for males versus females in the North, or in the South of the Province.

Figure 59 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for COPD by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 60 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for COPD by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



NOTES TO FIGURE 61

Figure 61 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the digestive system in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population for diseases of the digestive system declined by approximately 16% in males and 13% in females.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the digestive system rose 16%, in both males and females, peaking in 1995/96, then decreasing again to 1993/94 levels.

Figure 61 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Digestive System by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 62

Figure 62 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the digestive system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick, during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care day, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average for males in Regions IV, V, VI and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher than the provincial average for females in Regions IV, V, VI and VII.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher for both males and females in the North than in the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher for females than for males in Regions III, IV, V and VI. In Region I, the average number of hospital care days was significantly higher for males than for females. In Region VII, there was no significant difference between males and females in the average number of hospital care days for diseases of the digestive system.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher for females than for males in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 63

Figure 63 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the digestive system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations for disease of the digestive system per, 1,000 population, in males for Regions II, V and VII was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital separations for disease of the digestive system, per 1,000 population, in females for Regions II, IV, V, VI and VII was significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher in the North than in the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the digestive system was significantly higher for females than for males in Regions II, III, V and VI, in the North, in the South and in the Province overall. There was no significant difference between males and females in the average number of hospital separations for diseases of the digestive system in Regions I, IV and VII.

Figure 62 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Diseases of the Digestive System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 63 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Digestive System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



NOTES TO FIGURE 64

Figure 64 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, hospital care days, per 1,000 population, for malignant neoplasms declined by approximately 22% in males and 23% in females.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms declined by approximately 5% in males and was unchanged in females.

Figure 64 **Hospital Care Days, and Hospital Separations, per 1,000 population, for Malignant Neoplasms by Gender: New Brunswick, 1993/94 –1997/98**



NOTES TO FIGURE 65

Figure 65 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for malignant neoplasms (all causes) in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for malignant neoplasms in males was higher than the provincial average in Regions I, IV, V & VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for malignant neoplasms in females was higher than the provincial average in Regions I and V.

North and South

- The average number of hospital care days for malignant neoplasms was significantly higher for both males and females in the North than in the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for malignant neoplasms was significantly higher for males than for females in Regions I, II, IV, VI and VII. There was no significant difference between males and females in Regions III and V.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher in males than females in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 66

Figure 66 shows the average number of separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms (all causes) in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- In males, there were no significant differences between any of the regional averages and the average provincial number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms, except for Regions V and VII where the average number of hospital separations, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- In females, there were no significant differences between any of the regional averages and the average provincial number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms, except for Regions V and VII where the average number of hospital separations, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average.

North and South

- There were no significant North/South differences in the number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms in either males or females.

Gender Differences

- There was no significant difference between males and females in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for malignant neoplasms in Regions I, IV, V, VI and VII. However the average number of hospital separations, per 1,000 population, was significantly greater for females versus males in Regions II and III.

- The average number of hospital separations for malignant neoplasms was significantly higher for females versus males in the North, South and in the Province overall.

Figure 65 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Malignant Neoplasms - All Causes, by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 -1997/98**



Figure 66 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Malignant Neoplasms - All Causes, by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 -1997/98**



LUNG CANCER

NOTES TO FIGURE 67

Figure 67 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for lung cancer in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for lung cancer in males was significantly higher than the provincial average in Regions I, IV, V and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days per, 1,000 population, for lung cancer in females was significantly higher than the provincial average in Regions I, V and VII.

North and South

- The average number of hospital care days in males was significantly higher in the North than the South of the Province.

- There was no significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher for males than for females in all regions, in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 68

Figure 68 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for lung cancer in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for lung cancer was significantly higher than the provincial average in Regions IV and V.

Regions: Females

- There were no significant differences between any of the regional averages and the provincial average number of hospital separations, per 1,000 population, for lung cancer in females.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for lung cancer in either males or females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for lung cancer was significantly higher for males than for females in all of the Health Regions.

- The average number of hospital separations for lung cancer was significantly higher for males than for females in the North, South and in the Province overall.

Figure 67 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Lung Cancer by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 68 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Lung Cancer by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



PROSTATE CANCER

NOTES TO FIGURE 69

Figure 69 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for prostate cancer in the seven Health Regions, North, south and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for prostate cancer was significantly higher than the provincial average in Regions I, II and VII.

North and South

- There were no significant North/South differences in the number of hospital care days, per 1,000 population, for prostate cancer.

NOTES TO FIGURE 70

Figure 70 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for prostate cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for prostate cancer was significantly higher than the provincial average in Region I.

North and South

- There was no significant North/South difference in the number of hospital separations, per 1,000 population, for prostate cancer.

Figure 69 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Prostate Cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 70 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Prostate Cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



FEMALE BREAST CANCER

NOTES TO FIGURE 71

Figure 71 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for female breast cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

- The average numbers of hospital care days, per 1,000 population, for breast cancer was significantly higher than the provincial average in Regions I, V and VI.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for breast cancer was significantly higher in the North than in the South of the Province.

NOTES TO FIGURE 72

Figure 72 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for female breast cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

- There were no significant differences between any of the regional averages and the provincial average number of hospital separations, per 1,000 population, for breast cancer in females.

North and South

- There were no significant North/South differences in the number of hospital separations, per 1,000 population, for female breast cancer.

Figure 71 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Female Breast Cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 72 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Female Breast Cancer in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



COLORECTAL CANCER

NOTES TO FIGURE 73

Figure 73 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for colorectal (colon and rectum) cancer in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for colorectal cancer in males was significantly higher than the provincial average in Regions I, IV, V and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for colorectal cancer in females was significantly higher than the provincial average in Regions I and V.

North and South

- There were no significant differences in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for colorectal cancer in males or females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for colorectal cancer was significantly higher for females than males in Regions II, South and the Province overall. There was no significant difference between males and females in Regions I, III, V and VI.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher for males than for females in Region IV, VII and North of the Province.

NOTES TO FIGURE 74

Figure 74 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for colorectal cancer in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- There were no significant differences between any of the regional averages and the provincial average number of hospital separations, per 1,000 population, for colorectal cancer in males.

Regions: Females

- There were no significant differences between any of the regional averages and the provincial average number of hospital separations, per 1,000 population, for colorectal cancer in females.

North and South

- There were no significant North/South differences in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for colorectal cancer in either males or females.

Gender Differences

- There were no significant differences between males and females in the average number of hospital separations for colorectal cancer at the regional level, in the North, South or in the Province overall.

Figure 73 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Colorectal Cancer by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 74 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Colorectal Cancer by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH & PUERPERIUM

NOTES TO FIGURE 75

Figure 75 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium decreased significantly by 34%.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium decreased by approximately 16%.

Figure 75 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Complication of Pregnancy, Childbirth and Puerperium in females, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 76

Figure 76 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in Regions III and V were significantly higher than the Provincial average.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in the North compared to the South of the Province.

NOTES TO FIGURE 77

Figure 77 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, in females for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Females

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, in females for complications of pregnancy, childbirth and puerperium in Regions III and VII were significantly higher than the provincial average.

North and South

- There was no significant North/South difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, in females for the complications of pregnancy, childbirth and puerperium.

Figure 76 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Complications of Pregnancy, Childbirth & Puerperium in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 77 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Complications of Pregnancy, Childbirth & Puerperium in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

NOTES TO FIGURE 78

Figure 78 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system and sense organs in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the nervous system and sense organs declined by approximately 17% in males, and increased by 3% in females. A notable increase in the number of hospital care days among males was seen in the year 1996/97.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system and sense organs increased by approximately 15% in males and 25% in females.

Figure 78 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Disease of the Nervous System and Sense Organs by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 79

Figure 79 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males in Region II, V and VII were significantly higher than the provincial average for males.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in females in Regions II, IV and V were significantly higher than the provincial averages for females.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the nervous system was significantly higher in the North for both males and females than in the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males was significantly higher than for females in all regions, except region IV where the average number of hospital care days were significantly higher for females than males.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for nervous system was significantly higher for males than for females in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 80

Figure 80 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in males was significantly higher than the provincial average in Region IV.

Regions: Females

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in females was significantly higher than the provincial average in Regions III and IV.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system in both males and females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system was significantly greater for females than for males in all regions, except Region V.

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the nervous system was significantly greater for females versus males in the North, South and in the Province overall.

Figure 79 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Diseases of the Nervous System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 80 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Nervous System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



NOTES TO FIGURE 81

Figure 81 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for injuries and poisonings in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning declined by approximately 30% in males and 32% in females, with the notable exception for females in 1995/96.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for injury and poisoning declined by approximately 7% in males, but showed no overall change in females.

Figure 81 Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Injury and Poisoning by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98



NOTES TO FIGURE 82

Figure 82 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning in males in Regions I, IV, V and VII were significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning in females in Regions I, II, V and VII were significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning in females was significantly higher in the South than the North of the Province.

- There was a significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, in males in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning was significantly higher for females than for males in Regions I, II, III and V. In Region VII, the average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning was significantly higher for males than for females.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for injury and poisoning was significantly higher for females than for males in the South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 83

Figure 83 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for injury and poisoning in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations for injury and poisoning, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average in Regions IV, V and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital separations for injury and poisoning, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average in Regions III, V and VII.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for injury and poisoning was significantly higher for males in the North than in the South of the Province.

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for injury and poisoning in females for the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for injury and poisoning was significantly higher for males than for females in each of the regions, as well as in the North, South and in the Province overall.

Figure 82 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population for Injury and Poisoning by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



Figure 83 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population for Injury and Poisoning by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

NOTES TO FIGURE 84

Figure 84 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 -1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system declined by approximately 15% in males, and 23% in females.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system increased by 10% in both males and females.

Figure 84 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Musculoskeletal System by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 85

Figure 85 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population for diseases of the musculoskeletal system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system was significantly higher than the provincial average for the males in Regions II, IV, V and VII.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system was significantly higher than the provincial average for females in Regions III, IV, V and VII.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in males in the North versus the South of the Province.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in females was significantly higher in the North than in the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system was significantly higher for females than for males in all regions, in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 86

Figure 86 shows the average number of hospital separations, per 1000 population, for diseases of the musculoskeletal system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in males was significantly higher than the provincial average in Regions III and V.

Regions: Females

- The average number of separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in females was significantly higher than the provincial average in Region III.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system in both males and females in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system was significantly greater for females than for males in Regions III and IV. However, in all other regions there was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system.

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the musculoskeletal system was significantly greater in females versus males in the North, South and in the Province overall.

Figure 85 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population for Diseases of the Musculoskeletal System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



Figure 86 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population for Diseases of the Musculoskeletal System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 87

Figure 87 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system declined by approximately 38% in males and 24% in females.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system declined by approximately 15% in males and 13% females.

Figure 87 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of the Genitourinary System by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 88

Figure 88 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population for diseases of the genitourinary system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system was significantly higher than the provincial average for males in Regions II, V and VI.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system was significantly higher than the provincial average for females in Regions IV, V, VI and VII.

North and South

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for the diseases of the genitourinary system was significantly higher in the North than the South of the Province for both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher for females than males in all regions, in the North, South and in the Province overall.

NOTES TO FIGURE 89

Figure 89 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system for males was significantly higher than the provincial average in Regions I, II and V.

Regions: Females

- The average number of separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system for females was significantly higher than the provincial average in Regions II, V and VII .

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system for females was significantly higher in the North than in the South of the Province.

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system in males in the North versus South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system was significantly higher for females than for males in all regions.

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of the genitourinary system was significantly higher for females versus males in the North, South and in the Province overall.

Figure 88 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population for Diseases of the Genitourinary System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



Figure 89 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population for Diseases of the Genitourinary System by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



ENDOCRINE, NUTRITIONAL & METABOLIC DISEASES & IMMUNITY DISORDERS

NOTES TO FIGURE 90

Figure 90 shows the number of hospital care days and hospital separations, per 1,000 population, for endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders decreased by approximately 28% in males, and by 23% in females.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders increased by 6% in males, and increased by approximately 12% in females.

Figure 90 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Immunity Disorders by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 91

Figure 91 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for males in Regions I, II and V were significantly higher than the provincial average for males.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for females in Regions IV, V, VI and VII were significantly higher than the provincial average for females.

North and South

- The average numbers of hospital care days, per 1,000 population, for the endocrine diseases were significantly higher for females in the North of the Province than the South.

- There was no significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for the endocrine diseases in males in the North versus South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for the endocrine diseases was significantly higher for females than for males in Regions III, IV, V, VI and VII, in the North of the Province and the Province overall.

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher for males than for females in Regions I, II and South of the Province.

NOTES TO FIGURE 92

Figure 92 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for endocrine, nutritional, metabolic and immunity disorders in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for males in Regions V and VII were significantly higher than the provincial average.

Regions: Females

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for females in Regions V, VI and VII were significantly higher than the provincial average.

North and South

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for the endocrine diseases was significantly higher in the North than in the South of the Province for females.

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for endocrine diseases in males in the North versus the South of the Province.

Gender Differences

- The average number of hospital separations, per 1,000 population, for endocrine diseases was significantly higher for females than for males in all regions, except Region II, in the North, South and in the Province overall.

Figure 91 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population for Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Immunity Disorders by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



Figure 92 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population for Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Immunity Disorders by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



DISEASES OF SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE

NOTES TO FIGURE 93

Figure 93 shows the number of hospital care days and number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in males and females in New Brunswick during the period 1993/94 -1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue increased by approximately 4% in males. The hospital care days between 1993/94 and 1997/98, per 1,000 population, in females declined by approximately 32%.

- Between 1993/94 and 1997/98, the number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue showed some fluctuation, but remained fairly consistent for both males and females.

Figure 93 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of Skin and Subcutaneous Tissue by Gender, New Brunswick: 1993/94 – 1997/98**



NOTES TO FIGURE 94

Figure 94 shows the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of the skin and subcutaneous tissue in males was significantly higher than the provincial average in Regions III and V.

Regions: Females

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in females in Regions III and V were significantly higher than the provincial average.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital care days, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in the North versus South of the Province in both males and females.

Gender Differences

- The average number of hospital care days, per 1,000 population, was significantly higher for males than for females in Regions I, IV, V and VII, the North of the Province and the Province overall.

- There was no significant difference between males and females in Regions II, III and VI and the South of the Province.

NOTES TO FIGURE 95

Figure 95 shows the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in males and females in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the five-year period 1993/94 - 1997/98.

Regions: Males

- The average number of hospital separations for diseases of skin and subcutaneous tissue, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average in Regions III and V.

Regions: Females

- The average number of hospital separations for diseases of skin and subcutaneous tissue, per 1,000 population, was significantly higher than the provincial average in Regions III and V.

North and South

- There was no significant difference in the average number of hospital separations, per 1,000 population, for diseases of skin and subcutaneous tissue in the North versus South of the Province in both males and females.

Gender Differences

- There was no significant difference in average number of hospital separations for diseases of the skin and subcutaneous tissue for males versus females in any of the regions, in the North, South or in the Province overall.

Figure 94 **Average Number of Hospital Care Days, per 1,000 Population, for Diseases of Skin and Subcutaneous Tissue by Gender in the seven Health Regions North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



Figure 95 **Average Number of Hospital Separations, per 1,000 Population, for Diseases of Skin and Subcutaneous Tissue by Gender in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1993/94 - 1997/98**



OTHER DATA

CONGENITAL ANOMALIES

NOTES TO FIGURE 96

Figure 96 shows the annual number of hospital care days and separations, per 100,000 population, by gender, for all congenital anomalies in New Brunswick and Canada during the period 1992/93 - 1997/98.

- Between 1993/94 and 1997/98, the annual number of hospital care days, per 100,000 population, for congenital anomalies increased by approximately 86% in New Brunswick males in 1995/96, and then remained consistent for 1996/97 and 1997/98, and decreased by approximately 45% in New Brunswick females. During the same time period, the annual number of hospital care days for congenital anomalies in Canada declined by approximately 40% in males, and 45% in females.

- Between 1992/93 and 1997/98, the annual number of hospital separations, per 100,000 population, for congenital anomalies declined by approximately 11% in New Brunswick males and 16% in New Brunswick females. During the same time period, the annual number of hospital separations for congenital anomalies in Canada declined by approximately 37% in males, and 32% in females.

- In both males and females, the annual number of hospital care days, per 100,000 population, for congenital anomalies was consistently lower in New Brunswick than in Canada, except in 1995/96 when hospital care days, per 100,000 population, for males in New Brunswick was 5 – 6 times higher than the national rate.

- In both males and females, the annual number of hospital separations, per 100,000 population, for congenital anomalies was higher in New Brunswick than in Canada.

- In both Canada and New Brunswick, the annual number of hospital care days and hospital separations, per 100,000 population, for congenital anomalies was consistently higher for males than females.

Figure 96 **Hospital Care Days and Hospital Separations, per 100,000 Population for Congenital Anomalies, by Gender, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98**





NOTES TO TABLE 31

Table 31 presents hospital utilization data for congenital anomalies in New Brunswick and Canada between 1992/93 - 1997/98.

NOTES TO TABLE 32

Table 32 presents the number of hospital separations and separation rates, per 100,000 population, for specific diagnoses of congenital anomalies during the period 1992/93 - 1997/98.

Table 31 **Hospital Care Days, per 100,000 Population, and Separations, per 100,000 Population, for all Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98**

		1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97		1997/98	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Number of Separations	M	554	14,236	470	13,241	522	12,442	514	11,258	514	10,515	485	9,922
	F	408	10,526	472	10,025	439	9,541	428	8,870	385	8,038	370	7,849
Separations per 100,000 Population	M	150	105	126	92	140	87	138	78	128	73	130	66
	F	108	75	125	69	116	65	116	60	102	53	98	52
Number of Hospital Care Days	M	2,223	136,015	1,324	104,986	2,052	78,926	10,020	73,097	1,216	67,008	1,567	65,850
	F	1,729	115,713	1,894	90,455	1,713	68,842	1,374	65,739	1,429	55,593	1,045	51,826
Hospital Care Days per 100,000 Population	M	599	1,005	356	732	551	548	2686	501	325	455	419	443
	F	458	831	501	619	453	468	363	442	377	391	275	340

Source: Statistics Canada:

- *Health Reports, Supplement No. 1, 1994 Vol. 3, No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1993 - 94*
- *Health Reports, Supplement No. 1, 1995 Vol. 4, No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1993 - 94*
- *Catalogue 82-216XPB, Hospital Morbidity, 1994 - 1995*
- *Catalogue 82-216XPB, Annual, Hospital Morbidity, 1995 – 1996*

Table 32 Number of Separations and Separations, per 100,000 Population, for Diagnoses of Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98

		1992 - 93				1993 – 94				1994 – 95			
		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Spina Bifida	M	0	227	0	2	5	166	1	1	8	170	2	2
	F	9	258	2	2	14	232	4	2	11	251	3	1
All other congenital anomalies of the nervous system	M	10	411	3	3	17	446	5	3	6	407	2	3
	F	5	433	1	3	15	395	4	3	4	385	1	3
Congenital Anomalies of circulatory system	M	34	2869	9	21	21	2800	6	20	31	2663	8	18
	F	31	2537	8	18	39	2639	10	18	38	2463	10	17
Cleft palate & cleft lip	M	17	853	5	6	17	827	5	6	26	818	7	6
	F	22	578	6	4	23	592	6	4	16	559	4	4
Other congenital anomalies of digestive system	M	83	1739	22	13	52	1623	14	11	72	1548	19	11
	F	40	818	11	6	55	810	15	6	52	758	14	5
Congenital anomalies of genitourinary system	M	199	3371	54	25	166	3026	45	21	165	2794	44	19
	F	71	1153	19	8	69	1061	18	7	76	977	20	7
Congenital anomalies of musculoskeletal system	M	83	2341	22	17	62	2202	17	15	68	2044	18	14
	F	81	2410	21	17	103	2094	27	14	76	2036	20	14
Other congenital anomalies	M	128	2425	34	18	130	2151	35	15	146	1998	39	14
	F	149	2339	39	17	154	2202	41	15	166	2112	44	14
TOTAL	M	554	14236	149	105	470	13241	126	92	522	12442	140	87
	F	408	10526	108	75	472	10025	125	69	439	9541	116	65

Table 31 **Hospital Care Days, per 100,000 Population, and Separations, per 100,000 Population, for all Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98**

		1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97		1997/98	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Number of Separations	M	554	14,236	470	13,241	522	12,442	514	11,258	514	10,515	485	9,922
	F	408	10,526	472	10,025	439	9,541	428	8,870	385	8,038	370	7,849
Separations per 100,000 Population	M	150	105	126	92	140	87	138	78	128	73	130	66
	F	108	75	125	69	116	65	116	60	102	53	98	52
Number of Hospital Care Days	M	2,223	136,015	1,324	104,986	2,052	78,926	10,020	73,097	1,216	67,008	1,567	65,850
	F	1,729	115,713	1,894	90,455	1,713	68,842	1,374	65,739	1,429	55,593	1,045	51,826
Hospital Care Days per 100,000 Population	M	599	1,005	356	732	551	548	2686	501	325	455	419	443
	F	458	831	501	619	453	468	363	442	377	391	275	340

Source: Statistics Canada:

- *Health Reports, Supplement No. 1, 1994 Vol. 3, No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1993 - 94*
- *Health Reports, Supplement No. 1, 1995 Vol. 4, No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1993 - 94*
- *Catalogue 82-216XPB, Hospital Morbidity, 1994 - 1995*
- *Catalogue 82-216XPB, Annual, Hospital Morbidity, 1995 – 1996*

Table 32 **Number of Separations and Separations, per 100,000 Population, for Diagnoses of Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98**

		1992 - 93				1993 – 94				1994 – 95			
		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Spina Bifida	M	0	227	0	2	5	166	1	1	8	170	2	2
	F	9	258	2	2	14	232	4	2	11	251	3	1
All other congenital anomalies of the nervous system	M	10	411	3	3	17	446	5	3	6	407	2	3
	F	5	433	1	3	15	395	4	3	4	385	1	3
Congenital Anomalies of circulatory system	M	34	2869	9	21	21	2800	6	20	31	2663	8	18
	F	31	2537	8	18	39	2639	10	18	38	2463	10	17
Cleft palate & cleft lip	M	17	853	5	6	17	827	5	6	26	818	7	6
	F	22	578	6	4	23	592	6	4	16	559	4	4
Other congenital anomalies of digestive system	M	83	1739	22	13	52	1623	14	11	72	1548	19	11
	F	40	818	11	6	55	810	15	6	52	758	14	5
Congenital anomalies of genitourinary system	M	199	3371	54	25	166	3026	45	21	165	2794	44	19
	F	71	1153	19	8	69	1061	18	7	76	977	20	7
Congenital anomalies of musculoskeletal system	M	83	2341	22	17	62	2202	17	15	68	2044	18	14
	F	81	2410	21	17	103	2094	27	14	76	2036	20	14
Other congenital anomalies	M	128	2425	34	18	130	2151	35	15	146	1998	39	14
	F	149	2339	39	17	154	2202	41	15	166	2112	44	14
TOTAL	M	554	14236	149	105	470	13241	126	92	522	12442	140	87
	F	408	10526	108	75	472	10025	125	69	439	9541	116	65

Table 32 (Continued) **Number of Separations and Separations, per 100,000 Population, for Diagnoses of Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 - 1997/98**

		1995 - 96				1996 - 97				1997 – 98			
		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Spina Bifida	M	0	123	0	1	3	110	1	1	1	83	0	1
	F	1	204	0	1	8	150	2	1	2	132	1	1
All other congenital anomalies of the nervous system	M	15	385	4	3	6	379	2	3	5	318	1	2
	F	9	401	2	3	7	307	2	2	4	307	1	2
Congenital Anomalies of circulatory system	M	27	2635	7	18	28	2446	7	17	32	2403	9	16
	F	33	2451	9	16	26	2255	7	15	31	2298	8	15
Cleft palate & cleft lip	M	16	819	4	6	19	761	5	5	22	750	6	5
	F	22	544	6	4	10	521	3	3	14	523	4	3
Other congenital anomalies of digestive system	M	64	1389	17	10	99	1412	26	10	79	1396	21	9
	F	45	682	12	5	43	687	11	5	34	690	9	5
Congenital anomalies of genitourinary system	M	192	2353	51	16	142	1995	38	14	147	1824	39	12
	F	53	849	14	6	66	734	17	5	64	705	17	5
Congenital anomalies of musculoskeletal system	M	51	1914	14	13	57	1840	15	12	54	1771	14	12
	F	69	1894	18	13	62	1807	16	12	68	1764	18	12
Other congenital anomalies	M	149	1640	40	11	126	1572	34	10	145	1377	39	9
	F	206	1841	54	12	163	1577	43	10	154	1430	41	9
TOTAL	M	514	11258	138	78	480	10515	128	73	485	9922	130	66
	F	438	8866	116	60	385	8038	102	53	371	7849	98	52

Source: Statistics Canada: Health Reports, Supplement No. 1, 1993 Vol. 3 No. 1 Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity 1993 - 94
-Health Reports, Supplement No. 1, 1992 Vol. 4 No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity 1993 - 97
-Catalogue 82-216XPB, Hospital Morbidity, 1992 - 93,Catalogue 82-216XPB, Annual Hospital Morbidity, 1993 – 9

Table 32 (Continued) **Number of Separations and Separations, per 100,000 Population, for Diagnoses of Congenital Anomalies by Sex, New Brunswick and Canada: 1992/93 - 1997/98**

		1995 - 96				1996 - 97				1997 – 98			
		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population		Number of Separations		Separations per 100,000 population	
	Sex	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada	N.B.	Canada
Spina Bifida	M	0	123	0	1	3	110	1	1	1	83	0	1
	F	1	204	0	1	8	150	2	1	2	132	1	1
All other congenital anomalies of the nervous system	M	15	385	4	3	6	379	2	3	5	318	1	2
	F	9	401	2	3	7	307	2	2	4	307	1	2
Congenital Anomalies of circulatory system	M	27	2635	7	18	28	2446	7	17	32	2403	9	16
	F	33	2451	9	16	26	2255	7	15	31	2298	8	15
Cleft palate & cleft lip	M	16	819	4	6	19	761	5	5	22	750	6	5
	F	22	544	6	4	10	521	3	3	14	523	4	3
Other congenital anomalies of digestive system	M	64	1389	17	10	99	1412	26	10	79	1396	21	9
	F	45	682	12	5	43	687	11	5	34	690	9	5
Congenital anomalies of genitourinary system	M	192	2353	51	16	142	1995	38	14	147	1824	39	12
	F	53	849	14	6	66	734	17	5	64	705	17	5
Congenital anomalies of musculoskeletal system	M	51	1914	14	13	57	1840	15	12	54	1771	14	12
	F	69	1894	18	13	62	1807	16	12	68	1764	18	12
Other congenital anomalies	M	149	1640	40	11	126	1572	34	10	145	1377	39	9
	F	206	1841	54	12	163	1577	43	10	154	1430	41	9
TOTAL	M	514	11258	138	78	480	10515	128	73	485	9922	130	66
	F	438	8866	116	60	385	8038	102	53	371	7849	98	52

Source: Statistics Canada: Health Reports, Supplement No. 1, 1993 Vol. 3 No. 1 Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity 1993 - 94
-Health Reports, Supplement No. 1, 1992 Vol. 4 No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity 1993 - 97
-Catalogue 82-216XPB, Hospital Morbidity, 1992 - 93,Catalogue 82-216XPB, Annual Hospital Morbidity, 1993 – 9

NOTES TO FIGURE 97

Figure 97 shows the average number of hospital separations, per 100,000 population, by gender, for specific diagnosis of congenital anomalies in New Brunswick and Canada during the period 1992/93 - 1997/98.

- In males, anomalies of the genitourinary system were the leading type of congenital anomalies in New Brunswick and anomalies of the circulatory system in Canada.
- In females, anomalies of the circulatory system were the leading type of congenital anomalies in both New Brunswick and Canada.
- The rate of congenital anomalies of the genitourinary system was substantially higher in New Brunswick males than in Canadian males.

Figure 97 Average Number of Hospital Separations for Congenital Anomalies, per 100,000 population, by Gender and Diagnosis, New Brunswick and Canada: 1992/93 – 1997/98



ICD-9 codes

752	Congenital anomalies of genitourinary system	749	Cleft palate and cleft lip
747	Congenital anomalies of circulatory system	742	All other congenital anomalies of the nervous system
751	Other congenital anomalies of digestive system	741	Spina Bifida
756	Congenital anomalies of musculoskeletal system	759	Other Congenital Anomalies

NOTES TO TABLE 33

Table 33 presents the referred health problems identified at Pediatric Immunization Clinics (Well-Child Clinics) and 3.5-Year Old Clinics in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick during the four-year period 1995/96 to 1998/99.

Based on averages for the four-year period, the following was noted:

- For the Province as a whole, the most common types of referred health problems were skin problems, followed by growth and development and general health problems.

- The only significant differences in the distribution of referred health problems between the seven Health Regions and Province overall, were a lower than average percentage of mouth problems in Region I and a higher than average percentage of mouth problems in Region III.

- The only significant difference between the North and South of the Province was a higher percentage of growth and development problems in the North than in the South of the Province.

Table 33 Number of Referred Health Problems Identified at Well-Child and 3.5-Year Old Clinics in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1995/96 to 1998/99

1995 - 1996

Region	Mouth	Psychosocial	Ears	Growth & Development	Skin	General
I	92	25	47	6	15	36
II	189	20	378	7	5	51
III	94	22	30	17	6	67
IV	30	33	43	9	6	65
V	36	18	20	13	8	47
VI	78	97	15	36	4	50
VII	49	27	11	16	5	58
North	193	175	89	74	23	220
South	375	67	455	30	26	154
Province	568	242	544	104	49	374

1996 - 1997

Region	Mouth	Psychosocial	Ears	Growth & Development	Skin	General
I	116	18	41	15	7	48
II	210	15	374	4	1	39
III	76	26	32	6	8	68
IV	23	35	35	8	7	63
V	36	34	21	12	6	28
VI	67	109	26	14	3	81
VII	37	46	21	70	6	50
North	163	224	103	104	22	222
South	402	59	447	25	16	155
Province	565	283	550	129	28	377

1997 - 1998

Region	Mouth	Psychosocial	Ears	Growth & Development	Skin	General
I	133	14	43	9	11	35
II	174	23	369	8	2	33
III	45	31	16	20	14	94
IV	29	30	39	5	4	56
V	27	22	25	13	11	32
VI	75	163	36	15	3	98
VII	17	39	14	31	4	42
North	148	254	114	64	22	228
South	352	68	428	37	27	162
Province	500	322	542	101	49	390

1998 - 1999

Region	Mouth	Psychosocial	Ears	Growth & Development	Skin	General
I	140	10	59	8	6	31
II	146	20	430	14	4	43
III	39	22	24	24	5	37
IV	27	25	18	0	7	44
V	28	15	23	9	4	37
VI	62	143	17	29	5	67
VII	15	26	12	33	4	45
North	132	209	70	71	20	193
South	325	52	513	46	15	111
Province	457	261	583	117	35	304

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness.

NOTES TO TABLE 34

Table 34 presents information from assessments of newborn infants carried out as part of the Early Childhood Initiatives (ECI) Program, which was initiated in 1994. All newborns in the province were assessed and assigned to one of the four Public Health priority categories. This assessment identified children with congenital or acquired health challenges, developmental problems or family interaction problems. Each component is assigned a score and the total score is assessed as follows:

	Score
High Priority	>9
Moderate Priority	6 – 8
Low Priority	3 – 5
Minimal Priority	0 – 2

Table 34 presents the number of newborns assigned to each of the priority categories in the seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick in 1998 - 1999.

- In the Province as a whole, approximately 53% of newborns were assigned to the minimal priority category; 16% were assigned to the low priority category; 11% were assigned to the moderate priority category and 20% were assigned to the high priority category.

- In comparison to the Province overall:

  - Region II had a higher than average percentage of "minimal priority" assessments;
  - Region III had a higher than average percentage of "low priority' and a lower than average percentage of "high priority" assessments;
  - Region V had a slightly higher than average percentage of "minimal priority" and a lower than average percentage of "low priority" assessments; and,
  - Region VI and VII had a higher than average percentage of "minimal priority, and a lower than average percentage of "high priority assessments".

- In comparison to the South of the Province, the North had a lower percentage of "minimal priority" assessment, and a higher percentage of "low" and "high priority" assessments.

Table 34 **Newborn Clients Assessed for ECI by Risk Category in the Seven Health Regions, North, South and Province of New Brunswick: 1998 - 1999**

Priority

Region	MINIMAL	LOW	MODERATE	HIGH	TOTAL
I	1012	117	206	440	1775
II	1099	294	241	320	1954
III	933	398	175	323	1829
IV	228	95	45	55	423
V	197	65	24	60	346
VI	371	156	70	201	798
VII	250	100	55	154	559
North	1046	426	194	470	2126
South	3044	809	622	1083	5558
Province	4090	1225	816	1553	7684

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

NOTES TO TABLE 35

Table 35 presents the total number of vision, hearing and speech screening test failures at Public Health 3.5-Year Old Health Clinics from 1995/96 to 1998/99.

Table 35 Number of Vision, Hearing and Speech Screening Test Failures at Public Health 3.5-Year Old Health Clinics by Regions, North, South and Province: 1995/96 to 1998/99

1995-1996

Region	VISION	HEARING	SPEECH
I	164	212	323
II	97	153	139
III	124	224	160
IV	25	40	87
V	51	123	92
VI	95	156	226
VII	75	120	77
North	246	439	482
South	385	589	622
Province	631	1028	1104

1996-1997

Region	VISION	HEARING	SPEECH
I	154	237	330
II	70	119	154
III	133	186	172
IV	33	46	80
V	42	100	90
VI	78	134	220
VII	70	81	53
North	223	361	443
South	357	542	656
Province	580	903	1099

1997-1998

Region	VISION	HEARING	SPEECH
I	145	197	348
II	78	103	156
III	117	189	190
IV	30	41	81
V	49	131	83
VI	85	175	227
VII	58	62	46
North	222	489	437
South	340	417	694
Province	559	906	1131

1998-1999

Region	VISION	HEARING	SPEECH
I	147	152	370
II	69	94	144
III	117	191	165
IV	56	85	100
V	48	123	88
VI	89	160	203
VII	64	79	70
North	230	447	461
South	360	439	667
Province	590	884	1140

Source: Reportable Disease Surveillance System, New Brunswick Department of Health and Wellness

NOTES TO TABLE 36

A dental preventive program "Fluoride Mouthrinse Program" has been provided in elementary schools across New Brunswick since 1979. The current program is available to all children in the province from the first to the sixth grades.

Table 36 presents the participation rate of elementary school children in the Fluoride Mouthrinse program during the period 1994/95 to 1998/99. For the province overall, there was a decrease in the participation rate over the five-year period from 89.4% in 1994/95 to 79.5% in 1998/99. Participation is substantially lower in the sixth grade. Since the introduction of the middle school model (grade 6 to grade 8) in 1994 in anglophone districts, some of the grade six classes have stopped participating altogether.

Table 36 Participation Rate of School Children in Fluoride Mouthrinse Program, Grades 1-6, New Brunswick: 1994/95 - 1998/99

Grade	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
1	92.7	93.9	93	92.2	90.1
2	93.6	93.1	93.2	90	90
3	92	91.5	91	90	85
4	90.8	89.2	90	80	85
5	89	87.4	87.2	84	78
6	78.3	73.5	73	58	49
Provincial Rate	**89.4**	**88.1**	**87.9**	**82.4**	**79.5**

Source: Public Health Management Service, Department of Health and Wellness

NOTES TO FIGURE 98

Figure 98 shows the birth rate, per 1,000 females, for four age groups during the five-year period 1994 – 1998.

- Between 1994 and 1998, the birth rate in the 20 – 24 year age group declined by approximately 31%.

- In the under 15 age group, birthrate remained stable between 1994 and 1998. In the 15 - 17 and 18 - 19 year age groups, the birth rate declined by approximately 30% and 15%, with an increase in 1998 for the 18 - 19 year age group.

Figure 98 Birth Rate per 1,000 Females by Age Group, New Brunswick: 1994 - 1998



NOTES TO FIGURE 99

Figure 99 shows the birth rate, per 1,000 females, for 20 – 24 year old women, according to marital status, for the period 1994 – 1998.

- The birth rate, per 1,000 population, for unmarried 20 – 24 year old females, increased by approximately 8% between 1994 and 1998.

- The birth rate, per 1,000 population, for 20 – 24 year old females who were married, widowed or divorced declined by approximately 45% between 1994 and 1998.

Figure 99 Birth Rate, per 1,000 Females from 20 – 24 Years old, by Marital Status, New Brunswick: 1994 – 1998



NOTES TO TABLE 37

Table 37 presents the number of births and birth rate, per 1,000 females, for selected age groups, as well as the number of births and birth rate, per 1,000, for 20 – 24 year old females, according to marital status, for the period 1994-1998.

Table 37 Number of Births and Birth Rate, per 1,000 Females, by Age Group and Marital Status for 20 – 24 year Age group, New Brunswick: 1994 – 1998

	1994		1995		1996		1997		1998	
	Number of births	Birth rate/ 1,000 females	Number of births	Birth rate/ 1,000 females	Number of births	Birth rate/ 1,000 females	Number of births	Birth rate/ 1,000 females	Number of births	Birth rate/ 1,000 females
Age Group < 15 years	4	0.08	3	0.06	2	0.04	8	0.16	8	0.16
15-17 years	288	8.81	294	9.15	216	6.75	216	6.82	194	6.21
18-19 years	596	25.99	574	24.29	481	21.99	428	20.17	464	22.11
20-24 years (all)	1049	18.50	967	17.24	848	15.37	805	14.95	680	12.79
20-24 years (unmarried)	1194	21.08	1210	21.58	1206	21.86	1201	22.30	1183	22.25
All ages	8907	11.86	8512	11.32	8134	10.80	7867	10.43	7830	10.40

Source: ***New Brunswick Department of Health and Wellness (NB Vital Statistics Database 1994 - 1998). Population is based on 1996 adjusted census.***

LIFESTYLE ISSUES

DRUG USE

NOTES TO TABLE 38

Table 38 compares results for the 1996 and 1998 Provincial student Drug Use Surveys. In both surveys, the three most commonly used drugs within the twelve-month period, prior to the survey, were alcohol, tobacco and cannabis.

- The two surveys showed very little change in reported drug use, with the exception of the reported use of LSD, which decreased from 1996 to 1998 by 4%.

Table 38 Reported Use of Substances/Drugs among Students Grades 7, 9, 10 and 12, New Brunswick: 1996 and 1998

Drug	1996 Reported Use (%) (n=3315)	1998 Reported Use (%) (n=3298)
Alcohol	52.3	55.6
Tobacco	32.7	32.2
Cannabis	28.9	30.6
Barbiturates (prescribed)	1.2	1.0
Barbiturates (not prescribed)	2.4	1.4
Heroin	2.4	1.7
Stimulants (prescribed)	3.7	4.7
Stimulants (non prescribed)	9.3	8.4
Tranquilizers (prescribed)	5.1	5.0
Tranquilizers (non prescribed)	4.5	3.8
LSD*	15.1	10.9
Cocaine	4.7	4.0
PCP	3.9	3.5
Steroids	2.8	2.2
Psilocybin/Mescaline	8.4	9.3
Inhalants	5.8	5.5

*$p<0.05$

Source: Technical Report: 1996 – 98 Provincial Epidemiology Services, New Brunswick, Department of Health and Wellness

Appendix A

Map of Health Regions in New Brunswick

Health Regions



GLOSSARY

Age-Specific Fertility Rate:	The number of live births to women in an age group in one year, per 1,000 women, in that age group.
Age-Specific Mortality Rate:	The number of deaths in the defined population of a particular age group in one year in relation to the average (or mid-year) population of the specified age group in that year (per 10,000 population).
Age-Standardization:	Represents what the crude rate would be if the population for which the rate is adjusted and the standard population had the same distribution with respect to age.
Crude Mortality Rate:	The proportion of a population who die (per 1,000 population).
Hospital Separation:	The discharge or death of an in-patient.
Infant Mortality Rate:	Number of deaths in a year of children less than one year of age in relation to the number of live births in the same year (per 1,000 live-births).
Natural Rate of Increase:	A measure of population growth (in the absence of migration) comprising addition of newborns to the population and subtraction of deaths (per 1,000 population).
Potential Year of Life Lost:	The figure for potential years of life lost due to a particular cause is the sum, over all persons dying from that cause, of the years that these persons would have lived had they experienced normal life expectation.
Proportional Mortality Ratio:	The number of deaths, from a given cause, in a specified time period, per 1,000 total deaths, in the same time period.

REFERENCES

Canada Safety Council (1999). Personal Communications, Ottawa.

Comprehensive Study - 1993 Provincial Student Drug Survey.

New Brunswick Vital Statistics Database, 1994 - 1998.

New Brunswick Hospital Database, 1994 - 1998.

New Brunswick HNIC Immunization Database, 1994 - 1998.

New Brunswick Department of Education, Research and Planning Branch, October 1994. Elementary School Nutrition Program. Fall 1998 Follow-up Report.

Statistics Canada, Catalogue No. 84-537, Life Tables, Canada and Provinces, 1994 - 96.

Statistics Canada, Health Reports, Supplement No. 1, 1994. Vol. 3, No. 1, Catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1994 - 98.

Statistics Canada, Health Reports, Supplement No. 1, 1995. Vol. 4, No. 1, catalogue 82-003S1, Hospital Morbidity, 1994 - 98.

Statistics Canada, Hospital Morbidity, Catalogue 82-216, 1994 - 95.

Statistics Canada, Annual Hospital Morbidity Catalogue 82-216, 1994 - 95.

Statistics Canada, Health Reports, Supplement No. 21, 1996. Vol. 3, No. 4 - Hospital Indicators 1994 - 98, Vol. 4. Total Expenses.

Statistics Canada, Hospital Indicators 1994 - 95, Part 4 Total Expenses.

Statistics Canada, Hospital Indicators 1995 - 96, Part 4 Total Expenses.

Statistics Canada, Hospital Indicators 1996 - 97, Part 4 Total Expenses.

L'état de santé des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises

Quatrième rapport 1994-1998



Nouveau Brunswick

Santé et Mieux-être

L'état de santé des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises

Quatrième rapport

1994 - 1998

Nouveau-Brunswick
Ministère de la Santé et du Mieux-être

Table des matières

LISTE DES TABLEAUX.....iv

LISTE DES FIGURES.....viii

REMERCIEMENTS.....xviii

SOMMAIRE.....xix

CHAPITRE 1 INTRODUCTION.....1

CHAPITRE 2 STRUCTURE DE LA POPULATION 5

Nouveau-Brunswick
Régions sanitaires
Nord et Sud

CHAPITRE 3 STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES.....13

Faits saillants
Taux d'accroissement naturel
Mortalité infantile
Taux de fécondité par âge
Naissances vivantes de moins de 2 500 grammes
Espérance de vie
Années potentielles de vie perdues

CHAPITRE 4 MORTALITÉ AU SEIN DE LA POPULATION.....31

Faits saillants
Données sur la mortalité et principales causes de décès
Principales causes de décès selon l'âge et le sexe
Taux proportionnel de mortalité et taux brut de mortalité
Maladies de l'appareil circulatoire
    Cardiopathies ischémiques
    Maladies vasculaires cérébrales
Tumeurs malignes
    Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
    Tumeur maligne du sein chez la femme
Maladies de l'appareil respiratoire
    Maladies pulmonaires obstructives chroniques

Causes extérieures de lésions traumatiques et empoisonnements
Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
Suicide

CHAPITRE 5 MORBIDITÉ AU SEIN DE LA POPULATION.....110

Faits saillants
Maladies transmissibles
Maladies pouvant être prévenues par un vaccin
Maladies transmises sexuellement (MTS)
Affections entériques
Autres maladies transmissibles
Utilisation des ressources hospitalières
Principales catégories de maladies
Troubles mentaux
Maladies de l'appareil circulatoire
Maladies vasculaires cérébrales
Cardiopathies ischémiques
Maladies de l'appareil respiratoire
Maladies pulmonaires obstructives chroniques
Maladies de l'appareil digestif
Tumeurs malignes
Cancer du poumon
Cancer de la prostate
Cancer du sein chez les femmes
Cancer colorectal
Complication de la grossesse, de l'accouchement et des suites du couches
Maladies du système nerveux et des organes des sens
Lésions traumatiques et empoisonnements
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles
Maladies des organes génito-urinaires
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Autres données
Anomalies congénitales
Santé de l'enfant
Hygiène Dentaire
Santé de la reproduction
Problèmes liés au mode de vie
Usage de drogues

ANNEXE A – Carte des régions sanitaires du Nouveau-Brunswick.....273

GLOSSAIRE.....274

BIBLIOGRAPHIE.....275

Liste des tableaux

N° Page

1. TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL, par 1 000 habitants, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....16

2. Nombre de NAISSANCES VIVANTES, MORTALITÉ INFANTILE et TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE, par 1 000 naissances vivantes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau - Brunswick : 1994 -1998.....19

3. TAUX DE FÉCONDITÉ par âge, par 1 000 femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....22

4. Nombre et pourcentage de NAISSANCES VIVANTES de moins de 2 500 grammes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....25

5. ESPÉRANCE DE VIE à la naissance (en années) selon le sexe, Canada et provinces : 1990-1992 et 1996.....27

6. ESPÉRANCE DE VIE (en années) selon l'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : 1996.....27

7.a-b NOMBRE D'ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES, par 100 000 habitants, selon les principales causes de décès, HOMMES et FEMMES de moins de 75 ans, Canada, provinces et territoires : 1994-1997.....29-30

8. NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS attribuables aux dix-sept principales catégories de maladies (codes de la CIM-9) dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....36

9. NOMBRE DE DÉCÈS selon les PRINCIPALES CAUSES, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....45-48

10. TAUX BRUT DE MORTALITÉ, par 10 000 hommes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les HOMMES dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....53

11. TAUX BRUT DE MORTALITÉ, par 10 000 femmes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les FEMMES dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....54

12. Taux de mortalité de CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....58

13. Taux de mortalité de MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998..... 64

14. Taux de mortalité de TUMEUR MALIGNE de la TRACHÉE, des BRONCHES et du POUMON, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....70

15. Taux de mortalité de TUMEUR MALIGNE DU SEIN CHEZ LA FEMME, par 10 000 femmes, selon le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....76

16.a-e Taux de mortalité, par âge, par 10 000 habitants, pour les MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES, selon le sexe, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....82-86

17.a-e Taux de mortalité, par âge, par 10 000 habitants, pour les ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....96-100

18.a-e Taux de mortalité, par âge, par 10 000 habitants, pour les DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....105-109

19. Nombre de cas déclarés de ROUGEOLE, d'OREILLONS, de RUBÉOLE et de COQUELUCHE, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....115

20. Nombre de cas déclarés de ROUGEOLE, d'OREILLONS, de RUBÉOLE et de COQUELUCHE selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 117

21. Nombre d'ÉLÈVES de PREMIÈRE ANNÉE IMMUNISÉS et TAUX D'IMMUNISATION dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....118

22.a-b Nombre total de cas déclarés de GONORRHÉE, d'INFECTION À CHLAMYDIA et de SYPHILIS, et nombre de cas déclarés, par 1000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....120

22.c Nombre de cas déclarés de GONORRHÉE, d'INFECTION À CHLAMYDIA et de SYPHILIS, selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 121

23.a-b Nombre de nouveaux cas de VIH et de SIDA et état des personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic de SIDA, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 124

24. Nombre de cas d'AMIBIASE, de CAMPYLOBACTÉRIOSE, de GIARDIASE, d'INFECTION À *E. COLI* (0157:H7), de SALMONELLOSE et de SHIGELLOSE déclarés, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 128

25. Nombre de nouveaux cas de TUBERCULOSE déclarés selon le type de cas et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....131

26. Nombre de nouveaux cas de TUBERCULOSE déclarés selon le type de cas et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....131

27. Certaines utilisations des RESSOURCES HOSPITALIÈRES et certaines STATISTIQUES FINANCIÈRES, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998.....138

28. Utilisation des ressources hospitalières pour les PRINCIPALES CATÉGORIES DE MALADIES selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....142-146

29.a-e Utilisation des ressources hospitalières pour CERTAINS DIAGNOSTICS : nombre de JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....147-166

30.a-e Utilisation des ressources hospitalières pour CERTAINS DIAGNOSTICS nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998 167-186

31. Nombre de JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 100 000 habitants, pour toutes les ANOMALIES CONGÉNITALES selon le sexe Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998.....259

32. NOMBRE TOTAL DE CONGÉS et nombre de congés, par 100 000 habitants, pour certains diagnostics d'ANOMALIES CONGÉNITALES selon le sexe Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998 260-261

33. Nombre de CAS AIGUILLÉS pour des PROBLÈMES de SANTÉ repérés lors des cliniques de puériculture et des cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1995-1996 à 1998-1999.....264

34. Nombre de CLIENTS NOUVEAU-NÉS évalués pour les IPE selon la catégorie de risque dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1998-1999.....266

35. Nombre total d'échecs aux tests de dépistage de la VUE, de l'OUÏE et de l'ÉLOCUTION dans les cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1995-1996 à 1998-1999.....267

36. Taux de, participation des élèves au PROGRAMME DE RINÇAGE BUCCAL AU FLUORURE, de la 1re à la 6e année, Nouveau-Brunswick : de 1994-1995 à 1998-1999.....268

37. Nombre de NAISSANCES et TAUX DE NATALITÉ, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, et selon l'état matrimonial des femmes de 20 à 24 ans, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....271

38. Usage déclaré de SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ou de DROGUES CHEZ LES ÉLÈVES de la 7e, de la 9e, de la 10e et de la 12e année, Nouveau-Brunswick : 1996 et 1998.....272

Liste des figures

N° Page

1. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1996 8

2. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 1 : 1996 8

3. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 2 : 1996 9

4. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 3 : 1996 9

5. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 4 : 1996 10

6. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 5 : 1996 10

7. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 6 : 1996 11

8. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 7 : 1996 11

9. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Régions sanitaires du Nord : 1996 12

10. RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE selon l'âge et le sexe, Régions sanitaires du Sud : 1996 12

11. TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE, par 1 000 naissances vivantes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 17

12. TAUX DE FÉCONDITÉ, par âge, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 20

13. POURCENTAGE DE NAISSANCES VIVANTES de moins de 2 500 grammes, selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 23

14. TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 habitants, quelle que soit la cause du décès selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1991-1998.....34

15. Pourcentage de DÉCÈS selon les PRINCIPALES CAUSES et le SEXE, moyenne de cinq ans, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....37

16. Pourcentage de DÉCÈS selon les PRINCIPALES CAUSES, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....38

17. Pourcentage de DÉCÈS selon les PRINCIPALES CAUSES et le SEXE, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....39

18. NOMBRE MOYEN de DÉCÈS selon les PRINCIPALES CAUSES, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....41-44

19. TAUX PROPORTIONNEL de MORTALITÉ (TPM) MOYEN, selon les principales causes de décès, le sexe et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....51-52

20. POURCENTAGE MOYEN de DÉCÈS attribuables aux MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE selon les principales catégories de diagnostics chez les hommes et les femmes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....55

21. TAUX COMPARATIFS de MORTALITÉ par âge pour les CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....56

22. MOYENNE DES TAUX DE MORTALITÉ par âge par 10 000 habitants, pour les CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....61

23. TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ par âge pour les MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES, par 10 000 habitants selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....62

24. MOYENNE DES TAUX DE MORTALITÉ par âge , par 10 000 habitants, pour les MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....66

25. POURCENTAGE MOYEN de DÉCÈS attribuables aux TUMEURS MALIGNES selon les principaux sièges de tumeurs et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....67

26. TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ par âge pour la TUMEUR MALIGNE de la TRACHÉE, des BRONCHES et du POUMON selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....68

27. MOYENNE DES TAUX DE MORTALITÉ par âge , par 10 000 habitants, pour la TUMEUR MALIGNE de la TRACHÉE, des BRONCHES et du POUMON selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 73

28. TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ par âge pour la TUMEUR MALIGNE du SEIN CHEZ LA FEMME selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....74

29. MOYENNE DES TAUX DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 femmes, pour la TUMEUR MALIGNE du SEIN CHEZ LA FEMME selon la région et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....78

30. POURCENTAGE MOYEN de DÉCÈS attribuables aux MALADIES de l'APPAREIL RESPIRATOIRE, selon les principales catégories de diagnostics chez les hommes et les femmes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....79

31. TAUX DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 habitants, pour les MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....81

32. MOYENNE DES TAUX DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 habitants, pour les MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....89

33. POURCENTAGE MOYEN de DÉCÈS attribuables à des CAUSES EXTÉRIEURES DE LÉSIONS TRAUMATIQUES et à des EMPOISONNEMENTS selon les principales causes et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 91

34. MOYENNE des TAUX DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 habitants, pour les ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998 93-95

35. MOYENNE des TAUX DE MORTALITÉ par âge, par 10 000 habitants, pour les décès attribuables au SUICIDE selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....103-104

36. Nombre de cas, par 1 000 habitants, des PRINCIPALES MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....122

37. Nombre de nouveaux cas de VIH et de SIDA selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....123

38.a-c Nombre de cas de CAMPYLOBACTÉRIOSE, de SALMONELLOSE, de GIARDIASE, d'INFECTION À *E. COLI* (0157:H7), de SHIGELLOSE et d'AMIBIASE, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick :1994-1998.....125-127

39. Nombre de nouveaux cas de TUBERCULOSE déclarés selon le type de cas, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....129

40. Nombre moyen de nouveaux cas de TUBERCULOSE, par 1 000 habitants, selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....132

41. Nombre de JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 100 000 habitants, et coût annuel des soins hospitaliers par tête, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998.....134

42. COÛT MOYEN par JOUR-PATIENT et DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR dans les HÔPITAUX PUBLICS, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998.....135

43. NOMBRE DE CONGÉS, par 100 000 habitants, et coût moyen, par congé dans les hôpitaux publics, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998.....137

44. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, selon la catégorie de maladies et le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....139

45. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, selon la catégorie de maladies et le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1994-1998.....140

46. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les TROUBLES MENTAUX selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....187

47. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....190

48. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les TROUBLES MENTAUX selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....190

49. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....192

50. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (toutes les causes) selon le sexe, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....195

51. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (toutes les causes) selon le sexe, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....195

52. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....198

53. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS , par 1 000 habitants, pour les MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....198

54. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....201

55. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....201

56. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....203

57. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....206

58. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....206

59. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....209

60. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS , par 1 000 habitants, pour les MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....209

61. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF selon le sexe Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....210

62. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....213

63. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF, selon le sexe, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....213

64. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les TUMEURS MALIGNES, selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....214

65. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour LES TUMEURS MALIGNES (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....217

66. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les TUMEURS MALIGNES (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998 217

67. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour le CANCER DU POUMON selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....220

68. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour le CANCER DU POUMON selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....220

69. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 hommes, pour le CANCER DE LA PROSTATE dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....222

70. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 hommes, pour le CANCER DE LA PROSTATE dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....222

71. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 femmes, pour le CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....224

72. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 femmes, pour le CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....224

73. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour le CANCER COLORECTAL selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....227

74. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour le CANCER COLORECTAL selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....227

75. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 femmes, pour les COMPLICATIONS de la GROSSESSE, de l'ACCOUCHEMENT et des SUITES DE COUCHES, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....228

76. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 femmes, pour les COMPLICATIONS de la GROSSESSE, de l'ACCOUCHEMENT et des SUITES DE COUCHES dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....231

77. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 femmes, pour les COMPLICATIONS de la GROSSESSE, de l'ACCOUCHEMENT et des SUITES DE COUCHES dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....231

78. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX et des ORGANES DES SENS selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998 232

79. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX et des ORGANES DES SENS selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....235

80. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX et des ORGANES DES SENS selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....235

81. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les LÉSIONS TRAUMATIQUES et les EMPOISONNEMENTS selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....236

82. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les LÉSIONS TRAUMATIQUES et les EMPOISONNEMENTS selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....239

83. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les LÉSIONS TRAUMATIQUES et les EMPOISONNEMENTS selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....239

84. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES du SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE et des MUSCLES selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....240

85. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES du SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE et des MUSCLES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....243

86. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES du SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE et des MUSCLES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....243

87. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES des ORGANES GÉNITO-URINAIRES selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....244

88. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES des ORGANES GÉNITO-URINAIRES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....247

89. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES des ORGANES GÉNITO-URINAIRES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....247

90. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES ENDOCRINIENNES, de la NUTRITION et du MÉTABOLISME et pour les TROUBLES IMMUNITAIRES selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....248

91. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES ENDOCRINIENNES, de la NUTRITION et du MÉTABOLISME et pour les TROUBLES IMMUNITAIRES selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....251

92. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES ENDOCRINIENNES, de la NUTRITION et du MÉTABOLISME et pour les TROUBLES IMMUNITAIRES, selon le sexe, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998 251

93. NOMBRE DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES de la PEAU et du TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ selon le sexe Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....252

94. NOMBRE MOYEN DE JOURS DE SOINS HOSPITALIERS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES de la PEAU et du TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....255

95. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS, par 1 000 habitants, pour les MALADIES de la PEAU et du TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998.....255

96. Nombre de JOURS DE SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS, par 100 000 habitants, pour les ANOMALIES CONGÉNITALES selon le sexe Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998.....257

97. NOMBRE MOYEN DE CONGÉS pour les ANOMALIES CONGÉNITALES, selon le sexe et le diagnostic, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998.....262

98. TAUX DE NATALITÉ, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....269

99. TAUX DE NATALITÉ, par 1 000 femmes de 20 à 24 ans, selon l'état matrimonial, Nouveau-Brunswick : 1994-1998.....270

Remerciements

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation du présent rapport :

Statistique Canada

Santé Canada : le Laboratoire de lutte contre la maladie

L'Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick

Ainsi que le personnel ministériel

Charles Gilbert – Agent de programme d'épidémiologie, Service provincial d'épidémiologie

Deeba Zaidi – Agente de la recherche et de la planification, Service provincial d'épidémiologie

Huguette Lavoie – Analyste des programmes et des politiques, Statistiques de l'état civil (base de données de 1994-1998)

Service provincial d'épidémiologie

Services hospitaliers

Service de gestion de la santé publique

Pour d'autres exemplaires, prière de communiquer avec :

Docteur B. Christofer Balram
Épidémiologiste provincial
Directeur du Service provincial d'épidémiologie
Ministère de la Santé et du Mieux-être
C.P. 5100
Fredericton (N.-B.)
Canada
E3B 5G8
Téléphone (506) 453-3092
Télécopieur (506) 453-2780
Courriel : christofer.balram@gnb.ca

Sommaire

INTRODUCTION

Le quatrième rapport sur **L'ÉTAT DE SANTÉ DES NÉO-BRUNSWICKOIS ET DES NEO-BRUNSWICKOISES** trace un profil de l'état de santé de la population; il fournit des renseignements sur certains indicateurs de santé et il constitue une mise à jour des renseignements de base des rapports précédents.

Afin de maintenir l'uniformité et la continuité des données entre le présent rapport et les rapports à venir, la période maximale considérée ici va jusqu'à 1998, vu que les données sur l'utilisation des ressources hospitalières ont habituellement un décalage d'environ deux ans. Les données présentées ci-après concernent divers aspects de l'état de santé dans le cadre des rubriques et des périodes suivantes :

Structure de la population	- Nouveau-Brunswick : données du recensement de 1996
Statistiques démographiques	- Statistiques démographiques choisies, Nouveau-Brunswick et Canada : 1994-1998
Mortalité au sein de la population	- Statistiques de l'état civil, 1994-1998
Morbidité au sein de la population	- Maladies transmissibles au Nouveau-Brunswick : 1994-1998
	- Données sur l'utilisation des ressources hospitalières, 1994-1998
	- Statistiques sur les programmes de la Santé publique, 1994-1998

STRUCTURE DE LA POPULATION

Dans l'ensemble, la structure de la population présente peu de changements, par rapport aux années précédentes.

- La population totale du Nouveau-Brunswick après rajustement était, en 1996 de 752 995 habitants.
- Un peu moins de la moitié de la population du Nouveau-Brunswick était de sexe masculin, soit 49,6%, tandis que 50,4% de la population était de sexe féminin.
- Les adultes âgés de 15 à 64 ans constituaient 68,4% de la population totale.
- Dans la province, les trois plus importants groupes d'âge, par tranche de 5 ans, qui totalisaient 25,1% de l'ensemble de la population, étaient les 35 à 39 ans,

les 30 à 34 ans et les 40 à 44 ans. Ils représentaient respectivement 8,5%, 8,4% et 8,2% de la population.

- Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 12,4% de la population totale du Nouveau-Brunswick.

- Les enfants de la naissance à 14 ans représentaient 19,2% de la population de la province.

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

- Le taux d'accroissement naturel de la population de la province a diminué régulièrement, passant de 4,1 pour 1 000 habitants en 1994 à 2,1 pour 1 000 habitants en 1998. On n'a remarqué aucune différence persistante entre les régions sanitaires au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Le taux de mortalité infantile a continué de baisser au cours de la période considérée; le taux le plus bas a été atteint en 1995. Il y a eu une hausse soudaine d'environ 26% en 1998. Il n'y avait aucune différence persistante entre les régions sanitaires.

- Pendant la période considérée, les mères de 25 à 29 ans ont eu le taux de fécondité le plus élevé pour le Nouveau-Brunswick : variant de 100,4 à 120,5 naissances vivantes pour 1 000 femmes. Chez les mères de 35 à 39 ans, on a constaté une augmentation progressive du taux de fécondité qui est passé de 17,2 à 20,3 naissances vivantes pour 1 000 femmes.

- Le nombre total de naissances vivantes au Nouveau-Brunswick a baissé de façon régulière, passant de 8 903 en 1994 à 7 831 en 1998.

- Le pourcentage des naissances vivantes de moins de 2 500 grammes a fluctué au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998, atteignant un minimum (5,1%) en 1998 et un maximum (5,8%) en 1994.

- Chez les hommes et chez les femmes du Nouveau-Brunswick : l'espérance de vie des Néo-Brunswickois à la naissance était légèrement inférieure à la moyenne canadienne. En 1996, elle était de 75,2 ans chez les Néo-Brunswickois et de 81,2 ans chez les Néo-Brunswickoises. (Nota : Statistique Canada calcule l'espérance de vie seulement au cours de l'année postcensitaire. Les chiffres les plus récents sont donc ceux de 1996.)

- Pour la période de 1994 à 1998, les principales causes d'années potentielles de vie perdues (APVP) sont demeurées les mêmes que celles qui ont été précédemment

recensées pour les hommes (à savoir insuffisance coronarienne, suicide, accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et cancer du poumon). Depuis le rapport précédent, ces causes ont changé chez les femmes. Elles sont comme suit : cancer du sein, insuffisance coronarienne, cancer du poumon et accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur, alors que dans le rapport précédent, elles étaient les suivantes : anomalies congénitales, insuffisance coronarienne, accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur, cancer du poumon et mortalité périnatale. Chez les hommes comme chez les femmes, il s'agissait là des causes de la plupart des années potentielles de vie perdues pendant cette période quinquennale.

MORTALITÉ AU SEIN DE LA POPULATION

- Les principales causes de décès au Nouveau-Brunswick de 1994 à 1998 sont demeurées les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs malignes, les maladies de l'appareil respiratoire et enfin les causes extérieures de lésions traumatiques et les empoisonnements.

- Au cours de la période de 1994 à 1998, les décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire ont connu une baisse de 2%, alors que ceux attribuables aux tumeurs malignes ont augmenté de 11,3%.

- Chez les hommes, les cardiopathies ischémiques (CI) ont été responsables de la plus grande proportion des décès. Venaient ensuite la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les maladies vasculaires cérébrales.

- Chez les femmes, comme dans les rapports précédents, les cardiopathies ischémiques (CI) ont été responsables de la plus grande proportion des décès. Venaient ensuite les maladies vasculaires cérébrales, la tumeur maligne du sein et la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon. Ces maladies ont été responsables de la plus grande proportion de l'ensemble des décès chez les femmes pendant cette période quinquennale.

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS SELON DES MALADIES CHOISIES

- Un examen des principales causes de décès de 1994 à 1998 montre que les causes spécifiques de décès étaient semblables à celles des cinq années précédentes.

- La principale cause de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire a été les cardiopathies ischémiques qui ont représenté 54% de l'ensemble des décès chez les hommes et 46% chez les femmes.

- Chez les hommes, les principales tumeurs malignes responsables de décès sont demeurées celles de la trachée, des bronches et du poumon, puis celles de la prostate, du côlon, du pancréas et enfin de l'estomac.

- Chez les femmes, les principales tumeurs malignes responsables de décès sont demeurées celles de la trachée, des bronches et du poumon, puis celles du sein, du côlon, du pancréas et enfin de l'utérus.

- Chez les hommes et les femmes, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la pneumonie et la grippe ont représenté plus de 88% de tous les décès attribuables aux maladies de l'appareil respiratoire.

- Pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les taux de mortalité, par âge les plus élevés ont encore été dans le groupe des 65 ans et plus, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

- Les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur ont représenté le plus grand pourcentage de décès dans la catégorie « causes extérieures de lésions traumatiques et empoisonnements », et ce, chez les deux sexes.

- Le pourcentage de décès attribuables aux accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur a été plus élevé chez les femmes (61%) que chez les hommes (42%), pendant les cinq années étudiées.

MORBIDITÉ AU SEIN DE LA POPULATION

L'analyse des données sur les maladies transmissibles a révélé ce qui suit :

- En 1998, un seul cas de rubéole a été déclaré comparativement à deux cas l'année précédente. Toujours en 1998, le nombre de cas déclarés de coqueluche a augmenté pour atteindre 266 cas comparativement à 73 en 1997;

- Le taux d'immunisation chez les élèves de première année a baissé, passant de 98,5% en 1993-1994 à 95,8% en 1997-1998;

- La chlamydia a été la maladie transmise sexuellement la plus fréquemment déclarée de 1994 à 1998, suivie de la gonorrhée et de la syphilis;

- Le nombre de décès causés par le sida est passé de 74 en 1994 à 89 en 1998. Le nombre de cas déclarés de personnes séropositives s'est stabilisé pendant ces cinq années et il n'a pas manifesté de tendance constante à la hausse;

- La campylobactériose et la salmonellose ont été les principales maladies entériques signalées pendant la période étudiée, suivies de la giardiase et de l'infection à *E. coli* (0157:H7);

- De 1994 à 1998, le plus grand nombre de cas de tuberculose a été signalé au sein du groupe d'âge des 60 ans et plus.

L'analyse des données sur l'utilisation des ressources hospitalières a fourni les renseignements suivants :

- Les troubles mentaux, les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de l'appareil respiratoire et les maladies de l'appareil digestif ont été, dans l'ordre, les principales causes d'hospitalisation de 1994 à 1998;

- De 1993-1994 à 1997-1998, le coût moyen, par jour-patient, a augmenté de 34,5% au Nouveau-Brunswick : passant de 577 $ à 776 $, soit une hausse légèrement supérieure à celle du coût national qui a augmenté de 33%, passant de 628 $ à 840 $.

- Entre 1994 et 1998, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué de 24% au Nouveau-Brunswick et de 33% au Canada et le nombre de congés, par 1 000 habitants, a diminué de 11% au Nouveau-Brunswick et de 20% au Canada.

- Les cardiopathies ischémiques, les maladies vasculaires cérébrales et les tumeurs malignes chez les hommes et les cardiopathies ischémiques et les maladies vasculaires cérébrales chez les femmes ont représenté une plus grande proportion de l'utilisation des ressources hospitalières dans le Sud que dans le Nord de la province.

Chapitre 1

Introduction

Introduction

Objet et portée

Le quatrième rapport sur **L'ÉTAT DE SANTÉ DES NÉO-BRUNSWICKOIS ET DES NÉO-BRUNSWICKOISES** :

1. Trace un profil de l'état de santé de la population du Nouveau-Brunswick, et

2. fournit des renseignements aidant à la planification, à la surveillance et à l'évaluation des programmes, ainsi qu'à l'élaboration de politiques.

Le rapport comporte des renseignements mis à jour sur certains indicateurs pour plusieurs catégories de maladies. Des sections détaillées traitent des six principales causes de décès.

Contenu du rapport

Chapitre 2 – Structure de la population – fournit une mise à jour de la structure de la population du Nouveau-Brunswick, à partir des données du recensement de 1996.

Chapitre 3 – Statistiques démographiques – contient des renseignements mis à jour qui décrivent des statistiques démographiques choisies, comme le taux d'accroissement naturel, l'espérance de vie, la santé des enfants en bas âge et la grossesse chez les adolescentes.

Chapitre 4 – Mortalité au sein de la population – présente des renseignements mis à jour sur les causes importantes de décès dans la province.

Chapitre 5 – Morbidité au sein de la population – fournit une mise à jour des données sur la morbidité provenant de diverses sources, comme les données sur l'utilisation des ressources hospitalières, *Les maladies transmissibles au Nouveau-Brunswick* et les statistiques et rapports sur les programmes de la Santé publique.

Dans la plupart des cas, les données du présent rapport portent sur l'ensemble de la province, sur le Nord et sur le Sud, ainsi que sur les sept régions sanitaires. On trouvera à l'annexe A le nom et les limites géographiques des régions sanitaires du Nouveau-Brunswick. Dans tout le rapport, nous avons fait usage des données du recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996, ainsi que de statistiques démographiques choisies pour la période de 1994 à 1998.

Rétroaction

Nous accueillons avec plaisir vos commentaires. Veuillez les faire parvenir au :

Docteur Christofer Balram
Épidémiologiste provincial
Directeur du Service provincial d'épidémiologie
Ministère de la Santé et du Mieux-être
Case postale 5100
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G8
N° de téléphone : (506) 453-3092
N° de télécopieur : (506) 453-2780
Courriel : christofer.balram@gnb.ca

Chapitre 2

Structure de la Population

Faits saillants

Les renseignements fournis dans le présent chapitre se fondent sur ceux du recensement de 1996 de Statistique Canada.

D'après les données du recensement de 1996 :

- La population totale du Nouveau-Brunswick après rajustement était de 752 995 habitants;
- Un peu moins de la moitié de la population du Nouveau-Brunswick était de sexe masculin, soit 49,6%, tandis que 50,4% de la population était de sexe féminin;
- Les adultes âgés de 15 à 64 ans constituaient 68,4% de la population totale;
- Dans la province, les trois plus importants groupes d'âge par tranche de cinq ans se répartissaient comme suit :
  - de 35 à 39 ans, 8,7%,
  - de 30 à 34 ans, 8,4%,
  - de 40 à 44 ans, 8,2%;
- Les personnes âgées de 65 ans et plus constituaient 12,4% de la population totale;
- Les enfants de la naissance à 14 ans représentaient 19,2% de la population.

Structure de la population

Le présent chapitre donne des renseignements sur la structure de la population du Nouveau-Brunswick selon les données du recensement de 1996. Il se peut que les totaux ne soient pas toujours exacts en raison de l'arrondissement des chiffres. Les données sont fournies pour la province, pour les sept régions sanitaires ainsi que pour le Nord et le Sud de la province. Le Nord est constitué des régions 4, 5, 6 et 7, et le Sud comprend les régions 1, 2 et 3.

NOTES POUR LA FIGURE 1
NOUVEAU-BRUNSWICK

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 752 995
- Hommes : 373 791
- Femmes : 379 204
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 99
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,5%), 30-34 ans (8,4%) et 40-44 ans (8,1%)
- Adultes, 15-64 ans = 68,2% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 12,5% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 19,3% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 2
RÉGION SANITAIRE 1

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 182 850
- Hommes : 90 533
- Femmes : 92 317
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 98
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,5%), 30-34 ans (8,4%) et 40-44 (8,1%)
- Adultes, 15-64 ans = 68,5% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus =13,2% de la population
- Enfants, 0-14 ans =18,3% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 3
RÉGION SANITAIRE 2

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 177 837
- Hommes : 87 170
- Femmes : 90 667
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 96
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,5%), 30-34 ans (8,5%), et 40-44 ans (8,1%)
- Adultes, 15-64 ans = 66,5% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 13,2% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 20,3% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 4
RÉGION SANITAIRE 3

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 165 354
- Hommes : 82 597
- Femmes : 82 757
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 99
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 30-34 ans (8,7%), 35-39 ans (8,4%) et 25-29 ans (7,8%)
- Adultes, 15-64 ans = 68,0% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 12,0% de la population
- Enfants,0-14 ans = 20,0% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 5
RÉGION SANITAIRE 4

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 54 727
- Hommes : 27 113
- Femmes : 27 614
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 98
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (9,4%), 40-44 ans (8,6%) et 30-34 ans (8,3%)
- Adultes, 15-64 ans = 68,7% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 11,8% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 19,5% de la population



Figure 5 Répartition démographique selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 4 : 1996

NOTES POUR LA FIGURE 6
RÉGION SANITAIRE 5

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 32 953
- Hommes : 16 161
- Femmes : 16 792
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 96
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,8%), 30-34 ans (8,1%) et 40-44 ans (8,1%)
- Adultes, 15-64 ans = 67,7% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 13,3% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 19,0% de la population



Figure 6 Répartition démographique selon l'âge et le sexe, Région sanitaire 5 : 1996

NOTES POUR LA FIGURE 7
RÉGION SANITAIRE 6

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 89 265
- Hommes : 44 946
- Femmes : 44 319
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 101
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (9,0%), 40-44 ans (8,7%) et 30-34 ans (8,5%)
- Adultes, 15-64 ans = 70,6% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 11,1% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 18,3% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 8
RÉGION SANITAIRE 7

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 50 009
- Hommes : 25 271
- Femmes : 24 738
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 102
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,3%), 30-34 ans (8,1%,) et 40-44 ans (8,0%)
- Adultes, 15-64 ans = 68,4% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 12,3% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 19,3% de la population



NOTES POUR LA FIGURE 9
RÉGIONS SANITAIRES DU NORD
(Régions 4, 5, 6 et 7)

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 226 954
- Hommes : 113 491
- Femmes : 113 463
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 100
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 35-39 ans (8,9%), 30-34 ans (8,4%) et 40-44 ans (8,4%)
- Adultes, 15-64 ans = 69,2% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 11,9% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 18,9% de la population



Figure 9 Répartition démographique selon l'âge et le sexe, Région sanitaire du Nord: 1996

NOTES POUR LA FIGURE 10
RÉGIONS SANITAIRES DU SUD
(Régions 1, 2 et 3)

- Population totale (recensement de 1996 après rajustement) : 526 041
- Hommes : 260 300
- Femmes : 265 741
- Ratio hommes : femmes (nombre d'hommes par rapport aux femmes) = 98
- Les trois plus importants groupes d'âge, sexes combinés : 30-34 ans (8,5%), 35-39 ans (8,4%) et 40-44 ans (8,0%)
- Adultes, 15-64 ans = 67,7% de la population
- Personnes âgées, 65 ans et plus = 19,5% de la population
- Enfants, 0-14 ans = 12,8% de la population



Figure 10. Répartition démographique selon l'âge et le sexe, Région sanitaires du Sud: 1996

Chapitre 3

Statistiques démographiques

Faits saillants

Au sein de la population du Nouveau-Brunswick :

- Le taux d'accroissement naturel de la population de la province a diminué régulièrement, passant de 4,1, par 1 000, en 1994 à 2,1, par 1 000, en 1998. On n'a remarqué aucune différence persistante évidente entre les régions sanitaires au cours de la période quinquennale considérée, soit de 1994 à 1998.

- Le taux de mortalité infantile a connu une baisse générale de 1994 à 1997, mais il a augmenté d'environ 26% en 1998. On n'a constaté aucune tendance persistante dans les régions sanitaires.

- Pendant la période considérée, les mères de 25 à 29 ans ont eu le taux de fécondité le plus élevé de la province. On a toutefois constaté une diminution progressive du taux de fécondité chez les mères âgées de 20 à 29 ans. Le même phénomène a été observé chez les mères de 15 à 19 ans jusqu'en 1997, puis le taux de fécondité de ce groupe d'âge a légèrement augmenté en 1998. Le taux de fécondité des mères de 30 à 44 ans a augmenté graduellement au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Le nombre total de naissances vivantes au Nouveau-Brunswick a baissé de façon régulière à compter de 1994 (tableau 2).

- Le pourcentage des naissances vivantes de moins de 2 500 grammes a fluctué au cours de la période considérée, atteignant un minimum (5,1%) en 1998, et un maximum (5,8%) en 1994.

- Chez les hommes et les femmes du Nouveau-Brunswick, l'espérance de vie à la naissance était légèrement inférieure à la moyenne canadienne. En 1996, elle était de 75,2 ans chez les Néo-Brunswickois et de 81,2 ans chez les Néo-Brunswickoises, alors que la moyenne nationale était de 75,7 ans chez les Canadiens et de 81,4 ans chez les Canadiennes.

- De 1994 à 1998, les principales causes d'années potentielles de vie perdues (APVP) sont demeurées les mêmes que celles qui ont été précédemment recensées pour les hommes, à savoir : insuffisance coronarienne, accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur, suicide et cancer du poumon.

- Depuis le rapport précédent, les principales causes d'années potentielles de vie perdues (APVP) ont changé quelque peu chez les femmes, le cancer du sein remplaçant les anomalies congénitales comme cause première.

Statistiques démographiques

TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL

NOTES POUR LE TABLEAU 1

Le **tableau 1** indique le taux d'accroissement naturel, par 1 000 habitants, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Le taux d'accroissement naturel au Nouveau-Brunswick a connu une baisse constante à compter de 1994, pour atteindre un minimum en 1998.

Nord et Sud

- Le taux d'accroissement naturel a diminué de façon constante dans le Nord et dans le Sud de 1994 à 1998.
- Le taux d'accroissement naturel a été plus élevé dans le Sud que dans le Nord pour toutes les années de la période à l'étude.

Régions sanitaires

- On a constaté au cours de la période de 1994 à 1998 une nette tendance à la baisse du taux d'accroissement naturel dans toutes les régions.

Tableau 1 Taux d'accroissement naturel, par 1 000 habitants, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		1994	1995	1996	1997	1998
Région sanitaire	**1**	3,2	2,8	2,5	1,7	1,2
	2	4,1	3,0	3,5	2,6	1,8
	3	5,7	5,2	4,5	4,1	3,8
	4	2,8	1,9	1,7	1,2	1,7
	5	2,8	2,1	0,4	2,5	-0,3
	6	3,9	3,7	2,0	2,9	1,8
	7	4,7	5,0	4,1	2,8	3,6
	Nord	3,7	3,3	2,2	2,4	1,9
	Sud	4,3	3,6	3,5	2,8	2,2
	Province	4,1	3,5	3,1	2,7	2,1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Statistiques démographiques

TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL

NOTES POUR LE TABLEAU 1

Le **tableau 1** indique le taux d'accroissement naturel, par 1 000 habitants, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Le taux d'accroissement naturel au Nouveau-Brunswick a connu une baisse constante à compter de 1994, pour atteindre un minimum en 1998.

Nord et Sud

- Le taux d'accroissement naturel a diminué de façon constante dans le Nord et dans le Sud de 1994 à 1998.

- Le taux d'accroissement naturel a été plus élevé dans le Sud que dans le Nord pour toutes les années de la période à l'étude.

Régions sanitaires

- On a constaté au cours de la période de 1994 à 1998 une nette tendance à la baisse du taux d'accroissement naturel dans toutes les régions.

Tableau 1 Taux d'accroissement naturel, par 1 000 habitants, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		1994	1995	1996	1997	1998
Région sanitaire	**1**	3,2	2,8	2,5	1,7	1,2
	2	4,1	3,0	3,5	2,6	1,8
	3	5,7	5,2	4,5	4,1	3,8
	4	2,8	1,9	1,7	1,2	1,7
	5	2,8	2,1	0,4	2,5	-0,3
	6	3,9	3,7	2,0	2,9	1,8
	7	4,7	5,0	4,1	2,8	3,6
	Nord	3,7	3,3	2,2	2,4	1,9
	Sud	4,3	3,6	3,5	2,8	2,2
	Province	4,1	3,5	3,1	2,7	2,1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

MORTALITÉ INFANTILE

NOTES POUR LA FIGURE 11

La **figure 11** montre le taux annuel de mortalité infantile, par 1 000 naissances vivantes, au Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

- Comparativement à la période quinquennale précédente (1989-1993), le taux de mortalité infantile de la province a diminué pour atteindre un minimum en 1995. Une hausse soudaine, d'environ 26%, a été notée en 1998.

Figure 11 Taux de mortalité infantile, par 1 000 naissances vivantes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 2

Le **tableau 2** indique le nombre de naissances vivantes, la mortalité infantile et le taux de mortalité infantile, par 1 000 naissances vivantes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998. **Nota :** Ces statistiques ne comprennent pas de données extérieures à la province.

- À l'échelle provinciale, le taux de mortalité infantile a fluctué de 1994 à 1998, avec un minimum en 1995 et en 1997. Une hausse d'environ 26% a eu lieu en 1998.

Nord et Sud

- Pour toutes ces années, le taux de mortalité infantile a été similaire dans le Nord et dans le Sud, à l'exception de 1994 où il a été plus élevé dans le Nord, et de 1998 où il a été plus élevé dans le Sud. En 1997, le taux de mortalité infantile a été très faible dans le Nord.

Régions sanitaires

- On n'a signalé aucune tendance persistante dans les sept régions sanitaires de 1994 à 1998. Tous les taux régionaux ont connu des fluctuations pendant ces cinq années, à l'exception de la Région 4, dont le taux a chuté de façon continuelle à compter de 1996. La Région 5 a également connu une baisse importante en 1996, 1997 et 1998.

Tableau 2 **Nombre de naissances vivantes, mortalité infantile et taux de mortalité infantile, par 1 000 naissances vivantes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

1994		Naissances vivantes	Mortalité infantile	Taux de mortalité infantile
Région sanitaire	1	1 947	10	5,1
	2	2 338	8	3,4
	3	2 163	8	3,7
	4	561	2	3,6
	5	354	2	5,7
	6	940	2	2,1
	7	600	5	8,3
	Nord	2 455	11	4,5
	Sud	6 448	26	4,0
	Province	8 903	37	4,1
1995		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 954	10	5,1
	2	2 196	10	4,6
	3	2 036	6	3,0
	4	525	3	5,7
	5	325	1	3,1
	6	873	2	2,3
	7	605	1	1,7
	Nord	2 328	7	3,0
	Sud	6 186	26	4,2
	Province	8 514	33	3,9
1996		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 884	11	5,8
	2	2 162	7	3,2
	3	1 989	7	3,5
	4	508	4	7,9
	5	261	0	0,0
	6	778	1	1,3
	7	553	2	3,6
	Nord	2 100	7	3,3
	Sud	6 035	25	4,1
	Province	8 135	32	3,93
1997		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 753	7	4,0
	2	2 027	11	5,4
	3	1 949	12	6,2
	4	484	0	0,0
	5	306	0	0,0
	6	846	1	1,2
	7	503	0	0,0
	Nord	2 139	1	0,5
	Sud	5 729	30	5,2
	Province	7 868	31	3,9
1998		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 833	12	6,5
	2	1 948	10	5,1
	3	1 906	9	4,7
	4	525	2	3,8
	5	278	0	0,0
	6	772	2	2,6
	7	569	4	7,0
	Nord	2 144	8	3,7
	Sud	5 687	31	5,5
	Province	7 831	39	5,0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 2 **Nombre de naissances vivantes, mortalité infantile et taux de mortalité infantile, par 1 000 naissances vivantes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

1994		Naissances vivantes	Mortalité infantile	Taux de mortalité infantile
Région sanitaire	1	1 947	10	5,1
	2	2 338	8	3,4
	3	2 163	8	3,7
	4	561	2	3,6
	5	354	2	5,7
	6	940	2	2,1
	7	600	5	8,3
	Nord	2 455	11	4,5
	Sud	6 448	26	4,0
	Province	8 903	37	4,1
1995		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 954	10	5,1
	2	2 196	10	4,6
	3	2 036	6	3,0
	4	525	3	5,7
	5	325	1	3,1
	6	873	2	2,3
	7	605	1	1,7
	Nord	2 328	7	3,0
	Sud	6 186	26	4,2
	Province	8 514	33	3,9
1996		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 884	11	5,8
	2	2 162	7	3,2
	3	1 989	7	3,5
	4	508	4	7,9
	5	261	0	0,0
	6	778	1	1,3
	7	553	2	3,6
	Nord	2 100	7	3,3
	Sud	6 035	25	4,1
	Province	8 135	32	3,93
1997		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 753	7	4,0
	2	2 027	11	5,4
	3	1 949	12	6,2
	4	484	0	0,0
	5	306	0	0,0
	6	846	1	1,2
	7	503	0	0,0
	Nord	2 139	1	0,5
	Sud	5 729	30	5,2
	Province	7 868	31	3,9
1998		**Naissances vivantes**	**Mortalité infantile**	**Taux de mortalité infantile**
Région sanitaire	1	1 833	12	6,5
	2	1 948	10	5,1
	3	1 906	9	4,7
	4	525	2	3,8
	5	278	0	0,0
	6	772	2	2,6
	7	569	4	7,0
	Nord	2 144	8	3,7
	Sud	5 687	31	5,5
	Province	7 831	39	5,0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

TAUX DE FÉCONDITÉ par ÂGE

NOTES POUR LA FIGURE 12

La **figure 12** montre le taux de fécondité, par âge, par 1 000 femmes, pour quatre groupes d'âge, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Comparativement à la période quinquennale précédente (1989-1993), on a observé au cours de celle-ci une tendance à la baisse graduelle du taux de fécondité chez les mères âgées de 15 à 19 ans et chez les mères de 20 à 29 ans.

- De 1994 à 1998, le taux de fécondité a été constant chez les mères âgées de 30 à 39 ans et il n'y a eu pratiquement aucun changement dans le cas des femmes âgées de 40 à 49 ans.

Figure 12 Taux de fécondité par âge, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 3

Le **tableau 3** présente le taux de fécondité, par âge, par 1 000 femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, les mères de 25 à 29 ans ont eu le taux de fécondité le plus élevé pour l'ensemble de la province.

- Jusqu'en 1994, on a constaté une augmentation du taux de fécondité chez les mères de 15 à 19 ans; cette tendance a été suivie d'une baisse graduelle au cours des années subséquentes, de 1995 à 1998.

- Le taux de fécondité des mères de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans a légèrement diminué de 1994 à 1997. Cette tendance a été suivie, par une légère hausse en 1998 pour les mères de 25 à 29 ans. Le taux de fécondité des mères de 30 à 34 ans a connu une légère augmentation jusqu'en 1995, suivie d'une diminution graduelle jusqu'en 1998. On a également noté une légère hausse du taux de fécondité des mères de 35 à 39 ans et de 40 à 44 ans.

- Le taux de fécondité est demeuré stable chez les mères de 45 à 49 ans pendant la période à l'étude.

Nord et Sud

- De 1994 à 1998, le taux de fécondité par âge a été généralement plus élevé dans le Sud pour tous les groupes d'âge, sauf pour celui des mères de 20 à 24 ans, pour les années 1994, 1995, 1997 et 1998. Cette tendance correspond à celle dont on a fait état dans la version précédente du rapport sur *L'état de santé des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises* (1989-1993).

Régions sanitaires

- De 1994 à 1998, le taux de fécondité des mères de 15 à 19 ans a été plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 3, 5 et 7. Dans les autres groupes d'âge, on a constaté peu de différences persistantes entre les régions.

Tableau 3 Taux de fécondité par âge, par 1 000 femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Groupe d'âge						
1994		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Region sanitaire	1	31,4	63,5	114,5	60,7	17,4	2,2	0,0
	2	40,5	94,0	126,9	72,7	21,8	2,4	0,2
	3	34,5	93,9	122,7	68,5	20,4	2,3	0,0
	4	26,4	89,4	114,2	49,6	10,6	0,4	0,0
	5	34,1	87,3	128,5	59,2	8,4	3,0	0,0
	6	27,5	71,8	119,3	53,9	11,8	0,8	0,0
	7	38,1	96,9	116,3	55,2	14,7	1,5	0,0
	Nord	30,4	83,9	118,7	53,9	11,6	1,2	0,0
	Sud	35,5	83,3	121,3	67,2	19,8	2,3	0,0
	Province	33,8	83,5	120,6	63,2	17,2	2,0	0,0
1995		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Region sanitaire	1	26,3	66,6	104,3	69,9	19,6	1,6	0,1
	2	38,4	89,6	109,7	74,9	20,1	2,8	0,0
	3	37,0	87,6	107,1	67,6	18,2	3,9	0,2
	4	25,9	84,5	108,5	38,2	12,9	2,7	0,0
	5	33,2	86,4	90,9	65,8	11,9	0,8	0,0
	6	25,7	71,5	104,7	51,5	9,3	1,6	0,0
	7	36,5	93,2	109,0	64,2	20,6	0,5	0,0
	Nord	29,1	81,6	104,8	53,0	12,9	0,1	0,0
	Sud	33,8	80,9	107,0	70,9	19,3	2,7	0,1
	Province	32,3	81,1	106,4	65,5	17,3	1,9	0,1
1996		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Region sanitaire	1	22,4	66,0	101,2	65,1	20,2	2,6	0,1
	2	33,1	90,9	101,1	77,6	22,5	3,3	0,3
	3	31,3	76,1	109,7	71,4	22,5	2,0	0,0
	4	21,5	78,5	105,1	46,6	10,2	0,9	0,0
	5	22,7	75,6	95,9	36,2	7,7	0,8	0,0
	6	20,2	62,5	87,2	48,0	13,8	2,1	0,0
	7	27,8	88,3	103,3	64,6	12,3	0,0	0,0
	Nord	22,5	74,1	96,3	49,5	11,7	1,2	0,0
	Sud	28,8	77,4	104,0	71,3	21,7	2,7	0,2
	Province	26,8	76,4	101,8	64,8	18,6	2,2	0,1
1997		1549	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Region sanitaire	1	17,6	66,2	96,2	61,4	15,6	1,7	0,0
	2	30,5	79,0	102,6	70,9	22,1	3,3	0,0
	3	32,1	78,3	99,6	69,8	23,4	3,3	0,0
	4	18,6	83,4	98,4	39,1	10,2	1,7	0,0
	5	21,9	78,5	101,8	59,9	11,2	0,8	0,0
	6	20,8	69,6	104,7	48,8	10,6	2,1	0,0
	7	23,4	76,5	105,0	53,2	8,8	3,1	0,0
	Nord	21,0	75,6	102,9	49,0	10,2	2,0	0,0
	Sud	26,5	74,3	99,4	67,3	20,2	2,7	0,0
	Province	24,7	74,7	100,4	61,8	17,1	2,5	0,0
1998		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Region sanitaire	1	23,5	55,2	103,1	65,8	20,1	2,0	0,3
	2	28,9	76,4	95,4	65,7	25,7	3,7	0,5
	3	27,1	72,7	109,9	64,1	23,4	2,5	0,0
	4	18,1	93,2	106,3	42,6	11,4	1,3	0,0
	5	29,7	72,6	82,0	47,3	14,0	0,8	0,0
	6	19,3	61,3	92,7	43,8	13,8	1,6	0,0
	7	29,4	73,2	123,6	59,2	19,1	1,0	0,0
	Nord	22,6	73,1	101,6	47,5	14,3	1,3	0,0
	Sud	26,5	67,8	102,8	65,2	23,0	2,7	0,3
	Province	25,2	69,3	102,5	59,8	20,3	2,3	0,2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 3 Taux de fécondité par âge, par 1 000 femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Groupe d'âge						
1994		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Région sanitaire	1	31,4	63,5	114,5	60,7	17,4	2,2	0,0
	2	40,5	94,0	126,9	72,7	21,8	2,4	0,2
	3	34,5	93,9	122,7	68,5	20,4	2,3	0,0
	4	26,4	89,4	114,2	49,6	10,6	0,4	0,0
	5	34,1	87,3	128,5	59,2	8,4	3,0	0,0
	6	27,5	71,8	119,3	53,9	11,8	0,8	0,0
	7	38,1	96,9	116,3	55,2	14,7	1,5	0,0
	Nord	30,4	83,9	118,7	53,9	11,6	1,2	0,0
	Sud	35,5	83,3	121,3	67,2	19,8	2,3	0,0
	Province	33,8	83,5	120,6	63,2	17,2	2,0	0,0
1995		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Région sanitaire	1	26,3	66,6	104,3	69,9	19,6	1,6	0,1
	2	38,4	89,6	109,7	74,9	20,1	2,8	0,0
	3	37,0	87,6	107,1	67,6	18,2	3,9	0,2
	4	25,9	84,5	108,5	38,2	12,9	2,7	0,0
	5	33,2	86,4	90,9	65,8	11,9	0,8	0,0
	6	25,7	71,5	104,7	51,5	9,3	1,6	0,0
	7	36,5	93,2	109,0	64,2	20,6	0,5	0,0
	Nord	29,1	81,6	104,8	53,0	12,9	0,1	0,0
	Sud	33,8	80,9	107,0	70,9	19,3	2,7	0,1
	Province	32,3	81,1	106,4	65,5	17,3	1,9	0,1
1996		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Région sanitaire	1	22,4	66,0	101,2	65,1	20,2	2,6	0,1
	2	33,1	90,9	101,1	77,6	22,5	3,3	0,3
	3	31,3	76,1	109,7	71,4	22,5	2,0	0,0
	4	21,5	78,5	105,1	46,6	10,2	0,9	0,0
	5	22,7	75,6	95,9	36,2	7,7	0,8	0,0
	6	20,2	62,5	87,2	48,0	13,8	2,1	0,0
	7	27,8	88,3	103,3	64,6	12,3	0,0	0,0
	Nord	22,5	74,1	96,3	49,5	11,7	1,2	0,0
	Sud	28,8	77,4	104,0	71,3	21,7	2,7	0,2
	Province	26,8	76,4	101,8	64,8	18,6	2,2	0,1
1997		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Région sanitaire	1	17,6	66,2	96,2	61,4	15,6	1,7	0,0
	2	30,5	79,0	102,6	70,9	22,1	3,3	0,0
	3	32,1	78,3	99,6	69,8	23,4	3,3	0,0
	4	18,6	83,4	98,4	39,1	10,2	1,7	0,0
	5	21,9	78,5	101,8	59,9	11,2	0,8	0,0
	6	20,8	69,6	104,7	48,8	10,6	2,1	0,0
	7	23,4	76,5	105,0	53,2	8,8	3,1	0,0
	Nord	21,0	75,6	102,9	49,0	10,2	2,0	0,0
	Sud	26,5	74,3	99,4	67,3	20,2	2,7	0,0
	Province	24,7	74,7	100,4	61,8	17,1	2,5	0,0
1998		**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**45-49**
Région sanitaire	1	23,5	55,2	103,1	65,8	20,1	2,0	0,3
	2	28,9	76,4	95,4	65,7	25,7	3,7	0,5
	3	27,1	72,7	109,9	64,1	23,4	2,5	0,0
	4	18,1	93,2	106,3	42,6	11,4	1,3	0,0
	5	29,7	72,6	82,0	47,3	14,0	0,8	0,0
	6	19,3	61,3	92,7	43,8	13,8	1,6	0,0
	7	29,4	73,2	123,6	59,2	19,1	1,0	0,0
	Nord	22,6	73,1	101,6	47,3	14,3	1,3	0,0
	Sud	26,5	67,8	102,8	65,2	23,0	2,7	0,3
	Province	25,2	69,3	102,5	59,8	20,3	2,3	0,2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

NAISSANCES VIVANTES DE MOINS DE 2 500 GRAMMES

NOTES POUR LA FIGURE 13

La **figure 13** indique le pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans le Nord et le Sud du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, on n'a constaté aucune différence persistante entre le Nord et le Sud de la province quant au pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes.

- Au cours de la même période, on a observé une tendance à la hausse du pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans le Sud de la province et une tendance à la baisse dans le Nord de la province.

Figure 13 Pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 4

Le **tableau 4** indique le nombre de naissances vivantes, le nombre de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes et le pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et le Nouveau-Brunswick pour la période quinquennale de 1994 à 1998. **Nota :** Ces statistiques ne comprennent pas de données extérieures à la province.

- À compter de 1994, le nombre total de naissances vivantes a graduellement diminué au Nouveau-Brunswick pour atteindre un minimum de 7 831 en 1998.

- Au cours de la période à l'étude, le pourcentage des naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans la province a varié, avec un maximum de 5,8% en 1994.

Nord et Sud

- Le pourcentage des naissances vivantes de moins de 2 500 grammes a été légèrement plus élevé dans le Nord et dans le Sud en 1994 et en 1996, mais il a diminué à la fois dans le Nord et dans le Sud en 1995.

Régions sanitaires

- Aucune tendance persistante ne s'est dégagée dans les régions sanitaires. L'année 1994 fait toutefois exception avec un pourcentage plus élevé de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans la Région 4 et l'année 1996 avec un pourcentage moins élevé dans la Région 7.

Tableau 4 Nombre et pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, 1994-1998

1994		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	1 947	112	5,8
	2	2 338	140	6,0
	3	2 163	115	5,3
	4	561	39	7,0
	5	354	20	5,7
	6	940	50	5,3
	7	600	37	6,2
	Nord	2 455	146	6,0
	Sud	6 448	367	5,7
	Province	8 903	513	5,8

1995		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	954	107	5,5
	2	2 196	88	4,0
	3	2 036	92	4,5
	4	525	32	6,1
	5	325	13	4,0
	6	873	50	5,7
	7	605	23	3,8
	Nord	2 328	118	5,1
	Sud	6 186	287	4,6
	Province	8 514	405	4,8

1996		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	1 884	91	4,8
	2	2 162	136	6,3
	3	1 989	94	4,7
	4	508	33	6,5
	5	261	10	3,8
	6	778	39	5,0
	7	553	12	2,2
	Nord	2 100	94	4,5
	Sud	6 035	321	5,3
	Province	8 135	415	5,1

1997		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	1 753	77	4,4
	2	2 027	124	6,1
	3	1 949	99	5,1
	4	484	31	6,4
	5	306	15	4,9
	6	846	44	5,2
	7	503	17	3,4
	Nord	2 139	107	5,0
	Sud	5 729	300	5,2
	Province	7 868	407	5,2

1998		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	1 833	104	5,7
	2	1 948	113	5,8
	3	1 906	99	5,2
	4	525	23	4,4
	5	278	15	5,4
	6	772	33	4,3
	7	569	22	3,9
	Nord	2 144	93	4,3
	Sud	5 687	316	5,6
	Province	7 831	409	5,2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 4 Nombre et pourcentage de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, 1994-1998

1994		Nombre total de naissances vivantes	Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes	Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes
Région sanitaire	1	1 947	112	5,8
	2	2 338	140	6,0
	3	2 163	115	5,3
	4	561	39	7,0
	5	354	20	5,7
	6	940	50	5,3
	7	600	37	6,2
	Nord	2 455	146	6,0
	Sud	6 448	367	5,7
	Province	8 903	513	5,8
1995		**Nombre total de naissances vivantes**	**Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes**	**Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes**
Region sanitaire	1	954	107	5,5
	2	2 196	88	4,0
	3	2 036	92	4,5
	4	525	32	6,1
	5	325	13	4,0
	6	873	50	5,7
	7	605	23	3,8
	Nord	2 328	118	5,1
	Sud	6 186	287	4,6
	Province	8 514	405	4,8
1996		**Nombre total de naissances vivantes**	**Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes**	**Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes**
Région sanitaire	1	1 884	91	4,8
	2	2 162	136	6,3
	3	1 989	94	4,7
	4	508	33	6,5
	5	261	10	3,8
	6	778	39	5,0
	7	553	12	2,2
	Nord	2 100	94	4,5
	Sud	6 035	321	5,3
	Province	8 135	415	5,1
1997		**Nombre total de naissances vivantes**	**Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes**	**Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes**
Region sanitaire	1	1 753	77	4,4
	2	2 027	124	6,1
	3	1 949	99	5,1
	4	484	31	6,4
	5	306	15	4,9
	6	846	44	5,2
	7	503	17	3,4
	Nord	2 139	107	5,0
	Sud	5 729	300	5,2
	Province	7 868	407	5,2
1998		**Nombre total de naissances vivantes**	**Nombre de naissances vivantes < 2 500 grammes**	**Pourcentage de naissances vivantes < 2 500 grammes**
Region sanitaire	1	1 833	104	5,7
	2	1 948	113	5,8
	3	1 906	99	5,2
	4	525	23	4,4
	5	278	15	5,4
	6	772	33	4,3
	7	569	22	3,9
	Nord	2 144	93	4,3
	Sud	5 687	316	5,6
	Province	7 831	409	5,2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

ESPÉRANCE DE VIE

NOTES POUR LES TABLEAUX 5 ET 6

Le **tableau 5** indique l'espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes dans les dix provinces et au Canada au cours de la période de 1990-1992 et pour l'année 1996. Le **tableau 6** indique l'espérance de vie des hommes et des femmes du Nouveau-Brunswick et du Canada à la naissance et à l'âge de 60 ans pour l'année 1996.

- En 1996, l'espérance de vie à la naissance au Nouveau-Brunswick était d'environ 75 ans chez les hommes et d'environ 81 ans chez les femmes.
- En 1996, l'espérance de vie à la naissance des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises était légèrement inférieure à la moyenne canadienne.
- Chez les hommes, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 0,9% au Nouveau-Brunswick et de 1,2% au Canada entre 1990-1992 et 1996.
- Chez les femmes, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 0,3% au Nouveau-Brunswick et de 0,5% au Canada.
- En 1996, l'espérance de vie des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises à 60 ans était semblable à celle de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes.

Tableau 5 Espérance de vie à la naissance (en années) selon le sexe, Canada et provinces : 1990-1992 et 1996

	Hommes			Femmes		
	1990-1992	1996	Variation en %	1990-1992	1996	Variation en %
Canada	**74,55**	**75,70**	**1,2**	**80,89**	**81,40**	**0,5**
T.-N.	73,62	75,00	1,4	79,28	80,50	1,2
N.-É.	73,64	74,90	1,3	80,59	80,70	0,1
Î.-P.-É.	73,22	73,90	0,7	80,79	80,70	-0,1
N.-B.	**74,29**	**75,20**	**0,9**	**80,85**	**81,20**	**0,3**
QUÉ.	73,69	75,20	1,5	80,76	81,50	0,7
ONT.	74,93	76,10	1,2	80,95	81,40	0,5
MAN.	74,57	75,50	0,9	80,89	80,80	-0,1
SASK.	75,31	75,50	0,2	81,67	81,40	-0,3
ALB.	75,07	76,00	0,9	80,96	81,30	0,3
C.-B.	75,19	76,10	0,9	81,25	81,90	0,7

Source : Statistique Canada, catalogue n° H39-467/1999E, La santé des Canadiens, Canada et provinces, 1996.

Tableau 6 Espérance de vie (en années) selon l'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : 1996

	À LA NAISSANCE		À 60 AN	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Canada	**75,7**	**81,4**	**16,1**	**19,9**
N.-B.	**75,2**	**81,2**	**15,7**	**19,9**
Région 1	**75,4**	**82,2**	**16,2**	**20,7**
Région 2	**74,7**	**80,3**	**15,3**	**19,2**
Région 3	**74,8**	**80,7**	**15,3**	**19,5**
Région 4	**73,0**	**80,6**	**15,1**	**19,5**
Région 5	**73,7**	**81,0**	**15,9**	**19,6**
Région 6	**75,7**	**82,4**	**16,2**	**20,9**
Région 7	**73,8**	**81,5**	**16,1**	**19,8**

Source : Statistique Canada, catalogue n° 82-221-XIE, Indicateurs de santé, Canada et provinces, 1996.

NOTES POUR LE TABLEAU 6

Les données ne sont pas disponibles pour l'espérance de vie à 1 an, à 20 ans et à 40 ans. Le calcul de l'espérance de vie est fait seulement lors des années censitaires et les tableaux détaillés de l'espérance de vie n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.

Tableau 5 Espérance de vie à la naissance (en années) selon le sexe, Canada et provinces : 1990-1992 et 1996

	Hommes			Femmes		
	1990-1992	1996	Variation en %	1990-1992	1996	Variation en %
Canada	**74,55**	**75,70**	**1,2**	**80,89**	**81,40**	**0,5**
T.-N.	73,62	75,00	1,4	79,28	80,50	1,2
N.-É.	73,64	74,90	1,3	80,59	80,70	0,1
Î.-P.-É.	73,22	73,90	0,7	80,79	80,70	-0,1
N.-B.	**74,29**	**75,20**	**0,9**	**80,85**	**81,20**	**0,3**
QUÉ.	73,69	75,20	1,5	80,76	81,50	0,7
ONT.	74,93	76,10	1,2	80,95	81,40	0,5
MAN.	74,57	75,50	0,9	80,89	80,80	-0,1
SASK.	75,31	75,50	0,2	81,67	81,40	-0,3
ALB.	75,07	76,00	0,9	80,96	81,30	0,3
C.-B.	75,19	76,10	0,9	81,25	81,90	0,7

Source : Statistique Canada, catalogue n° H39-467/1999E, La santé des Canadiens, Canada et provinces, 1996.

Tableau 6 Espérance de vie (en années) selon l'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : 1996

	À LA NAISSANCE		À 60 AN	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Canada	75,7	81,4	16,1	19,9
N.-B.	75,2	81,2	15,7	19,9
Région 1	75,4	82,2	16,2	20,7
Région 2	74,7	80,3	15,3	19,2
Région 3	74,8	80,7	15,3	19,5
Région 4	73,0	80,6	15,1	19,5
Région 5	73,7	81,0	15,9	19,6
Région 6	75,7	82,4	16,2	20,9
Région 7	73,8	81,5	16,1	19,8

Source : Statistique Canada, catalogue n° 82-221-XIE, Indicateurs de santé, Canada et provinces, 1996.

NOTES POUR LE TABLEAU 6

Les données ne sont pas disponibles pour l'espérance de vie à 1 an, à 20 ans et à 40 ans. Le calcul de l'espérance de vie est fait seulement lors des années censitaires et les tableaux détaillés de l'espérance de vie n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.

ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES

NOTES POUR LE TABLEAU 7A

Le **tableau 7a** indique le nombre d'années potentielles de vie perdues (APVP) attribuables aux quinze principales causes de décès chez les hommes dans les dix provinces et dans l'ensemble du Canada de 1994 à 1997.

- Pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick et du Canada, les quatre principales causes d'APVP chez les hommes étaient l'insuffisance coronarienne, le suicide, les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et le cancer du poumon.

- Le nombre d'APVP attribuables aux quatre principales causes de décès était plus élevé chez les Néo-Brunswickois que chez les Canadiens.

NOTES POUR LE TABLEAU 7B

Le **tableau 7b** indique le nombre d'années potentielles de vie perdues (APVP) attribuables aux quinze principales causes de décès chez les femmes dans les dix provinces et dans l'ensemble du Canada, de 1994 à 1997.

- Chez les femmes, le classement des quatre principales causes d'APVP était différent au Nouveau-Brunswick et au Canada.

- Chez les Néo-Brunswickoises, les quatre principales causes d'APVP ont été le cancer du sein, l'insuffisance coronarienne, le cancer du poumon et les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur.

- Chez les Canadiennes, les quatre principales causes d'APVP ont été le cancer du sein, le cancer du poumon, l'insuffisance coronarienne et la mortalité périnatale.

- Le nombre d'APVP attribuables à l'insuffisance coronarienne, au cancer du poumon, et aux accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur était plus élevé chez les Néo-Brunswickoises que chez les Canadiennes. Le nombre d'APVP, attribuables au cancer du sein, était plus élevé chez les Canadiennes que chez les Néo-Brunswickoises.

Tableau 7a **Nombre d'années potentielles de vie perdues, par 100 000 habitants, selon les principales causes de décès HOMMES de moins de 75 ans, Canada, provinces et territoires : 1994 - 1997**

RANG (N.-B.)	CAUSE	CANADA	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	ONT.	MAN.	SASK.	ALB.	C.-B.
	TOUTES LES CAUSES	7373	7533	7611	7392	7578	7831	6793	7876	8169	7390	7519
1	Insuffisance coronarienne	942	1316	1152	1097	944	1046	925	1011	988	892	698
2	Suicide	725	455	607	644	823	1092	488	671	838	887	578
3	Accidents de la circulation	549	390	877	637	612	593	426	598	757	696	608
4	Cancer du poumon	498	594	522	564	591	682	433	454	412	369	393
5	Mortalité périnatale	317	396	189	303	191	286	341	354	420	326	262
6	VIH	292	105	71	154	138	372	296	135	95	181	403
7	Malformations congénitales	264	354	139	211	284	267	252	309	450	276	223
8	Cancer colorectal	186	224	205	214	201	201	190	184	178	158	150
9	Accident vasculaire cérébral	170	231	276	167	192	174	165	201	153	152	168
10	Cirrhose/maladie du foie	142	114	69	107	111	128	165	120	150	138	135
11	Cancer lymphoïde	122	96	143	139	154	128	125	150	155	101	98
12	Cancer de l'encéphale	96	94	44	113	91	106	92	85	109	90	95
13	Homicide	92	44	45	92	82	93	77	136	148	113	103
14	M.P.O.C.	90	120	93	100	118	121	75	76	77	85	72
15	Leucémie	84	66	95	76	75	90	87	84	87	87	71

Remarque 2 : En raison d'une modification de la population de base utilisée pour l'étalonnage, les taux ne sont pas comparables à ceux des rapports précédents.

Source : Statistique Canada, Division des statistiques sur la santé

Tableau 7b Nombre d'années potentielles de vie perdues, par 100 000 habitants, selon les principales causes de décès FEMMES de moins de 75 ans, Canada, provinces et territoires : 1994 - 1997

RANG (N.-B.)	CAUSE	CANADA	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	ONT.	MAN.	SASK.	ALB.	C.-B.
	TOUTES LES CAUSES	4109	4298	3901	4371	4059	4142	3901	4752	4672	4286	4016
1	Cancer du sein	348	355	325	357	338	358	352	367	307	358	315
2	Cancer du poumon	306	238	478	361	316	370	266	352	304	273	293
3	Insuffisance coronarienne	277	438	252	339	324	303	273	308	269	275	190
4	Mortalité périnatale	263	315	295	240	217	243	263	315	328	268	267
5	Accidents de la circulation	229	121	195	233	271	237	189	236	384	279	253
6	Malformations congénitales	224	405	364	216	181	228	220	220	284	238	180
7	Suicide	182	70	120	122	129	273	136	164	191	233	138
8	Accident vasculaire cérébral	135	150	129	130	113	141	129	183	154	142	119
9	Cancer colorectal	131	230	133	172	138	146	128	122	102	98	113
10	Cancer de l'ovaire	83	74	62	83	85	80	85	94	87	80	83
11	Cancer lymphoïde	78	67	65	75	83	77	86	95	75	71	62
12	Cancer de l'encéphale	64	59	39	58	67	68	65	61	71	56	58
13	Cirrhose/maladie du foie	62	35	12	52	45	48	65	73	103	69	78
14	Leucémie	58	77	27	78	46	60	58	63	71	58	50
15	M.P.O.C.	54	54	33	70	75	65	48	40	58	53	46

Remarque 2 : En raison d'une modification de la population de base utilisée pour l'étalonnage, les taux ne sont pas comparables à ceux des rapports précédents.

Source : Statistique Canada, Division des statistiques sur la santé

Chapitre 4

Mortalité au sein de la Population

Faits saillants

Le chapitre qui suit présente un résumé des statistiques sur les décès survenus au Nouveau-Brunswick ainsi que les tendances de la mortalité pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- De 1991 à 1998, les taux comparatifs de mortalité, quelle que soit la cause du décès, sont restés relativement stables chez les hommes, mais ils ont augmenté de 4,0% chez les femmes (Figure 14).

- Les maladies de l'appareil circulatoire ont été la principale cause de décès au Nouveau-Brunswick.

- De 1994 à 1998, les quatre principales causes de décès au Nouveau-Brunswick ont été les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs malignes, les maladies de l'appareil respiratoire, et enfin les causes extérieures de lésions traumatiques et les empoisonnements.

- Environ 38,4% de tous les décès ont été attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire et environ 28,1% ont été attribuables aux tumeurs malignes.

- De 1994 à 1998, le nombre de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire a connu une baisse d'environ 2%, alors que le nombre de décès attribuables aux tumeurs malignes a augmenté d'environ 11,3%.

- Chez les hommes, les cardiopathies ischémiques (CI) ont été responsables de la plus grande proportion des décès survenus de 1994 à 1998. Venaient ensuite la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les maladies vasculaires cérébrales.

- Chez les femmes, les cardiopathies ischémiques (CI) ont été la cause de la plus grande proportion des décès survenus de 1994 à 1998. Venaient ensuite les maladies vasculaires cérébrales, la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon et la tumeur maligne du sein.

NOTES POUR LA FIGURE 14

La **figure 14** montre les Taux de mortalité, par âge, par 10 000 habitants, quelle que soit la cause du décès, chez les hommes et les femmes, au Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1991 à 1998.

- Les Taux de mortalité par âge chez les hommes sont restés relativement stables au cours de la période de huit ans étudiée, sauf pour l'année 1997 où ils ont diminué d'environ 7%.

- Les Taux de mortalité par âge chez les femmes ont connu une augmentation moyenne d'environ 4% au cours de cette période de huit ans.

Figure 14 Taux comparatifs de mortalité par âge, par 10 000 habitants, quelle que soit la cause du décès selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1991-1998



Taux de mortalité, par âge, par rapport à la population du Canada en 1996
Source : Statistique Canada, catalogue n° 82-221-XD.

NOTES POUR LE TABLEAU 8

Le **tableau 8** donne le nombre total de décès selon les dix-sept principales catégories de maladies (codes de la CIM-9[2]), dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Conformément aux tendances mentionnées dans les rapports précédents de 1994 à 1998, les quatre principales causes de décès au Nouveau-Brunswick ont été, par ordre d'importance :

    1. les maladies de l'appareil circulatoire;
    2. les tumeurs malignes;
    3. les maladies de l'appareil respiratoire; et,
    4. les causes extérieures de lésions traumatiques et les empoisonnements.

Nord et Sud

- Les maladies de l'appareil circulatoire ont été responsables d'un pourcentage légèrement plus élevé de décès dans le Sud (moyenne de cinq ans = 41%) que dans le Nord (moyenne de cinq ans = 38%).

- Les tumeurs malignes et les maladies de l'appareil respiratoire ont été responsables d'un pourcentage presque identique de décès dans le Nord (28% dans les deux cas) et dans le Sud de la province (27% dans les deux cas).

- Les causes extérieures de lésions traumatiques et les empoisonnements ont été responsables d'un pourcentage de décès légèrement plus élevé dans le Sud (moyenne de cinq ans = 7,0%) que dans le Nord (moyenne de cinq ans = 5,9%) au cours de cette même période.

---

[2] **Classification internationale des maladies, 1975**

Tableau 8 Nombre total de décès attribuables aux dix-sept principales catégories de maladies (codes de la CIM-9) dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, : 1994-1998

Classification des maladies	Lieu	1994	1995	1996	1997	1998
Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	Nord	19	19	14	12	16
	Sud	27	46	43	33	34
	Province	46	65	57	45	50
Tumeurs (140-239)	Nord	482	458	523	500	536
	Sud	1 104	1 212	1 123	1 159	1 229
	Province	1 586	1 670	1 646	1 659	1 765
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du metabolisme et troubles immunitaires (240-279)	Nord	46	50	78	94	73
	Sud	130	142	149	154	170
	Province	176	192	227	248	243
Maladies du sang et des organes hematopoietiques (280-289)	Nord	7	7	14	9	10
	Sud	18	12	16	14	17
	Province	25	19	30	23	27
Troubles mentaux (290-319)	Nord	39	43	37	32	48
	Sud	80	89	94	99	140
	Province	119	132	131	141	188
Maladies du systeme nerveux et des organes des sens (320-389)	Nord	51	54	43	50	55
	Sud	111	142	136	133	150
	Province	162	196	179	183	205
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	Nord	647	611	598	608	615
	Sud	1 689	1 664	1 606	1 642	1 684
	Province	2 336	2 275	2 204	2 250	2 299
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	Nord	166	121	138	145	167
	Sud	372	361	394	365	418
	Province	538	482	532	510	585
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	Nord	61	48	46	51	73
	Sud	139	140	133	151	156
	Province	200	188	179	202	229
Maladies des organes genito-urinaires (580-629)	Nord	29	31	30	35	38
	Sud	78	56	80	66	82
	Province	107	87	110	101	120
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)	Nord	0	0	0	0	1
	Sud	0	2	0	0	1
	Province	0	2	0	0	2
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutane (680-709)	Nord	0	2	1	0	3
	Sud	2	3	11	5	4
	Province	2	5	12	5	7
Maladies du systeme osteo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710-739)	Nord	10	15	7	7	12
	Sud	18	16	18	16	12
	Province	28	31	25	23	24
Anomalies congenitales (740-759)	Nord	3	4	5	4	4
	Sud	13	13	15	13	10
	Province	16	17	20	17	14
Certaines affections dont l'origine se situe dans la periode perinatale (760-779)	Nord	10	5	7	2	5
	Sud	10	6	4	14	17
	Province	20	11	11	16	24
Symptomes, signes et etats morbides mal definis (780-799)	Nord	38	25	27	17	24
	Sud	51	76	102	75	81
	Province	89	107	129	92	105
Lesions traumatiques et empoisonnements (800-999)	Nord	120	110	124	111	114
	Sud	243	221	204	238	228
	Province	363	331	328	349	343
TOTAL DE TOUTES LES CAUSES	Nord	1 711	1 630	1 692	1 687	1 797
	Sud	4 102	4 214	4 128	4 177	4 433
	Province	5 813	5 864	5 820	5 864	6 230

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques sur l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 8 **Nombre total de décès attribuables aux dix-sept principales catégories de maladies (codes de la CIM-9) dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, : 1994-1998**

Classification des maladies	Lieu	1994	1995	1996	1997	1998
Maladies infectieuses et, parasitaires (001-139)	Nord	19	19	14	12	16
	Sud	27	46	43	33	34
	Province	46	65	57	45	50
Tumeurs (140-239)	Nord	482	458	523	500	536
	Sud	1 104	1 212	1 123	1 159	1 229
	Province	1 586	1 670	1 646	1 659	1 765
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et 1# troubles immunitaires (240-279)	Nord	46	50	78	94	73
	Sud	130	142	149	154	170
	Province	176	192	227	248	243
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	Nord	7	7	14	9	10
	Sud	18	12	16	14	17
	Province	25	19	30	23	27
Troubles mentaux (290-319)	Nord	39	43	37	42	48
	Sud	80	89	94	99	140
	Province	119	132	131	141	188
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	Nord	51	54	43	50	55
	Sud	111	142	136	133	150
	Province	162	196	179	183	205
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	Nord	647	611	598	608	615
	Sud	1 689	1 664	1 606	1 642	1 684
	Province	2 336	2 275	2 204	2 250	2 299
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	Nord	166	121	138	145	167
	Sud	372	361	394	365	418
	Province	538	482	532	510	585
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	Nord	61	48	46	51	73
	Sud	139	140	133	151	156
	Province	200	188	179	202	229
Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	Nord	29	31	30	35	38
	Sud	78	56	80	66	82
	Province	107	87	110	101	120
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)	Nord	0	0	0	0	1
	Sud	0	2	0	0	1
	Province	0	2	0	0	2
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-709)	Nord	0	2	1	0	3
	Sud	2	3	11	5	4
	Province	2	5	12	5	7
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710-739)	Nord	10	15	7	7	12
	Sud	18	16	18	16	12
	Province	28	31	25	23	24
Anomalies congénitales (740-759)	Nord	5	4	5	4	4
	Sud	11	13	15	13	10
	Province	16	17	20	17	14
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)	Nord	10	2	7	2	7
	Sud	10	9	4	14	17
	Province	20	11	11	16	24
Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	Nord	19	25	27	17	24
	Sud	70	76	102	75	81
	Province	89	107	129	92	105
Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)	Nord	120	160	124	111	115
	Sud	243	231	204	238	228
	Province	363	391	328	349	343
TOTAL DE TOUTES LES CAUSES	Nord	1 711	1 650	1 692	1 687	1 797
	Sud	4 102	4 214	4 128	4 177	4 433
	Province	5 813	5 864	5 820	5 864	6 230

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques sur l'état civil du N.-B., 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 15

La **figure 15** montre le pourcentage moyen de décès attribuables aux principales causes chez les hommes et les femmes du Nouveau-Brunswick au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs malignes (cancers) ont été la cause d'environ les deux tiers (66%) de tous les décès chez les hommes et les femmes.

- La différence la plus importante entre les hommes et les femmes s'est trouvée dans la catégorie des tumeurs malignes qui ont été la cause d'environ 34,4% de tous les décès chez les hommes, mais de seulement 20% de tous les décès chez les femmes.

Figure 15 Pourcentage de décès selon les principales causes et le sexe, moyenne de cinq ans, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LA FIGURE 16

La **figure 16** montre le pourcentage de décès attribuables aux quatre principales causes de décès au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, on a constaté une tendance constante à la baisse du pourcentage de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire et une légère augmentation du pourcentage de décès attribuables aux tumeurs malignes.

- Le pourcentage de décès attribuables aux maladies de l'appareil respiratoire ainsi qu'aux lésions traumatiques et aux empoisonnements est demeuré relativement stable au cours de cette période.

Figure 16 Pourcentage de décès selon les principales causes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LA FIGURE 17

La **figure 17** montre le pourcentage de décès selon les quatre principales causes, chez les hommes et les femmes, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- À l'exception des maladies de l'appareil circulatoire, on n'a observé aucune différence importante entre les tendances chez les hommes et les femmes.
- De 1994 à 1998, le pourcentage de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire a diminué graduellement chez les hommes, passant de 36% à 33%, alors qu'il a augmenté chez les femmes, passant de 45% à 49%.

Figure 17 Pourcentage de décès selon les principales causes et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS SELON L'ÂGE ET LE SEXE

NOTES POUR LA FIGURE 18

La **figure 18** montre le nombre moyen de décès par année selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Dans le groupe d'âge de la naissance à un an, les principales causes de décès chez les enfants des deux sexes ont été certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale et les anomalies congénitales.

- Dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans, les principales causes de décès chez les enfants des deux sexes ont été les lésions traumatiques et les empoisonnements, puis les tumeurs malignes.

- Dans les groupes d'âge des 5 à 14 ans et des 15 à 24 ans, la principale cause de décès chez les jeunes des deux sexes a été les lésions traumatiques et les empoisonnements.

- Dans le groupe d'âge des 25 à 44 ans, les principales causes de décès ont été les lésions traumatiques et les empoisonnements chez les hommes et les tumeurs malignes chez les femmes.

- Dans le groupe d'âge des 45 à 64 ans, les tumeurs malignes ont constitué la principale cause de décès, tant chez les hommes que chez les femmes, suivies des maladies de l'appareil circulatoire qui étaient toutefois plus importantes chez les hommes.

- Dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, les maladies de l'appareil circulatoire, suivies des tumeurs malignes et des maladies de l'appareil respiratoire, ont constitué les principales causes de décès tant chez les hommes que chez les femmes.

- La répartition des principales causes de décès au sein de chaque groupe d'âge considéré dans le présent rapport est conforme aux tendances observées dans les précédents rapports sur *L'état de santé des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises*. Les tumeurs malignes sont demeurées la principale cause de décès chez les hommes du groupe d'âge des 45 à 64 ans.

Figure 18 **Nombre moyen de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



Figure 18 (suite) **Nombre moyen de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Figure 18 (suite) **Nombre moyen de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Figure 18 (suite) **Nombre moyen de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LE TABLEAU 9

Le tableau 9 indique la répartition du nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, pour chacune des années de la période de 1994 à 1998.

Tableau 9 Nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

0 - 1 an

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	
Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale :											
. Affections respiratoires	5	6	3	2	2	2	2	2	6	4	34
. Troubles maternels et complications du travail	1	1	1	0	3	0	1	2	3	2	14
. Immaturité et prématurité	1	3	0	3	0	0	0	2	4	1	14
Anomalies congénitales	4	4	5	4	4	3	5	1	4	3	37
Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	3	2	2	5	6	3	3	2	3	1	30
Maladies infectieuses et, parasitaires	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lésions traumatiques et empoisonnements	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
Toutes les autres causes	0	4	4	1	3	3	4	4	5	1	29
Nombre total de décès	16	20	16	15	18	12	16	15	26	12	166

1 - 4 ans

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	
Lésions traumatiques et empoisonnements	1	1	0	0	1	2	2	2	2	0	11
Tumeurs malignes	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	6
Anomalies congénitales	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Maladies de l'appareil digestif	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Toutes les autres causes	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Nombre total de décès	5	3	3	1	2	2	5	2	3	3	29

Tableau 9 (suite) **Nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

5 - 14 ans

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	
Lésions traumatiques et empoisonnements	5	1	11	1	6	3	6	3	5	1	42
Tumeurs malignes	2	0	1	0	0	0	2	2	0	1	8
Maladies de l'appareil circulatoire	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Anomalies congénitales	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Maladies de l'appareil respiratoire	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Toutes les autres causes	1	0	0	0	2	2	0	0	0	2	7
Nombre total de décès	10	2	13	1	8	6	9	5	5	5	64

15 - 24 ans

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Lésions traumatiques et empoisonnements	54	10	31	10	41	10	39	14	36	8	253
Tumeurs malignes	0	2	4	0	5	1	4	3	5	1	25
Maladies de l'appareil circulatoire	2	2	0	2	0	3	0	1	1	0	11
Anomalies congénitales	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	5
Maladies de l'appareil digestif	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Toutes les autres causes	1	2	2	0	4	1	1	3	2	2	16
Nombre total de décès	57	18	37	13	51	16	46	21	44	12	314

Tableau 9 (suite) **Nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

25 - 44 ans

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Lésions traumatiques et empoisonnements	87	22	107	14	81	9	84	17	74	17	512
Tumeurs malignes	20	42	25	37	21	37	32	28	19	36	297
Maladies de l'appareil circulatoire	25	10	32	11	22	13	19	9	22	9	172
Maladies de l'appareil digestif	3	3	2	1	2	0	5	1	5	0	22
Maladies de l'appareil respiratoire	1	4	1	4	2	1	1	2	0	4	20
Toutes les autres causes	7	9	9	5	13	7	14	15	11	9	99
Nombre total de décès	143	90	176	72	141	67	157	72	131	75	1 122

45 - 64 ans

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Tumeurs malignes	204	185	245	171	214	181	224	162	211	178	1 975
Maladies de l'appareil circulatoire	178	58	202	52	174	81	172	59	169	63	1 208
Lésions traumatiques et empoisonnements	59	17	62	18	57	20	55	12	53	23	376
Maladies de l'appareil respiratoire	27	18	28	22	16	19	16	14	16	18	194
Maladies de l'appareil digestif	11	11	28	12	23	2	22	15	18	12	167
Toutes les autres causes	26	29	31	23	40	18	34	23	33	15	272
Nombre total de décès	515	318	596	298	527	321	523	285	500	309	4 192

Tableau 9 (suite) **Nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

65 ans et plus

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Maladies de l'appareil circulatoire	976	1 045	936	1 004	917	968	889	1 077	941	1 041	9 794
Tumeurs malignes	620	485	669	486	637	511	640	525	731	540	5 844
Maladies de l'appareil respiratoire	277	210	239	190	272	229	243	230	308	234	2 432
Maladies de l'appareil digestif	73	87	82	64	68	78	72	86	92	96	801
Lesions traumatiques et empoisonnements	81	54	60	57	58	57	69	51	67	55	609
Toutes les autres causes	220	291	229	326	228	342	220	300	280	392	2 828
Nombre total de décès	2247	2172	2215	2127	2180	2185	2133	2272	2419	2358	22 308

Tableau 9 (suite) **Nombre de décès selon les principales causes, le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

65 ans et plus

PRINCIPALES CAUSES	1994		1995		1996		1997		1998		Total, 5 ans
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Maladies de l'appareil circulatoire	976	1 045	936	1 004	917	968	889	1 077	941	1 041	9 794
Tumeurs malignes	620	485	669	486	637	511	640	525	731	540	5 844
Maladies de l'appareil respiratoire	277	210	239	190	272	229	243	230	308	234	2 432
Maladies de l'appareil digestif	73	87	82	64	68	78	72	86	92	96	801
Lésions traumatiques et empoisonnements	81	54	60	57	58	57	69	51	67	55	609
Toutes les autres causes	220	291	229	326	228	342	220	300	280	392	2 828
Nombre total de décès	2247	2172	2215	2127	2180	2185	2133	2272	2419	2358	22 308

TAUX PROPORTIONNEL DE MORTALITÉ ET TAUX BRUT DE MORTALITÉ

NOTES POUR LA FIGURE 19

La **figure 19** montre le taux proportionnel de mortalité (TPM) moyen selon les principales causes de décès chez les hommes et les femmes dans le Nord et le Sud de la province, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Chez les **hommes**, pour les cardiopathies ischémiques et pour les maladies vasculaires cérébrales, le taux proportionnel de mortalité a été légèrement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province, tandis que pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les affections connexes, pour le suicide, pour la tumeur maligne de la prostate et pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur, le taux proportionnel de mortalité a été légèrement plus élevé dans le Nord.

- Chez les **femmes**, pour les cardiopathies ischémiques, pour les maladies vasculaires cérébrales, pour la tumeur maligne du sein, pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les affections connexes, et pour la tumeur maligne du côlon, le taux proportionnel de mortalité a été légèrement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province. Pour le diabète sucré et pour la tumeur maligne du pancréas, le taux proportionnel de mortalité a été légèrement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

NOTES POUR LE TABLEAU 10

Le **tableau 10** montre le taux brut de mortalité (TBM), par 10 000 hommes, et le taux proportionnel de mortalité (TPM) pour certaines catégories de diagnostics chez les hommes dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, les cardiopathies ischémiques (CI) ont causé la plus grande proportion de décès chez les hommes.

- La deuxième cause de décès chez les hommes a été la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon. Ont suivi les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les maladies vasculaires cérébrales.

NOTES POUR LE TABLEAU 11

Le **tableau 11** montre le taux brut de mortalité (TBM), par 10 000 femmes, et le taux proportionnel de mortalité (TPM) pour certaines catégories de diagnostics dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, les cardiopathies ischémiques (CI) ont causé la plus grande proportion de décès chez les femmes.

- La deuxième cause de décès chez les femmes a été les maladies vasculaires cérébrales. Ont suivi la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon et la tumeur maligne du sein.

Figure 19 **Taux proportionnel de mortalité (TPM) moyen selon les principales causes de décès, le sexe et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

Hommes



Codes de la CIM-9

410-414	Cardiopathies ischémiques	185	Tumeur maligne de la prostate
162	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	250	Diabète sucré
430-438	Maladies vasculaires cérébrales	E950-959	Suicide
490-496	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	480-487	Pneumonie et grippe
		E810-819	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur

Figure 19 **Taux proportionnel de mortalité (TPM) moyen selon les principales causes de décès, le sexe et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

Femmes



Codes de la CIM-9

410-414	Cardiopathies ischémiques	490-496	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
430-438	Maladies vasculaires cérébrales	480-487	Pneumonie et grippe
174	Tumeur maligne du sein	250	Diabète sucré
162	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	153	Tumeur maligne du côlon
		157	Tumeur maligne du pancréas

Tableau 10 Taux brut de mortalité, par 10 000 hommes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les *HOMMES* dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Nombre total de décès					Taux brut de mortalité (TBM) par 10 000 hommes					Taux proportionnel de mortalité (TPM) en %				
Catégorie de diagnostic	**Lieu**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Tumeur maligne de	Sud	15	15	24	15	20	0,59	0,58	0,93	0,58	0,77	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
l'estomac	Nord	11	17	23	14	18	0,95	1,48	2,01	1,23	1,59	0,6	1,0	1,4	0,8	1,0
(CIM-9 : 151)	Province	26	32	47	29	38	0,70	0,86	1,26	0,78	1,02	0,4	0,5	0,8	0,5	0,6
Tumeur maligne du côlon	Sud	39	46	44	42	33	1,52	1,79	1,70	1,61	1,27	1,0	1,1	1,1	1,0	0,7
(CIM-9 : 153)	Nord	13	17	18	17	19	1,12	1,48	1,57	1,50	1,68	0,8	1,0	1,4	0,8	1,1
	Province	52	63	62	59	52	1,40	1,69	1,66	1,58	1,39	0,9	1,1	1,1	1,0	0,8
Tumeur maligne du pancréas	Sud	30	40	20	19	34	1,17	1,55	0,77	0,73	1,30	0,7	0,9	0,5	0,5	0,8
(CIM-9 : 157)	Nord	9	16	20	14	13	0,78	1,39	1,75	1,23	1,15	0,5	1,0	1,2	0,8	0,7
	Province	39	56	40	33	47	1,05	1,50	1,07	0,88	1,26	0,7	1,0	0,7	0,6	0,8
Tumeur maligne de la trachée,	Sud	214	210	209	213	223	8,36	8,16	8,08	8,18	8,55	5,2	5,0	5,1	5,1	5,0
des bronches et du poumon	Nord	111	86	97	107	106	9,60	7,47	8,48	9,43	9,37	6,5	5,2	5,7	6,3	5,9
(CIM-9 : 162)	Province	325	296	306	320	329	8,74	7,94	8,20	8,56	8,80	5,6	5,0	5,3	5,5	5,3
Tumeur maligne de la prostate	Sud	69	69	72	70	90	2,69	2,68	2,78	2,69	3,45	1,7	1,6	1,7	1,7	2,0
(CIM-9 : 185)	Nord	32	32	22	33	41	2,77	2,78	1,92	2,91	3,62	1,9	1,9	1,3	2,0	2,3
	Province	101	101	94	103	131	2,72	2,71	2,52	2,76	3,50	1,7	1,7	1,6	1,8	2,1
Diabète sucré	Sud	50	49	61	69	67	1,95	1,90	2,36	2,65	3,45	1,2	1,2	1,5	1,7	1,5
(CIM-9 : 250)	Nord	13	19	31	29	31	1,12	1,65	2,71	2,56	2,74	0,8	1,2	1,8	1,7	1,7
	Province	63	68	92	98	98	1,69	1,83	2,47	2,62	2,62	1,1	1,2	1,6	1,8	2,1
Cardiopathies ischémiques	Sud	483	453	415	431	471	18,86	17,60	16,04	16,56	18,07	11,8	10,7	10,1	10,3	10,6
(CIM-9 : 410-414)	Nord	175	176	171	151	180	15,13	15,28	14,94	13,31	15,91	10,2	10,7	10,1	9,0	10,0
	Province	658	629	596	582	651	17,70	16,88	15,71	15,57	17,41	11,3	10,7	10,1	9,9	10,4
Maladies vasculaires cérébrales	Sud	126	149	132	122	125	4,92	5,79	5,10	4,69	4,79	3,1	3,5	3,2	2,9	2,8
(CIM-9 : 430-438)	Nord	46	49	47	51	47	3,98	4,25	4,11	4,49	4,15	2,7	3,0	2,8	3,0	2,6
	Province	172	198	179	173	172	4,63	5,31	4,80	4,63	4,60	3,0	3,4	3,1	3,0	2,8
Pneumonie et grippe	Sud	55	48	51	64	62	2,15	1,86	1,97	2,46	2,38	1,3	1,1	1,2	1,5	1,4
(CIM-9 : 480-487)	Nord	22	13	15	16	27	1,90	1,13	1,31	1,41	2,39	1,3	0,8	0,9	0,9	1,5
	Province	77	61	66	80	89	2,07	1,64	1,77	2,14	2,38	1,3	1,0	1,1	1,4	1,4
Maladies pulmonaires obst.	Sud	130	122	139	99	133	5,08	4,74	5,37	3,80	5,10	3,2	2,9	3,4	2,4	3,0
chroniques et affections	Nord	73	50	48	52	71	6,31	4,34	4,19	4,58	6,27	4,3	3,0	2,8	3,1	4,0
connexes (CIM-9 : 490-496)	Province	203	172	187	151	204	5,46	4,62	5,01	4,04	5,46	3,5	2,9	3,2	2,6	3,3
Maladies chroniques et	Sud	22	18	16	15	21	0,86	0,70	0,62	0,58	0,81	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
cirrhose du foie	Nord	9	13	7	9	9	0,78	1,13	0,61	0,79	0,80	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5
(CIM-9 : 571)	Province	31	31	23	24	30	0,83	0,83	0,62	0,64	0,80	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Accidents de la circulation	Sud	36	40	36	42	42	1,41	1,55	1,39	1,61	1,61	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
impliquant des véhicules	Nord	17	25	17	20	12	1,47	2,17	1,49	1,76	1,06	1,0	1,5	1,0	1,2	0,7
à moteur (CIM-9 : E810-E819)	Province	53	65	53	62	54	1,43	1,74	1,42	1,66	1,44	0,9	1,1	0,9	1,1	0,9
Suicide	Sud	48	57	43	51	56	1,87	2,21	1,66	1,96	2,15	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3
(CIM-9 : E950-E959)	Nord	38	51	35	27	32	3,29	4,43	3,06	2,38	2,83	2,2	3,1	2,1	1,6	1,8
	Province	86	108	78	78	88	2,31	2,90	2,09	2,09	2,35	1,5	1,8	1,3	1,3	1,4

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 10 Taux brut de mortalité, par 10 000 hommes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les *HOMMES* dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Nombre total de décès					Taux brut de mortalité (TBM) par 10 000 hommes					Taux proportionnel de mortalité (TPM) en %				
Catégorie de diagnostic	Lieu	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Tumeur maligne de	Sud	15	15	24	15	20	0,59	0,58	0,93	0,58	0,77	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
l'estomac	Nord	11	17	23	14	18	0,95	1,48	2,01	1,23	1,59	0,6	1,0	1,4	0,8	1,0
(CIM-9 : 151)	Province	26	32	47	29	38	0,70	0,86	1,26	0,78	1,02	0,4	0,5	0,8	0,5	0,6
Tumeur maligne du côlon	Sud	39	46	44	42	33	1,52	1,79	1,70	1,61	1,27	1,0	1,1	1,1	1,0	0,7
(CIM-9 : 153)	Nord	13	17	18	17	19	1,12	1,48	1,57	1,50	1,68	0,8	1,0	1,4	0,8	1,1
	Province	52	63	62	59	52	1,40	1,69	1,66	1,58	1,39	0,9	1,1	1,1	1,0	0,8
Tumeur maligne du pancréas	Sud	30	40	20	19	34	1,17	1,55	0,77	0,73	1,30	0,7	0,9	0,5	0,5	0,8
(CIM-9 : 157)	Nord	9	16	20	14	13	0,78	1,39	1,75	1,23	1,15	0,5	1,0	1,2	0,8	0,7
	Province	39	56	40	33	47	1,05	1,50	1,07	0,88	1,26	0,7	1,0	0,7	0,6	0,8
Tumeur maligne de la trachée,	**Sud**	**214**	**210**	**209**	**213**	**223**	**8,36**	**8,16**	**8,08**	**8,18**	**8,55**	**5,2**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,0**
des bronches et du poumon	**Nord**	**111**	**86**	**97**	**107**	**106**	**9,60**	**7,47**	**8,48**	**9,43**	**9,37**	**6,5**	**5,2**	**5,7**	**6,3**	**5,9**
(CIM-9 : 162)	**Province**	**325**	**296**	**306**	**320**	**329**	**8,74**	**7,94**	**8,20**	**8,56**	**8,80**	**5,6**	**5,0**	**5,3**	**5,5**	**5,3**
Tumeur maligne de la prostate	Sud	69	69	72	70	90	2,69	2,68	2,78	2,69	3,45	1,7	1,6	1,7	1,7	2,0
(CIM-9 : 185)	Nord	32	32	22	33	41	2,77	2,78	1,92	2,91	3,62	1,9	1,9	1,3	2,0	2,3
	Province	101	101	94	103	131	2,72	2,71	2,52	2,76	3,50	1,7	1,7	1,6	1,8	2,1
Diabète sucré	Sud	50	49	61	69	67	1,95	1,90	2,36	2,65	3,45	1,2	1,2	1,5	1,7	1,5
(CIM-9 : 250)	Nord	13	19	31	29	31	1,12	1,65	2,71	2,56	2,74	0,8	1,2	1,8	1,7	1,7
	Province	63	68	92	98	98	1,69	1,83	2,47	2,62	2,62	1,1	1,2	1,6	1,8	2,1
Cardiopathies ischémiques	**Sud**	**483**	**453**	**415**	**431**	**471**	**18,86**	**17,60**	**16,04**	**16,56**	**18,07**	**11,8**	**10,7**	**10,1**	**10,3**	**10,6**
(CIM-9 : 410-414)	**Nord**	**175**	**176**	**171**	**151**	**180**	**15,13**	**15,28**	**14,94**	**13,31**	**15,91**	**10,2**	**10,7**	**10,1**	**9,0**	**10,0**
	Province	**658**	**629**	**596**	**582**	**651**	**17,70**	**16,88**	**15,71**	**15,57**	**17,41**	**11,3**	**10,7**	**10,1**	**9,9**	**10,4**
Maladies vasculaires cérébrales	**Sud**	**126**	**149**	**132**	**122**	**125**	**4,92**	**5,79**	**5,10**	**4,69**	**4,79**	**3,1**	**3,5**	**3,2**	**2,9**	**2,8**
(CIM-9 : 430-438)	**Nord**	**46**	**49**	**47**	**51**	**47**	**3,98**	**4,25**	**4,11**	**4,49**	**4,15**	**2,7**	**3,0**	**2,8**	**3,0**	**2,6**
	Province	**172**	**198**	**179**	**173**	**172**	**4,63**	**5,31**	**4,80**	**4,63**	**4,60**	**3,0**	**3,4**	**3,1**	**3,0**	**2,8**
Pneumonie et grippe	Sud	55	48	51	64	62	2,15	1,86	1,97	2,46	2,38	1,3	1,1	1,2	1,5	1,4
(CIM-9 : 480-487)	Nord	22	13	15	16	27	1,90	1,13	1,31	1,41	2,39	1,3	0,8	0,9	0,9	1,5
	Province	77	61	66	80	89	2,07	1,64	1,77	2,14	2,38	1,3	1,0	1,1	1,4	1,4
Maladies pulmonaires obst.	**Sud**	**130**	**122**	**139**	**99**	**133**	**5,08**	**4,74**	**5,37**	**3,80**	**5,10**	**3,2**	**2,9**	**3,4**	**2,4**	**3,0**
chroniques et affections	**Nord**	**73**	**50**	**48**	**52**	**71**	**6,31**	**4,34**	**4,19**	**4,58**	**6,27**	**4,3**	**3,0**	**2,8**	**3,1**	**4,0**
connexes (CIM-9 : 490-496)	**Province**	**203**	**172**	**187**	**151**	**204**	**5,46**	**4,62**	**5,01**	**4,04**	**5,46**	**3,5**	**2,9**	**3,2**	**2,6**	**3,3**
Maladies chroniques et	Sud	22	18	16	15	21	0,86	0,70	0,62	0,58	0,81	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
cirrhose du foie	Nord	9	13	7	9	9	0,78	1,13	0,61	0,79	0,80	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5
(CIM-9 : 571)	Province	31	31	23	24	30	0,83	0,83	0,62	0,64	0,80	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Accidents de la circulation	Sud	36	40	36	42	42	1,41	1,55	1,39	1,61	1,61	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
impliquant des véhicules	Nord	17	25	17	20	12	1,47	2,17	1,49	1,76	1,06	1,0	1,5	1,0	1,2	0,7
à moteur (CIM-9 : E810-E819)	Province	53	65	53	62	54	1,43	1,74	1,42	1,66	1,44	0,9	1,1	0,9	1,1	0,9
Suicide	Sud	48	57	43	51	56	1,87	2,21	1,66	1,96	2,15	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3
(CIM-9 : E950-E959)	Nord	38	51	35	27	32	3,29	4,43	3,06	2,38	2,83	2,2	3,1	2,1	1,6	1,8
	Province	86	108	78	78	88	2,31	2,90	2,09	2,09	2,35	1,5	1,8	1,3	1,3	1,4

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 11 Taux brut de mortalité, par 10 000 femmes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les *FEMMES* dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Nombre total de décès					Taux brut de mortalité (TBM) par 10 000 femmes					Taux proportionnel de mortalité (TPM) en %				
Catégorie de diagnostic	**Lieu**	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Tumeur maligne de l'estomac (CIM-9 : 151)	Sud	18	17	10	9	7	0,68	0,64	0,38	0,34	0,26	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
	Nord	7	9	12	7	9	0,61	0,79	1,05	0,62	0,79	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5
	Province	25	26	22	16	16	0,66	0,69	0,58	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Tumeur maligne du côlon (CIM-9 : 153)	Sud	43	36	39	44	47	1,64	1,37	1,47	1,66	1,76	1,0	0,9	0,9	1,1	1,1
	Nord	12	8	12	16	13	1,04	0,70	1,05	1,41	1,15	0,7	0,5	0,7	0,9	0,7
	Province	55	44	51	60	60	1,46	1,00	1,35	1,58	1,58	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0
Tumeur maligne du pancréas (CIM-9 : 157)	Sud	41	27	27	33	28	1,56	1,02	1,02	1,24	1,05	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6
	Nord	15	11	16	14	11	1,30	0,96	1,41	1,23	0,97	0,9	0,7	0,9	0,8	0,6
	Province	56	38	43	47	39	1,48	1,00	1,14	1,24	1,03	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (CIM-9 : 162)	**Sud**	**100**	**111**	**109**	**101**	**125**	**3,81**	**4,21**	**4,12**	**3,80**	**4,69**	**2,4**	**2,6**	**2,6**	**2,4**	**2,8**
	Nord	**41**	**30**	**40**	**33**	**42**	**3,57**	**2,62**	**3,51**	**2,91**	**3,71**	**2,4**	**1,8**	**2,4**	**2,0**	**2,3**
	Province	**141**	**141**	**149**	**134**	**167**	**3,73**	**3,73**	**3,93**	**3,53**	**4,39**	2,6	2,4	2,6	2,0	2,4
Tumeur maligne du sein (CIM-9 : 174)	**Sud**	**81**	**105**	**100**	**87**	**109**	**3,08**	**3,98**	**3,78**	**3,27**	**4,09**	2,0	2,3	2,4	2,1	2,5
	Nord	**38**	**28**	**49**	**32**	**39**	**3,31**	**2,44**	**4,30**	**2,82**	**3,44**	2,2	1,8	2,4	2,0	2,3
	Province	**119**	**133**	**149**	**119**	**148**	**3,15**	**3,52**	**3,93**	**3,14**	**3,89**	2,0	2,4	2,6	2,3	2,7
Diabète sucré (CIM-9 : 250)	Sud	59	63	61	57	69	2,24	2,39	2,30	2,14	2,59	1,4	1,5	1,5	1,4	1,6
	Nord	20	21	35	50	28	1,74	1,83	3,07	4,41	2,47	1,2	1,3	2,1	3,0	1,6
	Province	79	84	96	107	97	2,09	2,22	2,54	2,82	2,55	1,4	1,4	1,6	1,8	1,6
Cardiopathies ischémiques (CIM-9 : 410-414)	**Sud**	**386**	**384**	**381**	**395**	**366**	**14,69**	**14,56**	**14,39**	**14,86**	**13,72**	**9,4**	**9,1**	**9,2**	**9,5**	**8,3**
	Nord	**126**	**108**	**124**	**148**	**129**	**10,96**	**9,42**	**10,89**	**13,04**	**11,39**	**7,4**	**6,5**	**7,3**	**8,8**	**7,2**
	Province	**512**	**492**	**505**	**543**	**495**	**13,55**	**13,00**	**13,34**	**14,32**	**13,02**	**8,8**	**8,4**	**8,7**	**9,3**	**7,9**
Maladies vasculaires cérébrales (CIM-9 : 430-438)	**Sud**	**208**	**182**	**168**	**211**	**208**	**7,91**	**6,90**	**6,34**	**7,94**	**7,80**	**5,1**	**4,3**	**4,1**	**5,1**	**4,7**
	Nord	**54**	**57**	**49**	**58**	**68**	**4,70**	**4,97**	**4,30**	**5,11**	**6,00**	**3,2**	**3,5**	**2,9**	**3,4**	**3,8**
	Province	**262**	**239**	**217**	**269**	**276**	**6,94**	**6,32**	**5,73**	**7,09**	**7,26**	**4,5**	**4,1**	**3,7**	**4,6**	**4,4**
Pneumonie et grippe (CIM-9 : 480-487)	Sud	72	65	78	67	89	2,74	2,46	2,95	2,52	3,34	1,8	1,5	1,9	1,6	2,0
	Nord	35	15	24	21	22	3,04	1,31	2,11	1,85	1,94	1,3	1,3	2,1	1,8	1,6
	Province	107	80	102	88	111	2,83	2,11	2,69	2,32	2,92	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9
Maladies pulmonaires obst. chroniques et affections connexes (CIM-9 : 490-496)	Sud	79	79	79	89	89	3,01	3,00	2,95	3,35	3,34	1,9	1,9	1,9	2,1	2,0
	Nord	23	22	36	30	29	3,04	1,31	3,16	2,64	2,56	1,3	1,3	2,1	1,8	1,6
	Province	102	98	115	119	118	2,70	2,67	3,04	3,14	3,10	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9
Maladies chroniques et cirrhose du foie (CIM-9 : 571)	Sud	16	8	6	10	9	0,61	0,30	0,23	0,38	0,34	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2
	Nord	3	1	2	3	9	0,26	0,09	0,18	0,26	0,79	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
	Province	19	9	8	13	18	0,50	0,24	0,21	0,34	0,47	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3
Accident de la circulation impliquant des véhicules à moteur (CIM-9 : E810-E819)	Sud	11	22	15	28	12	0,42	0,83	0,57	1,05	0,45	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3
	Nord	6	6	11	6	9	0,52	0,52	0,97	0,53	0,79	0,4	0,4	0,7	0,4	0,5
	Province	17	28	26	34	21	0,45	0,74	0,69	0,90	0,55	0,3	0,5	0,4	0,6	0,3
Suicide (CIM-9 : E950-E959)	Sud	13	5	6	7	17	0,49	0,19	0,23	0,26	0,64	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4
	Nord	6	8	8	2	1	0,52	0,70	0,70	0,18	0,09	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1
	Province	19	13	14	9	18	0,50	0,34	0,37	0,24	0,47	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

Tableau 11 Taux brut de mortalité, par 10 000 femmes, et taux proportionnel de mortalité pour certaines catégories de diagnostics chez les *FEMMES* dans le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Nombre total de décès					Taux brut de mortalité (TBM) par 10 000 femmes					Taux proportionnel de mortalité (TPM) en %				
Catégorie de diagnostic	**Lieu**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Tumeur maligne de l'estomac (CIM-9 : 151)	Sud	18	17	10	9	7	0,68	0,64	0,38	0,34	0,26	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
	Nord	7	9	12	7	9	0,61	0,79	1,05	0,62	0,79	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5
	Province	25	26	22	16	16	0,66	0,69	0,58	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Tumeur maligne du côlon (CIM-9 : 153)	Sud	43	36	39	44	47	1,64	1,37	1,47	1,66	1,76	1,0	0,9	0,9	1,1	1,1
	Nord	12	8	12	16	13	1,04	0,70	1,05	1,41	1,15	0,7	0,5	0,7	0,9	0,7
	Province	55	44	51	60	60	1,46	1,00	1,35	1,58	1,58	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0
Tumeur maligne du pancréas (CIM-9 : 157)	Sud	41	27	27	33	28	1,56	1,02	1,02	1,24	1,05	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6
	Nord	15	11	16	14	11	1,30	0,96	1,41	1,23	0,97	0,9	0,7	0,9	0,8	0,6
	Province	56	38	43	47	39	1,48	1,00	1,14	1,24	1,03	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (CIM-9 : 162)	Sud	100	111	109	101	125	3,81	4,21	4,12	3,80	4,69	2,4	2,6	2,6	2,4	2,8
	Nord	41	30	40	33	42	3,57	2,62	3,51	2,91	3,71	2,4	1,8	2,4	2,0	2,3
	Province	141	141	149	134	167	3,73	3,73	3,93	3,53	4,39	2,0	2,4	2,6	2,0	2,4
Tumeur maligne du sein (CIM-9 : 174)	Sud	81	105	100	87	109	3,08	3,98	3,78	3,27	4,09	2,0	2,3	2,4	2,1	2,5
	Nord	38	28	49	32	39	3,31	2,44	4,30	2,82	3,44	2,2	1,8	2,4	2,0	2,3
	Province	119	133	149	119	148	3,15	3,52	3,93	3,14	3,89	2,0	2,4	2,6	2,3	2,7
Diabète sucré (CIM-9 : 250)	Sud	59	63	61	57	69	2,24	2,39	2,30	2,14	2,59	1,4	1,5	1,5	1,4	1,6
	Nord	20	21	35	50	28	1,74	1,83	3,07	4,41	2,47	1,2	1,3	2,1	3,0	1,6
	Province	79	84	96	107	97	2,09	2,22	2,54	2,82	2,55	1,4	1,4	1,6	1,8	1,6
Cardiopathies ischémiques (CIM-9 : 410-414)	Sud	386	384	381	395	366	14,69	14,56	14,39	14,86	13,72	9,4	9,1	9,2	9,5	8,3
	Nord	126	108	124	148	129	10,96	9,42	10,89	13,04	11,39	7,4	6,5	7,3	8,8	7,2
	Province	512	492	505	543	495	13,55	13,00	13,34	14,32	13,02	8,8	8,4	8,7	9,3	7,9
Maladies vasculaires cérébrales (CIM-9 : 430-438)	Sud	208	182	168	211	208	7,91	6,90	6,34	7,94	7,80	5,1	4,3	4,1	5,1	4,7
	Nord	54	57	49	58	68	4,70	4,97	4,30	5,11	6,00	3,2	3,5	2,9	3,4	3,8
	Province	262	239	217	269	276	6,94	6,32	5,73	7,09	7,26	4,5	4,1	3,7	4,6	4,4
Pneumonie et grippe (CIM-9 : 480-487)	Sud	72	65	78	67	89	2,74	2,46	2,95	2,52	3,34	1,8	1,5	1,9	1,6	2,0
	Nord	35	15	24	21	22	3,04	1,31	2,11	1,85	1,94	1,3	1,3	2,1	1,8	1,6
	Province	107	80	102	88	111	2,83	2,11	2,69	2,32	2,92	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9
Maladies pulmonaires obst. chroniques et affections connexes (CIM-9 : 490-496)	Sud	79	79	79	89	89	3,01	3,00	2,95	3,35	3,34	1,9	1,9	1,9	2,1	2,0
	Nord	23	22	36	30	29	3,04	1,31	3,16	2,64	2,56	1,3	1,3	2,1	1,8	1,6
	Province	102	98	115	119	118	2,70	2,67	3,04	3,14	3,10	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9
Maladies chroniques et cirrhose du foie (CIM-9 : 571)	Sud	16	8	6	10	9	0,61	0,30	0,23	0,38	0,34	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2
	Nord	3	1	2	3	9	0,26	0,09	0,18	0,26	0,79	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
	Province	19	9	8	13	18	0,50	0,24	0,21	0,34	0,47	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3
Accident de la circulation impliquant des véhicules à moteur (CIM-9 : E810-E819)	Sud	11	22	15	28	12	0,42	0,83	0,57	1,05	0,45	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3
	Nord	6	6	11	6	9	0,52	0,52	0,97	0,53	0,79	0,4	0,4	0,7	0,4	0,5
	Province	17	28	26	34	21	0,45	0,74	0,69	0,90	0,55	0,3	0,5	0,4	0,6	0,3
Suicide (CIM-9 : E950-E959)	Sud	13	5	6	7	17	0,49	0,19	0,23	0,26	0,64	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4
	Nord	6	8	8	2	1	0,52	0,70	0,70	0,18	0,09	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1
	Province	19	13	14	9	18	0,50	0,34	0,37	0,24	0,47	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 20

La **figure 20** montre le pourcentage moyen de décès attribuables aux deux principales catégories de maladies de l'appareil circulatoire (c'est-à-dire les cardiopathies ischémiques et les maladies vasculaires cérébrales), chez les hommes et les femmes.

- Le pourcentage de décès attribuables aux cardiopathies ischémiques (CI) a été d'environ 8% plus élevé chez les hommes que chez les femmes, tandis que le pourcentage de décès attribuables aux maladies vasculaires cérébrales a été d'environ 7% plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

Figure 20 **Pourcentage moyen de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire selon les principales catégories de diagnostics chez les hommes et les femmes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 21

La **figure 21** montre les Taux comparatifs de mortalité par âge (TCM) pour les cardiopathies ischémiques, par 10 000 habitants, chez les hommes et les femmes, au Nouveau-Brunswick, pour chaque année de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, les Taux de mortalité par âge pour les cardiopathies ischémiques, par 10 000 habitants, ont connu une diminution régulière chez les hommes jusqu'en 1997, suivie d'une légère hausse en 1998. Chez les femmes, ces taux sont restés relativement constants, avec une légère hausse en 1997, suivie d'une diminution en 1998.

- Les Taux de mortalité par âge pour les cardiopathies ischémiques ont été constamment plus élevés chez les hommes que chez les femmes pour chacune des cinq années examinées.

Figure 21 Taux comparatifs de mortalité par âge pour les cardiopathies ischémiques selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 12

Le tableau 12 présente les Taux de mortalité pour les cardiopathies ischémiques, par 10 000 habitants, chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Tableau 12 Taux de mortalité de *CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES*, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		De 35 à 64 ans										65 ans et plus										Tous les âges									
		Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux comparatifs de mortalité				
Lieu	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Région 1	H	18	27	21	17	20	5,3	7,8	5,9	4,7	5,4	101	101	91	88	112	101,6	100,9	89,7	85,1	106,7	119	128	112	106	132	12,3	13,1	11,3	10,5	12,8
	F	8	9	8	4	7	2,4	2,6	2,3	1,1	1,9	106	105	106	107	100	77,6	76,2	75,7	74,9	68,3	115	114	114	111	107	11,5	11,3	11,1	10,6	10,0
Région 2	H	44	39	33	47	32	14,0	12,2	10,1	14,2	9,5	160	156	136	131	145	168,0	163,8	141,8	135,0	148,5	206	195	169	178	177	22,4	21,1	18,1	18,8	18,6
	F	10	10	25	18	10	3,1	3,1	7,5	5,3	2,9	144	158	132	151	145	103,7	113,1	94,5	107,0	102,6	154	168	157	169	155	15,3	16,5	15,5	16,5	15,0
Région 3	H	31	33	26	32	36	10,6	11,0	8,5	10,2	11,2	127	96	107	115	125	154,3	115,8	127,5	134,9	144,3	158	130	134	147	162	19,6	15,9	16,2	17,4	18,9
	F	5	9	13	7	12	1,7	3,0	4,3	2,2	3,7	112	93	97	108	92	100,4	82,7	85,4	93,9	79,0	117	102	110	115	104	14,3	12,3	13,1	13,6	12,1
Région 4	H	7	9	11	6	13	6,9	8,7	10,3	5,5	11,7	30	30	33	30	36	112,7	111,9	121,7	108,5	127,9	37	39	44	36	49	14,0	14,5	16,1	13,1	17,2
	F	3	3	3	7	5	3,0	2,9	2,8	6,4	4,5	27	15	28	28	20	73,1	40,6	74,4	73,2	51,3	30	18	31	35	25	11,0	6,5	11,1	12,2	8,6
Région 5	H	8	6	6	8	1	12,6	9,3	9,2	12,1	1,5	23	19	23	14	21	128,9	105,3	126,1	75,4	111,3	31	25	29	22	22	17,6	14,1	16,2	11,9	12,0
	F	1	2	2	1	0	1,6	3,1	3,0	1,5	0,0	16	21	12	22	17	65,2	83,6	46,8	84,2	64,3	17	23	15	23	17	9,5	12,5	8,1	12,0	8,8
Région 6	H	16	11	9	11	14	9,3	6,2	5,0	6,0	7,5	57	49	44	38	42	131,5	111,6	99,3	84,1	91,1	74	60	53	49	56	17,0	13,6	11,9	10,7	12,0
	F	5	3	7	2	4	3,0	1,8	4,0	1,1	2,2	28	26	36	38	42	53,4	48,4	65,6	68,0	74,4	33	29	43	40	46	8,3	7,2	10,3	9,7	10,9
Région 7	H	6	12	13	11	8	6,4	12,8	13,7	11,4	8,2	27	40	42	33	45	104,3	151,5	157,4	121,3	164,7	33	52	55	44	53	13,0	20,0	20,9	16,4	19,8
	F	2	1	1	1	2	2,3	1,1	1,1	1,1	2,1	44	37	33	49	39	130,3	107,9	95,4	139,4	110,6	46	38	35	50	41	18,6	15,2	13,9	19,5	15,9
Nord	H	37	38	39	36	36	8,6	8,7	8,7	7,9	7,8	137	138	142	115	144	120,5	119,8	122,0	96,9	119,5	175	176	181	151	180	15,5	15,3	15,6	12,7	15,0
	F	11	9	13	11	11	2,6	2,1	3,0	2,4	2,4	115	99	109	137	118	77,9	66,0	71,4	88,2	75,1	126	108	124	148	129	11,6	9,7	11,0	12,9	11,1
Sud	H	93	99	80	96	88	9,9	10,3	8,1	9,5	8,6	388	353	334	334	382	140,1	126,8	118,7	116,9	132,1	483	453	415	431	471	17,9	16,7	15,1	15,4	16,6
	F	23	28	46	29	29	2,4	2,9	4,6	2,9	2,8	362	356	335	366	337	93,5	91,3	85,2	91,8	83,4	386	384	381	395	366	13,7	13,5	13,2	13,5	12,4
N.-B.	H	130	137	119	132	124	9,5	9,8	8,3	9,0	8,3	471	476	449	526		134,4	124,8	119,7	111,0	128,4	658	629	596	582	651	17,2	16,3	15,2	14,6	16,1
	F	34	37	59	40	40	2,5	2,6	4,1	2,7	2,7	477	455	444	503	455	89,2	84,3	81,3	90,7	81,1	512	492	505	543	495	13,1	12,4	12,6	13,4	12,0

Source: Service provincial d'épidémiologie, Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil, 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 22

La **figure 22** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge pour les cardiopathies ischémiques dans deux groupes d'âge chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

De 35 à 64 ans

- Dans la Région 1, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Dans la Région 2, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée que la moyenne provinciale, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
- Dans la Région 6, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale chez les hommes.
- On n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre le Nord et le Sud de la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

65 ans et plus

- Dans les Régions 1 et 6, les moyennes des Taux de mortalité par âge étaient considérablement plus faibles que la moyenne provinciale chez les hommes.
- Dans les Régions 1, 4, 5 et 6, les moyennes des Taux de mortalité par âge étaient considérablement plus faibles que la moyenne provinciale chez les femmes.
- Dans les Régions 2 et 3, les moyennes des Taux de mortalité par âge étaient considérablement plus élevées que la moyenne provinciale chez les hommes.
- Dans les Régions 2 et 7, les moyennes des Taux de mortalité par âge étaient considérablement plus élevées que la moyenne provinciale chez les femmes.
- Les moyennes des Taux de mortalité par âge étaient sensiblement plus faibles dans le Nord que dans le Sud, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Dans le groupe d'âge des 35 à 64 ans, la moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, et ce, dans toutes les régions, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

- Dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, la moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions, sauf dans la Région 7, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 22 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES

NOTES POUR LA FIGURE 23

La **figure 23** montre les Taux comparatifs de mortalité par âge annuels pour les maladies vasculaires cérébrales, par 10 000 habitants, chez les hommes et les femmes, au Nouveau-Brunswick au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Chez les **femmes**, on a constaté une diminution régulière du taux comparatif de mortalité de 1994 à 1996, puis une hausse en 1997. Ce taux est ensuite resté relativement stable au cours de l'année suivante.

- Chez les **hommes**, le taux de mortalité par âge est demeuré relativement stable pendant toute la période quinquennale.

- Les Taux de mortalité par âge annuels ont été constamment plus élevés chez les femmes que chez les hommes au cours de la période quinquennale visée.

Figure 23 **Taux comparatif de mortalité par âge pour les maladies vasculaires cérébrales, par 10 000 habitants selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LE TABLEAU 13

Le **tableau 13** présente les Taux de mortalité pour les maladies vasculaires cérébrales, par 10 000 habitants, chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick de 1994 à 1998.

Tableau 13 Taux de mortalité de *MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES*, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		De 35 à 64 ans										65 ans et plus										Tous les âges									
		Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux comparatifs de mortalité				
Lieu	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Région 1	H	11	6	5	2	4	3,3	1,7	1,4	0,6	1,1	38	52	41	36	41	38,2	51,9	40,4	34,8	39,1	49	59	46	38	45	5,1	6,1	4,6	3,8	4,4
	F	4	2	5	5	2	1,2	0,6	1,4	1,4	0,5	66	68	54	77	84	48,3	49,4	38,6	53,9	57,4	70	72	59	82	86	7,0	7,2	5,8	7,9	8,0
Région 2	H	8	9	5	6	3	2,5	2,8	1,5	1,8	0,9	32	39	43	46	38	33,6	40,9	44,8	47,4	38,9	42	50	49	52	41	4,6	5,4	5,3	5,5	4,3
	F	6	2	3	2	6	1,9	0,6	0,9	0,6	1,7	73	56	58	64	51	52,6	40,1	41,5	45,4	36,1	80	58	61	66	58	8,0	5,7	6,0	6,4	5,7
Région 3	H	5	4	2	1	4	1,7	1,3	0,7	0,3	1,2	30	36	34	31	35	36,5	43,4	40,5	36,4	40,4	35	40	37	32	39	4,3	4,9	4,5	3,9	4,6
	F	2	1	1	2	2	0,7	0,3	0,3	0,6	0,6	56	51	47	61	62	50,2	45,3	41,4	53,1	53,2	58	52	48	63	64	7,1	6,3	5,8	7,5	7,5
Région 4	H	2	1	3	0	0	2,0	1,0	2,8	0,0	0,0	10	13	16	11	12	37,6	48,5	59,0	39,8	42,6	12	14	20	11	12	4,6	5,3	7,4	4,1	4,4
	F	2	1	1	1	1	2,0	1,0	0,9	0,9	0,9	17	15	13	15	14	46,0	40,6	34,5	39,2	35,9	19	16	14	16	15	7,0	5,9	5,0	5,7	5,2
Région 5	H	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	6	7	2	7	10	33,6	38,8	11,0	37,7	53,0	6	7	2	8	10	3,5	4,0	1,1	4,4	5,5
	F	0	1	0	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	8	6	9	6	15	32,6	23,9	35,1	23,0	56,8	8	7	9	6	15	4,5	3,8	4,8	3,1	7,8
Région 6	H	0	1	0	4	2	0,0	0,6	0,0	2,2	1,1	19	17	19	14	13	43,8	38,7	42,9	31,0	28,2	19	18	19	18	15	4,5	4,2	4,4	3,9	3,3
	F	0	1	1	1	0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	17	22	14	20	20	32,4	41,0	25,5	35,8	35,4	17	23	15	21	20	4,4	5,8	3,7	5,1	4,9
Région 7	H	2	2	3	1	0	2,1	2,1	3,2	1,0	0,0	7	8	3	13	10	27,0	30,3	11,2	47,8	36,6	9	10	6	14	10	3,5	3,9	2,2	5,3	3,8
	F	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	11	11	15	18	29,6	32,1	31,8	42,7	51,0	10	11	11	15	18	4,1	4,4	4,4	5,8	7,0
Nord	H	4	4	6	6	2	0,9	0,9	1,3	1,3	0,4	42	45	40	45	45	36,9	39,1	34,4	37,9	37,4	46	49	47	51	47	4,1	4,3	4,1	4,4	4,0
	F	2	3	2	2	1	0,5	0,7	0,5	0,4	0,2	52	54	47	56	67	35,2	36,0	30,8	36,0	42,7	54	57	49	58	68	5,0	5,2	4,4	5,1	5,9
Sud	H	24	19	12	9	11	2,5	2,0	1,2	0,9	1,1	100	127	118	113	114	36,1	45,6	41,9	39,6	39,4	126	149	132	122	125	4,7	5,5	4,8	4,4	4,4
	F	12	5	9	9	10	1,3	0,5	0,9	0,9	1,0	195	175	159	202	197	50,4	44,9	40,4	50,6	48,7	208	182	168	211	208	7,4	6,4	5,8	7,2	7,0
N.-B.	H	28	23	18	15	13	2,0	1,6	1,3	1,0	0,9	142	172	158	158	159	36,4	43,7	39,7	39,1	38,8	172	196	179	173	172	4,5	5,2	4,6	4,4	4,3
	F	14	8	11	11	11	1,0	0,6	0,8	0,8	0,7	247	229	206	258	264	46,2	42,4	37,7	46,5	47,0	262	239	217	269	276	6,7	6,1	5,4	6,6	6,7

Source : Service provincial d'épidémiologie, Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil, 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 24

La **figure 24** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge pour les maladies vasculaires cérébrales dans deux groupes d'âge chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

De 35 à 64 ans

- On n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale des taux de mortalité par âge.

- Les Taux de mortalité par âge étaient considérablement plus faibles dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

65 ans et plus

- Dans la Région 1, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée que la moyenne provinciale chez les femmes.

- Dans la Région 6, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale chez les femmes.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible dans le Nord que dans le Sud.

Différences selon le sexe

- Dans le groupe d'âge des 35 à 64 ans, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans la Région 7, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

- Dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1 et 3, ainsi que dans le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 24 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





NOTES POUR LA FIGURE 25

Les tumeurs malignes ont été la deuxième cause de décès au Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998. La **figure 25** montre le pourcentage moyen de décès attribuables aux tumeurs malignes selon les principaux sièges de tumeurs et le sexe, au cours de cette période.

- Chez les **hommes**, les cinq principaux sièges de tumeurs ont été, par ordre d'importance : le poumon, la prostate, le côlon, le pancréas et l'estomac.

- Chez les **femmes**, les cinq principaux sièges du cancer ont été, par ordre d'importance : le poumon, le sein, le côlon, l'utérus et le pancréas.

Figure 25 **Pourcentage moyen de décès attribuables aux tumeurs malignes selon les principaux sièges de tumeurs et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHÉE, DES BRONCHES ET DU POUMON

NOTES POUR LA FIGURE 26

La **figure 26** montre les Taux comparatifs de mortalité par âge (TCM), par 10 000 habitants, pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon chez les hommes et les femmes au Nouveau-Brunswick pour chaque année de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de la période étudiée, le taux comparatif de mortalité par année est resté relativement stable, et ce tant chez les hommes que chez les femmes.

- Au cours de la période quinquennale, le taux comparatif de mortalité a été régulièrement au moins deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Figure 26 **Taux comparatifs de mortalité par âge pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LE TABLEAU 14

Le **tableau 14** présente les taux de mortalité, par 10 000 habitants, pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Tableau 14 **Taux de mortalité de *TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHÉE, DES BRONCHES ET DU POUMON*, par 10 000 habitants, selon le sexe et le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

		De 35 à 64 ans										65 ans et plus										Tous les âges									
		Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux comparatifs de mortalité				
Lieu	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Région 1	H	13	24	20	18	25	3,9	6,9	5,6	5,0	6,7	64	53	57	63	58	64,4	52,9	56,2	60,9	55,2	77	77	77	81	83	8,0	7,9	7,7	8,0	8,0
	F	12	14	12	14	13	3,5	4,0	3,4	3,9	3,5	17	33	23	22	33	12,4	24,0	16,4	15,4	22,6	29	47	35	37	46	2,9	4,7	3,4	3,5	4,3
Région 2	H	22	24	17	26	22	7,0	7,5	5,2	7,8	6,5	62	53	49	53	61	65,1	55,6	51,1	54,6	62,5	84	77	66	79	83	9,1	8,3	7,1	8,3	8,7
	F	21	12	13	15	15	6,5	3,7	3,9	4,4	4,3	30	24	37	29	39	21,6	17,2	26,5	20,6	27,6	51	37	50	44	54	5,2	3,7	5,0	4,3	5,3
Région 3	H	12	16	18	16	16	4,1	5,4	5,9	5,1	5,0	41	40	48	36	41	49,8	48,2	57,2	42,2	47,3	53	56	66	53	57	6,6	6,8	7,9	6,2	6,6
	F	7	7	7	6	5	2,4	2,3	2,3	1,9	1,6	13	20	17	14	20	11,7	17,8	15,0	12,2	17,2	20	27	24	20	25	2,4	3,2	2,8	2,3	2,9
Région 4	H	7	8	8	9	6	6,9	7,7	7,5	8,3	5,4	29	21	21	25	16	108,9	78,3	77,4	90,4	56,8	37	29	29	34	22	14,0	10,7	10,6	12,2	7,7
	F	8	1	0	2	4	7,9	1,0	0,0	1,8	3,6	8	4	6	6	10	21,6	10,8	15,9	15,7	25,6	16	5	6	8	14	5,7	1,8	2,2	2,8	4,7
Région 5	H	10	4	3	6	3	15,7	6,2	4,6	9,1	4,5	8	14	9	12	17	44,8	77,6	49,3	64,6	90,1	18	18	12	18	20	10,1	10,1	6,7	9,8	10,8
	F	3	2	4	1	1	4,7	3,1	6,1	1,5	1,5	5	4	7	5	9	20,4	15,9	27,3	19,1	34,1	8	6	11	6	10	4,4	3,2	5,8	3,1	5,2
Région 6	H	10	6	10	13	12	5,8	3,4	5,5	7,1	6,4	27	17	21	26	37	62,3	38,7	47,4	57,5	80,2	37	23	31	39	49	8,4	5,2	6,8	8,4	10,5
	F	3	4	3	6	7	1,8	2,3	1,7	3,3	3,8	5	6	10	7	3	9,5	11,2	18,2	12,5	5,3	8	10	13	13	10	1,9	2,3	3,1	2,9	2,0
Région 7	H	5	4	7	3	7	5,4	4,3	7,4	3,1	7,2	14	12	18	13	8	54,1	45,4	67,4	47,8	29,3	19	16	25	16	15	7,4	6,2	9,5	6,0	5,5
	F	5	2	4	2	3	5,6	2,2	4,4	2,1	3,2	4	7	5	4	5	11,8	20,4	14,5	11,4	14,2	9	9	10	6	8	3,5	3,6	3,9	2,3	3,0
Nord	H	32	22	28	31	28	7,4	5,0	6,3	6,8	6,0	78	64	69	76	78	68,6	55,6	59,3	64,1	64,8	111	86	97	107	106	9,7	7,5	8,3	8,9	8,8
	F	19	9	11	11	15	4,5	2,1	2,5	2,4	3,3	22	21	28	22	27	14,9	14,0	18,3	14,2	17,2	41	30	40	33	42	3,6	2,6	3,5	2,8	3,5
Sud	H	47	64	55	60	63	5,0	6,6	5,6	6,0	6,1	167	146	154	152	160	60,3	52,5	54,7	53,2	55,3	214	210	209	213	223	7,9	7,7	7,6	7,6	7,8
	F	40	33	32	35	33	4,2	3,4	3,2	3,4	3,2	60	77	77	65	92	15,5	19,7	19,6	16,3	22,8	100	111	109	101	125	3,6	3,9	3,8	3,4	4,2
N.-B.	H	79	86	83	91	91	5,8	6,1	5,8	6,2	6,1	245	210	223	228	238	62,7	53,4	56,1	56,4	58,1	325	296	306	320	329	8,5	7,6	7,8	8,0	8,1
	F	59	42	43	46	48	4,3	3,0	3,0	3,1	3,2	82	98	105	87	119	15,3	18,1	19,2	15,7	21,2	141	141	149	134	167	3,6	3,5	3,7	3,2	4,0

Source : Service provincial d'épidémiologie, Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil, 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 27

La **figure 27** montre la moyenne des taux de mortalité par âge pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon dans deux groupes d'âge, chez les hommes et les femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994-1998.

De 35 à 64 ans

- Dans la Région 2, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée que la moyenne provinciale chez les femmes.
- Dans la Région 3, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale chez les femmes.
- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

65 ans et plus

- Dans la Région 2, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée que la moyenne provinciale chez les femmes.
- Dans la Région 3, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale chez les hommes.
- Dans la Région 4, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée que la moyenne provinciale chez les hommes.
- Dans la Région 6, la moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus faible que la moyenne provinciale chez les femmes.
- La moyenne des Taux de mortalité par âge était considérablement plus élevée dans le Nord que dans le Sud chez les hommes.

Différences selon le sexe

- La moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans le groupe d'âge des 35 à 64 ans dans toutes les régions, sauf dans la Région 7, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, dans toutes les régions, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 27 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour la tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon la région, le sexe et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





NOTES POUR LA FIGURE 28

La **figure 28** montre les Taux comparatifs de mortalité par âge (TCM) pour la tumeur maligne du sein, par 10 000 femmes, pour le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, pendant la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Le taux comparatifs de mortalité pour la province a augmenté régulièrement de 1994 à 1996, puis il a diminué en 1997 pour revenir ensuite au niveau de 1996.

- On n'a constaté aucune tendance persistante dans le Nord et le Sud de la province quant aux taux comparatifs de mortalité, au cours de la période à l'étude.

Figure 28 Taux comparatifs de mortalité par âge pour la tumeur maligne du sein chez la femme selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 15

Le **tableau 15** indique les taux de mortalité, par 10 000 femmes, pour la tumeur maligne du sein dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Tableau 15 **Taux de mortalité de *TUMEUR MALIGNE DU SEIN CHEZ LA FEMME*, par 10 000 femmes, selon le groupe d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

		De 35 à 64 ans										65 ans et plus										Tous les âges									
		Nombre total de décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total De décès					Taux de mortalité par âge					Nombre total de décès					Taux comparatifs de mortalité				
Lieu	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Région 1	F	13	14	13	13	21	3,8	4,0	3,7	3,6	5,7	19	19	30	18	27	13,9	13,8	21,4	12,6	18,5	32	34	44	31	48	3,2	3,4	4,3	2,9	4,5
Région 2	F	8	16	7	14	18	2,5	4,9	2,1	4,1	5,2	20	24	25	19	25	14,4	17,2	17,9	13,5	17,7	28	40	32	33	43	2,8	4,0	3,2	3,2	4,2
Région 3	F	10	16	11	5	12	3,4	5,4	3,6	1,6	3,7	11	15	13	18	16	9,9	13,3	11,4	15,7	13,7	21	31	24	23	28	2,5	3,7	2,8	2,7	3,2
Région 4	F	4	3	5	3	2	4,0	2,9	4,7	2,7	1,8	5	3	6	6	5	13,5	8,1	15,9	15,7	12,8	9	6	11	9	7	3,2	2,1	3,8	3,1	2,4
Région 5	F	4	1	3	0	3	6,3	1,5	4,5	0,0	4,4	5	3	2	7	3	20,4	11,9	7,8	26,8	11,4	9	4	5	7	6	4,9	2,2	2,6	3,7	3,1
Région 6	F	5	4	9	4	4	3,0	2,3	5,1	2,2	2,2	2	5	16	6	13	3,8	9,3	29,1	10,7	23,0	7	9	25	10	17	1,5	2,1	5,7	2,2	3,9
Région 7	F	2	3	2	2	2	2,3	3,3	2,2	2,1	2,1	10	6	6	3	6	29,6	17,5	17,4	8,5	17,0	12	9	8	6	9	4,8	3,5	3,1	2,3	3,5
Nord	F	15	11	19	9	11	3,6	2,6	4,3	2,0	2,4	22	17	30	22	27	14,9	11,3	19,6	14,2	17,2	37	28	49	32	39	3,3	2,4	4,2	2,7	3,3
Sud	F	31	46	31	32	51	3,3	4,7	3,1	3,2	4,9	50	58	68	55	68	12,9	14,9	17,3	13,8	16,8	81	105	100	87	119	2,9	3,7	3,5	3,0	4,0
N.-B.	F	46	57	50	41	62	3,4	4,1	3,5	2,8	4,2	72	75	98	77	95	13,5	13,9	17,9	13,9	16,9	118	133	149	119	158	3,0	3,3	3,7	2,9	3,8

Source : Service provincial d'épidémiologie, Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données statistiques de l'état civil, 1994-1998).

NOTES POUR LA FIGURE 29

La **figure 29** montre la moyenne des taux de mortalité par âge pour la tumeur maligne du sein chez la femme pour deux groupes d'âge dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

De 35 à 64 ans

- On n'a constaté aucune différence significative entre les régions et la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité.

65 ans et plus

- On n'a constaté aucune différence significative entre les régions et la province, ni entre le Nord et le Sud de la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité.

Figure 29 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 femmes, pour la tumeur maligne du sein chez la femme selon la région et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





NOTES POUR LA FIGURE 30

Les maladies de l'appareil respiratoire ont été la troisième cause de décès dans la province au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998. La **figure 30** montre le pourcentage moyen de décès attribuables aux deux principales catégories de diagnostics dans les maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes et les femmes au cours de cette période.

- Les maladies pulmonaires obstructives chroniques, et la pneumonie et la grippe ont été responsables de 88% à 89% de tous les décès attribuables aux maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes et les femmes.
- Le pourcentage de décès attribuables aux maladies pulmonaires obstructives chroniques a été plus élevé de 16% chez les hommes que chez les femmes.
- Le pourcentage de décès attribuables à la pneumonie et à la grippe a été plus élevé de 15% chez les femmes que chez les hommes.

Figure 30 **Pourcentage moyen de décès attribuables aux maladies de l'appareil respiratoire selon les principales catégories de diagnostics chez les hommes et les femmes, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES

NOTES POUR LA FIGURE 31

La **figure 31** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les hommes et les femmes, dans trois groupes d'âge, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

De 45 à 54 ans

- On n'a constaté aucune variation remarquable d'une année à l'autre entre les Taux de mortalité par âge pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques et aucune tendance claire ne s'est dégagée, tant chez les hommes que chez les femmes, au cours de la période à l'étude.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge était approximativement identique chez les hommes et chez les femmes au cours de cette période.

De 55 à 64 ans

- Au cours de la période visée, la moyenne des Taux de mortalité par âge a diminué d'environ 14% chez les hommes et d'environ 6% chez les femmes.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge était d'environ 44% plus élevée chez les hommes (3,6/10 000) que chez les femmes (2,5/10 000) au cours de cette période.

65 ans et plus

- Au cours de la période à l'étude, la moyenne des Taux de mortalité par âge a connu une légère hausse d'environ 4,5% chez les hommes et une hausse d'environ 14,7% chez les femmes.

- Au cours de cette période quinquennale, la moyenne des Taux de mortalité, par âge a été d'environ 134% plus élevée chez les hommes (42,6/10 000) que chez les femmes (18,2/10 000).

NOTES POUR LES TABLEAUX 16a-e

Les **tableaux 16a-e** donnent les taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Figure 31 **Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



Tableau 16a Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994

		Taux de mortalité par âge								
Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,4	29,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	11,7
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	62,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	18,0
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2,0	4,5	36,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	25,1
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	33,8
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	13,4	61,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	6,1	16,3
Région 6	Hommes	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	78,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,8	2,9	11,5
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	38,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Nord	Hommes	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,6	56,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	2,1	12,2
Sud	Hommes	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,9	42,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	17,8
Province	Hommes	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	4,3	46,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	3,5	16,3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 16b Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	24,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	13,1
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	50,4
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,9	4,1	22,9
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	44,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	12,4
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	18,9
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
Région 6	Hommes	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	22,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
Nord	Hommes	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	41,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	14,0
Sud	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	39,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	3,6	16,4
Province	Hommes	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	39,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	2,9	15,7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 16c Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996

		Taux de mortalité par âge								
Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	15,7
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	44,8
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,6
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,9	5,9	57,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	23,8
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	7,8
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8
Nord	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	22,9
Sud	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	4,6	45,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	19,1
Province	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	3,2	44,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	20,1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 16d Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	23,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	39,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,9	22,0
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	37,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,8	20,9
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	65,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	32,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	23,0
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	35,4
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	18,4
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	22,8
Nord	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	37,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	20,6
Sud	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	32,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	2,2	20,6
Province	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	34,4
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	1,9	20,6

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 16e Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1998

		Taux de mortalité par âge								
Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	30,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	19,1	
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	4,0	53,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	19,8
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	48,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,8	19,7
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	67,5
	Femmes	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	23,1
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	45,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	14,2
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Nord	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	56,5
	Femmes	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	16,6
Sud	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,6	43,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,9	19,5
Province	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,4	47,3
	Femmes	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	3,3	18,7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

NOTES POUR LA FIGURE 32

La **figure 32** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge (TCM), par 10 000 habitants, pour les décès attribuables aux maladies pulmonaires obstructives chroniques dans trois groupes d'âge selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

De 45 à 54 ans

- Chez les hommes, aucun décès n'a été attribué aux maladies pulmonaires obstructives chroniques dans les Régions 4 et 7 au cours de la période à l'étude.
- Chez les femmes, aucun décès n'a été attribué aux maladies pulmonaires obstructives chroniques dans les Régions 4 et 7 au cours de la période à l'étude.
- On n'a observé aucune différence significative entre les hommes et les femmes quant à la moyenne provinciale des taux comparatifs de mortalité.

De 55 à 64 ans

- Chez les hommes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale des taux comparatifs de mortalité.
- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale des taux comparatifs de mortalité.
- La moyenne provinciale des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

65 ans et plus

- Chez les hommes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale des taux comparatifs de mortalité.
- Chez les femmes, la moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée que la moyenne provinciale dans la Région 6.
- La moyenne provinciale des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Nord et Sud

- On n'a observé aucune différence statistiquement significative entre le Nord et le Sud de la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, dans les groupes d'âge des 45 à 54 ans et des 65 ans et plus. On a constaté une différence entre le Nord et le Sud de la province dans le groupe d'âge des 55 à 64 ans chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a observé aucune différence significative selon le sexe quant à la moyenne des Taux de mortalité par âge dans les groupes d'âge des 45 à 54 ans et des 55 à 64 ans, et ce, dans aucune des régions sanitaires, le Nord, le Sud ou la province.

- Dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, la moyenne des Taux de mortalité par âge était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 2, 3, 4 et 7, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 32 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



CAUSES EXTÉRIEURES DE LÉSIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS

NOTES POUR LA FIGURE 33

Les causes extérieures de lésions traumatiques et les empoisonnements constituaient la quatrième cause importante de décès au Nouveau-Brunswick au cours de la période de 1994 à 1998. La **figure 33** montre le pourcentage moyen de décès attribuables aux deux principales catégories de diagnostics de causes extérieures de lésions traumatiques et empoisonnemens chez les hommes et les femmes pour la province du Nouveau-Brunswick au cours de cette période.

- Les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur ont été la principale cause de décès attribuables aux causes extérieures de lésions traumatiques et aux empoisonnements chez les femmes. Le pourcentage de décès attribuables aux accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur était légèrement plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

- Le suicide a été la principale cause de décès attribuables aux causes extérieures de lésions traumatiques et aux empoisonnements chez les hommes. Le pourcentage de décès attribuables au suicide était constamment plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

- Les autres causes extérieures de lésions traumatiques comprenaient la noyade, les incendies et les chutes accidentelles.

Figure 33 **Pourcentage moyen de décès attribuables à des causes extérieures de lésions traumatiques et à des empoisonnements selon les principales causes et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR

NOTES POUR LA FIGURE 34

La **figure 34** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge (TCM) pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur chez les hommes et les femmes, pour cinq groupes d'âge, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

Province

- Au cours de la période visée, on n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre les moyennes provinciales des Taux de mortalité par âge chez les hommes et les femmes, et ce, pour les cinq groupes d'âge.

Régions

- On n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre les régions quant aux moyennes des Taux de mortalité par âge chez les hommes et les femmes, et ce, pour les cinq groupes d'âge.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre le Nord et le Sud de la province quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, dans les cinq groupes d'âge.

Différences selon le sexe

- La moyenne des Taux de mortalité par âge pour les groupes d'âge des 15 à 24 ans et des 25 à 44 ans était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes seulement au niveau provincial. On n'a constaté aucune différence significative selon le sexe dans les autres groupes d'âge.

NOTES POUR LES TABLEAUX 17a-e

Les **tableaux 17a-e** donnent les Taux de mortalité par âge (TCM), par 10 000 habitants, pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Figure 34 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Figure 34 (suite) **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Figure 34 (suite) **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



Tableau 17a Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	4,0
	Femmes	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Région 2	Hommes	0,0	0,8	7,5	4,5	4,9	0,0	1,9	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	0,9	1,4	0,7
Région 3	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	3,1	1,5	3,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,9
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	3,1	0,0	3,8
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 5	Hommes	0,0	0,0	7,9	0,0	3,8	0,0	4,7	0,0	5,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,3	1,7	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,8	0,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	2,3	3,3	0,0	3,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Nord	Hommes	0,0	0,0	1,0	1,1	2,7	1,5	2,8	0,0	2,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7
Sud	Hommes	0,0	0,3	2,6	2,0	2,3	0,5	1,6	1,0	2,5
	Femmes	0,0	0,0	0,6	0,5	0,2	0,7	0,3	0,5	0,8
Province	Hommes	0,0	0,2	2,1	1,7	2,4	0,8	2,0	0,7	2,6
	Femmes	0,0	0,0	0,4	1,1	0,2	0,8	0,4	0,3	0,7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 17b Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995.

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,8	3,1	5,8	0,0	1,3	2,5	1,3	2,0
	Femmes	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	2,2
Région 2	Hommes	0,0	1,6	1,5	6,2	0,7	0,7	0,0	0,0	2,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,7	1,8	1,4	2,1
Région 3	Hommes	0,0	0,0	1,7	3,1	1,4	2,3	2,0	3,0	2,4
	Femmes	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	0,9
Région 4	Hommes	0,0	0,0	9,0	4,8	7,2	2,1	11,8	0,0	7,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	2,1	0,0	0,0	2,7
Région 5	Hommes	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	0,0	5,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	4,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	4,8	2,3	2,4	0,0	0,0	3,8
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Nord	Hommes	0,0	0,6	4,2	2,3	3,3	1,5	2,7	0,0	4,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	0,5	0,0	0,0	1,3
Sud	Hommes	0,0	0,8	2,1	5,0	0,7	1,4	1,5	1,4	2,2
	Femmes	0,0	0,0	1,7	0,5	0,2	0,5	1,5	1,4	1,8
Province	Hommes	0,0	0,8	2,8	4,2	1,5	1,5	1,9	1,0	2,8
	Femmes	0,0	0,0	1,1	0,7	0,5	0,5	1,1	1,0	1,7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 17c Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	4,8	2,9	0,7	0,0	1,6	0,0	3,9
	Femmes	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,4
Région 2	Hommes	0,0	0,8	0,0	3,2	0,7	2,1	0,9	0,0	2,1
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	1,4
Région 3	Hommes	0,0	0,0	1,7	1,5	1,4	2,3	2,8	2,9	2,4
	Femmes	0,0	0,9	1,9	1,6	0,0	0,0	1,0	1,4	0,9
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	4,0	0,0	0,0	7,4
	Femmes	0,0	0,0	4,9	5,5	0,0	2,1	2,9	0,0	0,0
Région 5	Hommes	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,6	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	9,7	2,5	0,0	0,0	0,0	7,5
	Femmes	7,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,9
Nord	Hommes	0,0	0,6	0,0	7,1	1,1	1,0	0,7	1,0	3,4
	Femmes	1,7	0,0	1,2	1,3	0,6	1,0	0,7	2,1	1,3
Sud	Hommes	0,0	0,3	2,2	2,5	0,9	1,4	1,8	0,9	2,8
	Femmes	0,0	0,6	1,1	0,5	0,2	0,2	0,6	0,4	1,3
Province	Hommes	0,0	0,4	1,4	3,9	1,0	1,3	1,4	1,0	3,0
	Femmes	0,5	0,4	1,2	0,7	0,3	0,5	0,6	0,9	1,3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 17d Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants pour les *ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	1,7	9,7	4,4	1,4	2,6	3,1	0,0	1,0
	Femmes	0,0	0,9	1,7	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	1,4
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	4,7	0,8	1,4	0,9	0,0	3,1
	Femmes	0,0	0,8	0,0	6,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Région 3	Hommes	1,8	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	0,9	0,0	2,3
	Femmes	2,0	0,9	0,0	0,0	1,5	2,2	0,9	0,0	1,7
Région 4	Hommes	0,0	0,0	4,5	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	2,6
Région 5	Hommes	0,0	0,0	0,0	10,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0
	Femmes	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	0,0	0,0	2,9	1,5	5,1	1,5	0,0	2,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2,4	2,9	4,6	3,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord	Hommes	0,0	0,0	2,2	3,5	1,8	2,5	2,5	1,0	1,7
	Femmes	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,6
Sud	Hommes	0,6	0,6	3,3	3,1	1,2	2,3	1,7	0,0	2,1
	Femmes	0,6	0,9	0,6	3,7	1,7	0,9	0,3	0,0	1,0
Province	Hommes	0,4	0,4	2,9	3,2	1,4	2,4	2,0	0,3	2,0
	Femmes	1,4	0,6	0,4	2,6	1,2	0,8	0,6	0,0	0,9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 17e Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1998

		Taux de mortalité par âge								
Lieu	Sexe	0-4	5-14	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,0	1,6	3,0	0,0	2,6	0,0	2,4	1,9
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,7
Région 2	Hommes	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,5	0,0	4,0	3,1
	Femmes	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7
Région 3	Hommes	0,0	0,0	7,0	1,7	2,9	0,7	4,5	1,4	1,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,4	2,6
Région 4	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,6	4,5	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	2,6	0,0	0,0
Région 5	Hommes	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	0,0	2,9	5,9	0,0	2,5	0,0	0,0	4,3
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,6	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,8
Nord	Hommes	0,0	0,0	2,3	2,4	0,6	1,5	0,6	1,0	1,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	0,0	1,9	1,0	0,6
Sud	Hommes	0,0	0,0	2,8	2,1	1,5	2,3	1,4	2,6	2,1
	Femmes	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0	0,9	1,2
Province	Hommes	0,0	0,0	2,6	2,2	1,2	2,1	1,1	2,1	2,0
	Femmes	0,0	0,0	0,4	0,8	0,5	0,5	0,6	0,9	1,1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

NOTES POUR LA FIGURE 35

La **figure 35** montre la moyenne des Taux de mortalité par âge (TCM) pour les décès attribuables au suicide chez les hommes et les femmes, pour quatre groupes d'âge, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998. La **figure 35** ne comprend pas le groupe d'âge de la naissance à 14 ans, parce que toutes les moyennes des Taux de mortalité par âge de ce groupe d'âge étaient inférieures à 0,01, par 10 000 habitants.

Taux de mortalité par âge pour la province

- Au cours de la période étudiée, on n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre les moyennes provinciales des Taux de mortalité par âge chez les hommes et chez les femmes, et ce, dans les quatre groupes d'âge.

Taux de mortalité par âge dans les régions

- On n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre les régions quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, dans les quatre groupes d'âge.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence statistiquement significative entre le Nord et le Sud quant aux moyennes des taux comparatifs de mortalité, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, dans les quatre groupes d'âge.

Différences selon le sexe

- La moyenne des Taux de mortalité par âge pour les 15 à 24 ans était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans le Nord et l'ensemble de la province.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge pour les 25 à 44 ans était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

- La moyenne des Taux de mortalité par âge pour les 45 à 64 ans et pour les 65 ans et plus était sensiblement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans l'ensemble de la province.

NOTES POUR LES TABLEAUX 18a-e

Les **tableaux 18a-e** donnent les Taux de mortalité par âge (TCM), par 10 000 habitants, pour les décès attribuables au suicide chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

Figure 35 **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les décès attribuables au suicide selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Figure 35 (suite) **Moyenne des taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants pour les décès attribuables au suicide selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**





Tableau 18a Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants pour les *DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994

		Taux de mortalité par âge				
Lieu	Sexe	0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	1,5	2,0	0,5	3,0
	Femmes	0,0	0,8	1,0	1,1	0,0
Région 2	Hommes	0,0	3,0	2,5	3,4	1,1
	Femmes	0,0	0,0	0,7	1,7	0,7
Région 3	Hommes	0,0	1,6	2,2	4,2	3,6
	Femmes	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Région 4	Hommes	0,0	9,2	5,5	3,8	7,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Région 5	Hommes	0,0	4,2	9,3	5,5	0,0
	Femmes	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	1,4	2,0	3,2	4,6
	Femmes	0,0	1,5	0,7	1,1	0,0
Région 7	Hommes	0,0	2,2	3,5	3,9	7,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord	Hommes	0,0	3,8	4,2	3,8	5,3
	Femmes	0,0	0,3	0,7	0,9	0,3
Sud	Hommes	0,0	2,0	2,3	2,6	2,5
	Femmes	0,0	0,3	0,7	0,9	0,3
Province	Hommes	0,0	2,6	2,9	3,0	3,3
	Femmes	0,0	0,4	0,7	0,9	0,2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 18b Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995

		Taux de mortalité par âge				
Lieu	Sexe	0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Région 1	Hommes	0,6	1,5	4,1	3,1	1,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Région 2	Hommes	0,0	1,5	3,2	3,3	1,0
	Femmes	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0
Région 3	Hommes	0,0	0,8	3,7	1,8	3,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Région 4	Hommes	0,0	9,3	10,0	3,6	11,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Région 5	Hommes	0,0	4,4	5,7	0,0	0,0
	Femmes	0,0	4,5	3,8	0,0	0,0
Région 6	Hommes	0,0	5,5	4,6	8,1	4,6
	Femmes	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0
Région 7	Hommes	0,0	4,7	5,9	1,9	0,0
	Femmes	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Nord	Hommes	0,0	6,1	6,3	4,5	4,3
	Femmes	0,0	0,6	1,1	1,3	0,0
Sud	Hommes	0,2	1,3	3,7	2,8	1,8
	Femmes	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0
Province	Hommes	0,1	2,8	4,5	3,3	2,5
	Femmes	0,0	0,4	0,3	0,9	0,0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 18c Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996

Taux de mortalité par âge

Lieu	Sexe	0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Région 1	Hommes	0,0	0,8	5,1	1,0	1,0
	Femmes	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0
Région 2	Hommes	0,0	0,8	1,4	3,3	1,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 3	Hommes	0,0	0,8	2,2	1,2	3,6
	Femmes	0,0	0,0	0,4	1,7	0,0
Région 4	Hommes	1,8	2,4	5,5	7,0	0,0
	Femmes	0,0	2,6	1,1	6,9	0,0
Région 5	Hommes	0,0	0,0	7,7	5,3	5,5
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	1,2	4,2	2,7	3,9	4,5
	Femmes	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	2,4	1,2	1,9	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord	Hommes	0,9	2,8	3,8	4,4	2,6
	Femmes	0,0	0,6	0,5	2,0	0,0
Sud	Hommes	0,0	0,8	2,9	1,8	1,8
	Femmes	0,0	0,3	0,1	0,7	0,0
Province	Hommes	0,3	1,4	3,2	2,6	2,0
	Femmes	0,0	0,4	0,2	1,1	0,0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 18d Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997

		Taux de mortalité par âge				
Lieu	Sexe	0-14	15-24	25-44	45-64	65 +
Région 1	Hommes	0,0	3,8	4,0	1,0	1,9
	Femmes	0,0	1,6	0,0	0,5	0,0
Région 2	Hommes	0,5	2,4	2,5	2,1	1,0
	Femmes	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0
Région 3	Hommes	0,0	0,8	1,8	2,8	3,5
	Femmes	0,0	0,9	0,4	0,0	0,0
Région 4	Hommes	1,9	0,0	2,2	1,7	3,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 5	Hommes	0,0	0,0	3,9	2,6	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	1,2	2,9	4,1	2,8	6,6
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	2,5	3,6	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
Nord	Hommes	0,9	1,1	3,3	2,7	3,4
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Sud	Hommes	0,2	2,4	2,8	1,9	2,1
	Femmes	0,0	0,8	0,2	0,3	0,0
Province	Hommes	0,4	2,0	3,0	2,2	2,5
	Femmes	0,0	0,6	0,2	0,5	0,0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Tableau 18e Taux de mortalité par âge, par 10 000 habitants, pour les *DÉCÈS ATTRIBUABLES AU SUICIDE* selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1998

		Taux de mortalité par âge				
Lieu	Sexe	0-14	15-24	25-44	45-64	65 +
Région 1	Hommes	0,6	1,6	2,7	3,2	1,9
	Femmes	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0
Région 2	Hommes	0,0	0,8	3,3	1,6	0,0
	Femmes	0,0	0,8	0,7	2,0	0,0
Région 3	Hommes	0,0	2,6	4,4	2,2	4,6
	Femmes	0,0	0,0	1,5	1,1	0,9
Région 4	Hommes	2,0	0,0	1,1	4,9	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Région 5	Hommes	0,0	0,0	2,0	2,6	0,0
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 6	Hommes	1,3	5,8	4,2	4,6	2,2
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région 7	Hommes	0,0	0,0	6,4	3,5	3,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord	Hommes	1,0	2,3	3,6	4,1	1,7
	Femmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sud	Hommes	0,2	1,6	3,4	2,4	2,1
	Femmes	0,0	0,6	0,7	1,3	0,2
Province	Hommes	0,4	1,8	3,5	2,9	2,9
	Femmes	0,0	0,4	0,4	0,8	0,4

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Taux basés sur le recensement de la population du Nouveau-Brunswick de 1996.

Chapitre 5

Morbidité au sein de la Population

Faits saillants

Maladies transmissibles

- En 1998, un cas de rubéole (maladie pouvant être prévenue par un vaccin) a été déclaré comparativement à deux l'année précédente. Toujours en 1998, le nombre de cas déclarés de coqueluche a augmenté pour atteindre 266 cas comparativement à 73 en 1997.

- Le taux d'immunisation chez les élèves de première année a légèrement diminué, passant de 97,5% en 1993-1994 à 95,8% en 1997-1998.

- La chlamydia a été la maladie transmise sexuellement la plus fréquemment déclarée de 1994 à 1998, suivie de la gonorrhée et de la syphilis.

- Le nombre de décès causés par le sida a augmenté, passant de 46 cas en 1993 à 89 cas en 1998. Le nombre de cas déclarés de personnes séropositives s'est stabilisé pendant ces cinq années et n'a pas manifesté de tendance constante à la hausse.

- La campylobactériose et la salmonellose ont été les principales maladies entériques déclarées pendant la période quinquennale étudiée, suivies de la giardiase et de l'infection à *E. coli* (0157:H7).

- Au cours de cette même période quinquennale, le plus grand nombre de cas de tuberculose a été signalé au sein des groupes d'âge des 60 ans et plus et des 40 à 59 ans.

Utilisation des ressources hospitalières

- Au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998, les troubles mentaux, les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil respiratoire ont été les principales causes d'hospitalisation.

- Pendant cette période, le coût moyen par patient par jour a augmenté de 34,5% au Nouveau-Brunswick, passant de 577 $ à 776 $, soit une hausse plus élevée que celle de la moyenne nationale qui a augmenté de 33%, passant de 628 $ à 840 $.

- Toujours pendant la période visée, le nombre de jours de soins hospitaliers et le nombre de congés, par 1 000 habitants, pour certains diagnostics, ont diminué respectivement d'environ 7,6% et 9,1%.

- **Chez les hommes**, les troubles mentaux et les maladies de l'appareil circulatoire ont causé un plus grand nombre de jours d'hospitalisation, par 1 000 habitants, dans le Sud que dans le Nord, alors que les maladies de l'appareil respiratoire et les tumeurs malignes ont causé un plus grand nombre de jours d'hospitalisation, par 1 000 habitants, dans le Nord que dans le Sud.

- **Chez les femmes**, les troubles mentaux et les maladies de l'appareil circulatoire ont causé un plus grand nombre de jours d'hospitalisation, par 1 000 habitants, dans le Sud que dans le Nord.

Maladies transmissibles

La présente section fournit des renseignements sur certaines maladies transmissibles, y compris celles qui doivent être déclarées en vertu de la *Loi sur la santé* du Nouveau-Brunswick, ainsi que celles qui font l'objet d'un contrôle provincial.

Les maladies transmissibles sont présentées sous les rubriques suivantes :

(i) Maladies pouvant être prévenues par un vaccin
(ii) Maladies transmises sexuellement
(iii) Affections entériques
(iii) Autres maladies transmissibles

MALADIES POUVANT ÊTRE PRÉVENUES PAR UN VACCIN

NOTES POUR LE TABLEAU 19

Le **tableau 19** donne le nombre total de cas déclarés de quatre maladies pouvant être prévenues par un vaccin (rougeole, oreillons, rubéole et coqueluche), et le nombre de cas par 1 000 habitants, pour le Nouveau-Brunswick au cours de la période de 1994 à 1998.

- En 1994, le nombre de cas déclarés de rubéole est tombé à zéro, alors qu'il était de 84 l'année précédente.

- Parmi les maladies pouvant être prévenues par un vaccin, celle qui a été le plus souvent déclarée au cours de la période de 1994 à 1998 a été la coqueluche (1 014 cas). Elle a été suivie des oreillons (14 cas) et de la rubéole (8 cas). Le nombre de cas déclarés de coqueluche a connu des variations importantes au cours de la période visée. En 1995, il a augmenté brusquement pour atteindre de près de six fois (5,8 fois) le nombre de l'année précédente et, en 1998, il était de 3,6 fois plus élevé qu'en 1997.

- Aucun cas de poliomyélite, de diphtérie ou de tétanos n'a été déclaré au cours de la période de 1994 à 1998.

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de rougeole, d'oreillons, de rubéole et de coqueluche, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

	Nombre total de cas					Nombre de cas par 1 000 habitants				
Maladie	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
Rougeole	0	2	0	4	0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Oreillons	2	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubéole	0	1	4	2	1	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Coqueluche	81	469	125	73	266	0,11	0,62	0,17	0,10	0,35

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux- être du Nouveau-Brunswick, 1994-1998. Taux basés sur des estimations de la population du Nouveau-Brunswick en 1999.

NOTES POUR LE TABLEAU 20

Le **tableau 20** donne le nombre de cas de rougeole, d'oreillons, de rubéole et de coqueluche déclarés dans la province selon le groupe d'âge et le sexe, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- En 1994, aucun cas de rougeole ni de rubéole n'a été déclaré.

- Le nombre de cas de rubéole déclarés de 1994 à 1998 (14 cas) était sensiblement plus élevé qu'au cours des cinq années précédentes (9 cas).

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de *rougeole*, d'*oreillons*, de *rubéole* et de *coqueluche* selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

		Rougeole					Oreillons					Rubéole					Coqueluche				
Âge	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	4	8
mois	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	3	3	9
1-4	H	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	12	54	22	11	8
ans	F	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	14	77	15	8	23
5-9	H	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19	85	23	13	32
ans	F	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	84	18	18	56
10-14	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10	30	4	4	54
ans	F	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47	15	6	35
15-19	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	3
ans	F	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	6
20-24	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
ans	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3
25-29	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
ans	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
30-39	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	3	2	6
ans	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5
40-45	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6
ans	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4
60 ans	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2
et plus	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
Tous les	H	0	0	0	2	0	0	2	1	2	3	0	0	3	1	1	45	212	64	34	121
âges	F	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	1	1	1	0	36	257	61	39	145

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Tableau 20 **Nombre de cas déclarés de *rougeole*, d'*oreillons*, de *rubéole* et de *coqueluche* selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

		Rougeole					Oreillons					Rubéole					Coqueluche				
Âge	Sexe	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	4	8
mois	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	3	3	9
1-4	H	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	12	54	22	11	8
ans	F	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	14	77	15	8	23
5-9	H	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	19	85	23	13	32
ans	F	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	84	18	18	56
10-14	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10	30	4	4	54
ans	F	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47	15	6	35
15-19	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	3
ans	F	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	6
20-24	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
ans	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3
25-29	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
ans	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
30-39	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	3	2	6
ans	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5
40-45	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	6
ans	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4
60 ans	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2
et plus	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
Tous les	H	0	0	0	2	0	0	2	1	2	3	0	0	3	1	1	45	212	64	34	121
âges	F	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	1	1	1	0	36	257	61	39	145

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LE TABLEAU 21

Le **tableau 21** fournit des données sur l'immunisation des élèves de première année au cours des années scolaires, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Depuis juin 1982, tous les enfants de la province entrant en première année doivent avoir été immunisés contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons et la rubéole, à moins d'être exemptés.

- Le taux d'immunisation de la province au cours de cette période a connu une diminution, passant de 97,5% en 1993-1994 à 95,8% en 1997-1998.

Tableau 21 Nombre d'élèves de première année immunisés et taux d'immunisation dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998

	Nombre d'élèves					Immunisations complètes					Pourcentage d'immunisations complètes				
Région	1993 1993	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998
1	2109	2166	2293	n.d.	2148	2039	2084	2206	n.d.	2057	96.68	97.51	97.68	100	95.8
2	2469	2390	2411	2954	2867	2443	2390	2371	2898	2775	98.95	98.83	98.55	98.59	96.8
3	1769	2206	2026	2323	2182	1652	2090	1865	2091	2021	93.39	94.72	92.35	91.96	92.6
4	653	673	650	627	599	652	673	649	625	597	99.85	100	99.85	99.68	99.7
5	548	562	456	485	470	536	552	452	476	462	97.81	98.22	99.12	98.14	98.3
6	1176	501	1000	1076	1016	1170	493	994	1068	1003	99.49	98.40	99.39	99.23	98.7
7	728	0	1344	n.d.	606	725	0	1342	n.d.	599	99.59	100	99.85	100	98.8
Nord	3105	1736	3450	2188	2691	3083	1718	3437	2169	2661	99.29	98.96	99.62	99.13	98.9
Sud	6347	6762	6730	5277	7197	6134	6531	6442	4989	6853	96.64	96.58	95.72	95.54	95.2
Province	9452	8498	10180	7465	9888	9217	8249	9879	7158	9514	97.51	97.06	97.04	95.88	96.2

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux- être du Nouveau-Brunswick.

MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT (MTS)

NOTES POUR LA FIGURE 36

La gonorrhée, l'infection à chlamydia et la syphilis ont été les principales maladies transmises sexuellement (MTS) à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998. La **figure 36** montre le nombre de cas de ces MTS, par 1 000 habitants, au Nouveau-Brunswick, pendant cette période.

- Les infections à chlamydia ont été la MTS la plus fréquemment déclarée.
- Le taux d'infections gonococciques a connu une hausse significative de 1994 à 1997, suivie d'une réduction appréciable en 1998.

NOTES POUR LE TABLEAU 22a

Le **tableau 22a** donne le nombre total de cas déclarés de ***gonorrhée***, d'***infection à chlamydia*** et de ***syphilis*** au Nouveau-Brunswick au cours de la période de 1994 à 1998.

NOTES POUR LE TABLEAU 22b

Le **tableau 22b** montre le nombre de cas déclarés de ***gonorrhée***, d'***infection à chlamydia*** et de ***syphilis***, par 1 000 habitants, de 1994 à 1998, au Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LE TABLEAU 22c

Le **tableau 22c** donne le nombre de cas déclarés de ***gonorrhée***, d'***infection à chlamydia*** et de ***syphilis***, selon le groupe d'âge et le sexe, de 1994 à 1998, dans la province du Nouveau-Brunswick.

Tableaux 22a et b Nombre total de cas déclarés de gonorrhée, d'infection à chlamydia et de syphilis, et nombre de cas déclarés, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

	Tableau 22a Nombre total de cas					Tableau 22b Nombre de cas par 1 000 habitants				
Maladie	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Gonorrhée	13	14	45	47	21	0,02	0,02	0,06	0,06	0,03
Infection à chlamydia	919	798	839	821	1050	1,22	1,06	1,11	1,09	1,39
Syphilis	18	19	15	10	10	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux- être du Nouveau-Brunswick, 1994-1998. Taux basés sur des estimations de la population du Nouveau-Brunswick en 1999.

Tableau 22c **Nombre de cas déclarés de *gonorrhée*, d'*infection à chlamydia* et de *syphilis* selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

Âge	Sexe	Gonorrhée					Infection à chlamydia					Syphilis				
		1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11 mois	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1-4 ans	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9 ans	H	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14 ans	H	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	4	3	7	10	10	0	0	0	0	0
15-19 ans	H	2	3	1	1	2	29	25	35	26	48	0	1	0	0	0
	F	4	2	15	9	5	305	225	251	255	341	1	0	0	0	0
20-24 ans	H	1	1	6	0	1	87	75	77	96	121	0	0	1	0	0
	F	1	3	5	16	3	324	281	300	247	315	0	0	0	0	0
25-29 ans	H	1	0	0	1	1	35	48	41	38	52	0	0	0	0	0
	F	1	0	3	8	1	75	73	76	75	92	0	0	0	0	0
30-39 ans	H	2	3	4	2	3	19	21	12	27	22	0	1	1	0	0
	F	1	2	9	8	3	29	34	27	27	31	0	0	0	0	0
40-59 ans	H	0	0	0	0	1	2	0	3	5	6	3	2	0	1	0
	F	0	0	2	2	1	3	8	5	8	8	3	0	0	2	1
60 ans et plus	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	3
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	10	7	4	6
Sexe non précisé	H, F	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0
Tous les âges Sauf lorsque le sexe n'est pas précisé	H	6	7	11	4	8	174	170	169	192	249	8	9	7	4	3
	F	7	7	34	43	13	744	627	668	626	800	10	10	7	6	7

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Tableau 22c **Nombre de cas déclarés de *gonorrhée*, d'*infection à chlamydia* et de *syphilis* selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**

Âge	Sexe	Gonorrhée					Infection à chlamydia					Syphilis				
		1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11 mois	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1-4 ans	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9 ans	H	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14 ans	H	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	4	3	7	10	10	0	0	0	0	0
15-19 ans	H	2	3	1	1	2	29	25	35	26	48	0	1	0	0	0
	F	4	2	15	9	5	305	225	251	255	341	1	0	0	0	0
20-24 ans	H	1	1	6	0	1	87	75	77	96	121	0	0	1	0	0
	F	1	3	5	16	3	324	281	300	247	315	0	0	0	0	0
25-29 ans	H	1	0	0	1	1	35	48	41	38	52	0	0	0	0	0
	F	1	0	3	8	1	75	73	76	75	92	0	0	0	0	0
30-39 ans	H	2	3	4	2	3	19	21	12	27	22	0	1	1	0	0
	F	1	2	9	8	3	29	34	27	27	31	0	0	0	0	0
40-59 ans	H	0	0	0	0	1	2	0	3	5	6	3	2	0	1	0
	F	0	0	2	2	1	3	8	5	8	8	3	0	0	2	1
60 ans et plus	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	3
	F	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	10	7	4	6
Sexe non précisé	H, F	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0
Tous les âges Sauf lorsque le sexe n'est pas précisé	H	6	7	11	4	8	174	170	169	192	249	8	9	7	4	3
	F	7	7	34	43	13	744	627	668	626	800	10	10	7	6	7

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Figure 36 **Nombre de cas, par 1 000 habitants, des principales maladies transmises sexuellement, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 37

La **figure 37** montre le nombre de nouveaux cas de séropositivité au virus d'immunodéficience humaine (VIH) et de syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) selon le sexe au Nouveau-Brunswick de 1994 à 1998.

Figure 37 **Nombre de nouveaux cas de *VIH* et de *SIDA* selon le sexe, Nouveau-Brunswick : 1994-1998**



NOTES POUR LES TABLEAUX 23A ET 23B

Les **tableaux 23a et 23b** donnent le nombre de nouveaux cas de séropositivité pour le VIH et de SIDA déclarés au Nouveau-Brunswick au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998, de même que l'état à la fin de l'année de toutes les personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic de SIDA au Nouveau-Brunswick au cours de cette même période.

- De 1994 à 1998, 82 hommes et 16 femmes ont fait l'objet d'un diagnostic de VIH. Au cours de cette période, 47 hommes (57%) et 5 femmes (31%) séropositifs pour le VIH ont également fait l'objet d'un diagnostic de SIDA.

- À la fin de 1998, 47 des 136 personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic de SIDA depuis 1994 (34%) étaient vivantes et 89 (65%) étaient décédées.

Tableau 23a
Nombre de nouveaux cas de VIH et de SIDA, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

Nombre de nouveaux cas de VIH			Nombre de nouveaux cas de SIDA	
Année	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
1994	30	5	13	2
1995	14	2	16	1
1996	16	4	9	1
1997	11	1	4	1
1998	11	4	5	0
Total	82	16	47	5

Tableau 23b
État des personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic de SIDA, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

État des cas de SIDA		
Nombre de cas déclarés	Décédés	Vivants
99	74	25
116	84	32
126	87	39
131	88	43
136	89	47
-	-	-

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux- être du Nouveau-Brunswick.

AFFECTIONS ENTÉRIQUES

NOTES POUR LA FIGURE 38A

La campylobactériose et la salmonellose ont été les principales affections entériques au Nouveau-Brunswick au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998. La **figure 38a** montre le nombre de cas déclarés, par 1 000 habitants, pour ces deux affections au cours de cette période.

Figure 38A Nombre de cas de campylobactériose et de salmonellose, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LA FIGURE 38B

La **figure 38B** montre le nombre de cas de giardiase et d'infection à *E. coli* (0157:H7) déclarés, par 1 000 habitants, au Nouveau-Brunswick au cours de la période de 1994 à 1998.

Figure 38B Nombre de cas de giardiase et d'infection à *E. coli* (0157:H7), par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LA FIGURE 38C

La **figure 38C** montre le nombre de cas de shigellose et d'amibiase déclarés, par 1 000 habitants, au Nouveau-Brunswick au cours de la période de 1994 à 1998.

Figure 38c Nombre de cas de shigellose et d'amibiase, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 24

Le **tableau 24** donne le nombre de cas d'amibiase, de campylobactériose, de giardiase, d'infection à *E. coli* (0157:H7), de salmonellose et de shigellose, et le nombre de cas déclarés, par 1 000 habitants, au Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

Tableau 24 Nombre de cas d'amibiase, de campylobactériose, de giardiase, d'infection à *E. coli* (0157:H7), de salmonellose et de shigellose, déclarés, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

	Nombre total de cas					Nombre de cas par 1 000 habitants				
Maladie	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Amibiase	6	6	2	5	0	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
Campylobactériose	354	241	258	250	344	0,47	0,32	0,34	0,33	0,46
Giardiase	113	98	112	133	76	0,15	0,13	0,15	0,13	0,10
Infection à *E. coli* (0157:H7)	14	22	19	22	51	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
Salmonellose	166	154	160	129	156	0,22	0,20	0,21	0,17	0,21
Shigellose	7	9	4	12	12	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux- être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LA FIGURE 39

La **figure 39** montre le nombre de nouveaux cas de tuberculose déclarés au Nouveau-Brunswick de 1994 à 1998 selon le type de cas.

- La tuberculose pulmonaire a été le type de cas le plus fréquemment déclaré au cours de chacune des cinq années faisant l'objet de l'étude.

Figure 39 Nombre de nouveaux cas de tuberculose déclarés selon le type de cas, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LES TABLEAUX 25 ET 26

Le **tableau 25** donne le nombre de nouveaux cas de tuberculose déclarés dans la province au cours de la période de 1994 à 1998, selon le type de cas, dans dix groupes d'âge. Le **tableau 26** donne le nombre de nouveaux cas de tuberculose déclarés dans la province de 1994 à 1998, selon le type de cas et la région : les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick.

- Le plus grand nombre de nouveaux cas déclarés l'a été dans le groupe d'âge des 60 ans et plus pour chacune des cinq années visées par l'étude.

Tableau 25 Nombre de nouveaux cas de *tuberculose* déclarés selon le type de cas et le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

	Pulmonaire					Primaire					Pleurésie					Sans atteinte de l'appareil respiratoire				
Âge	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
0-11 mois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5-9 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 ans	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 ans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
25-29 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30-39 ans	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40-59 ans	2	1	6	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
60 ans et plus	7	2	4	5	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0
Tous les âges	**10**	**5**	**11**	**6**	**5**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**7**	**2**	**3**	**2**	**1**

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Tableau 26 Nombre de nouveaux cas de *tuberculose* déclarés selon le type de cas et la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

	Pulmonaire					Primaire					Pleurésie					Sans atteinte de l'appareil respiratoire				
Région sanitaire	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998	1994	1995	1996	1997	1998
1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
2	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
3	4	1	4	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	2	2	4	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
Sud	8	3	7	4	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4	1	3	2	1
Province	**10**	**5**	**11**	**6**	**5**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**6**	**2**	**3**	**2**	**1**

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LA FIGURE 40

La **figure 40** montre le nombre moyen de nouveaux cas de tuberculose, par 1 000 habitants, déclarés dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1994 à 1998.

- Le nombre moyen de nouveaux cas de tuberculose, par 1 000 habitants, a varié considérablement entre les sept régions sanitaires. Les Régions 1 et 2 ont eu la moyenne la plus basse et la Région 5 la moyenne la plus élevée, supérieure à la moyenne provinciale.

- Le nombre moyen de nouveaux cas de tuberculose, par 1 000 habitants, était considérablement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province.

Figure 40 Nombre moyen de nouveaux cas de tuberculose, par 1 000 habitants, selon la région, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



UTILISATION DES RESSOURCES HOSPITALIÈRES

La présente section fournit certaines données sur l'utilisation des ressources hospitalières au Nouveau-Brunswick pour les années financières de 1993-1994 à 1997-1998, et elle inclut des comparaisons avec les périodes précédentes et les taux d'utilisation des ressources hospitalières à l'échelle nationale.

NOTES POUR LA FIGURE 41

La **figure 41** montre le nombre de jours de soins hospitaliers, par 100 000 habitants, et le coût annuel par tête pour les soins dispensés dans les hôpitaux publics du Nouveau-Brunswick et du Canada, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

- Pendant la période visée, l'utilisation des ressources hospitalières a diminué d'environ 24% au Nouveau-Brunswick et d'environ 33% au Canada. L'utilisation des ressources hospitalières a été constamment plus élevée au Nouveau-Brunswick qu'au Canada, au cours des cinq années à l'étude. En 1997-1998, le taux d'utilisation des ressources hospitalières au Nouveau-Brunswick a été d'environ 8% plus élevé que la moyenne nationale.

- Au cours de la période visée, le coût annuel des soins hospitaliers, par tête, a diminué d'environ 0,05% au Nouveau-Brunswick (pour atteindre 976 $) et d'environ 11% au Canada (pour atteindre 766 $). Le coût annuel des soins hospitaliers par tête a été constamment plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada au cours des cinq années à l'étude. Au Nouveau-Brunswick, en 1997-1998, le coût annuel par tête des soins hospitaliers a été d'environ 27% plus élevé que la moyenne nationale.

Figure 41 **Nombre de jours de soins hospitaliers, par 100 000 habitants, et coût annuel des soins hospitaliers par tête, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 42

La **figure 42** montre le coût moyen par jour- patient et la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux publics du Nouveau-Brunswick et du Canada, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le coût moyen par jour- patient a augmenté d'environ 34% au Nouveau-Brunswick (pour atteindre 776 $) et d'environ 33% pour l'ensemble du Canada (pour atteindre 840 $).

- Le coût moyen par jour- patient a été constamment plus élevé au Canada qu'au Nouveau-Brunswick. En 1993-1994, le coût moyen par jour- patient au Canada était d'environ 8,3% plus élevé que la moyenne de la province du Nouveau-Brunswick.

- Au cours de la période visée, la durée moyenne de séjour a diminué d'environ 30% au Nouveau-Brunswick et d'environ 25% au Canada.

- La durée moyenne de séjour a été constamment moindre au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. En 1997-1998, la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick était inférieure à la moyenne nationale d'environ 18%.

Figure 42 Coût moyen par jour-patient et durée moyenne de séjour dans les hôpitaux publics, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 43

La **figure 43** montre le nombre de congés, par 100 000 habitants, et le coût moyen par congé pour les hôpitaux publics du Nouveau-Brunswick et du Canada, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de congés, par 100 000 habitants, a diminué de 11% au Nouveau-Brunswick et de 20% dans l'ensemble du pays.

- Le nombre de congés, par 100 000 habitants, a été constamment plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. En 1997-1998, le nombre de congés, par 100 000 habitants, au Nouveau-Brunswick a été d'environ 40% plus élevé que la moyenne nationale.

- Au cours de la période visée, le coût moyen par congé a augmenté d'environ 11% au Nouveau-Brunswick (pour atteindre 5 846 $) et d'environ 8% dans l'ensemble du Canada (pour atteindre 7 442 $). Au Canada, le coût moyen a connu une hausse maximale de 15% en 1995-1996 (pour atteindre 7 910 $).

- Le coût moyen par congé a été constamment moindre au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. En 1997-1998, le coût moyen par congé dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick a été inférieur à la moyenne nationale d'environ 27%.

Figure 43 **Nombre de congés, par 100 000 habitants, et coût moyen par congé dans les hôpitaux publics, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LE TABLEAU 27

Le **tableau 27** donne certaines utilisations des ressources hospitalières et certaines statistiques financières pour les hôpitaux publics du Nouveau-Brunswick et du Canada pour la période de 1993-1994 à 1997-1998. Ces statistiques ne comprennent pas les cas des services externes ni ceux des patients traités dans les hôpitaux psychiatriques. Elles comprennent cependant les patients traités dans les unités psychiatriques des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés.

Tableau 27 Certaines utilisations des ressources hospitalières et certaines statistiques financières, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1993-1994 à 1997-1998

	Région	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
N^bre total de jours	N.-B.	1 072 883	1 007 887	960 485	927 148	825 215
	Canada	38 786 281	37 406 402	35 517 367	31 460 392	27 380 152
N^bre de jours par 100 000 hab.	N.-B.	142 007	133 012	126 369	131 593	108 288
	Canada	135 129	128 365	120 582	105 667	90 947
N^bre total de congés	N.-B.	120 431	118 768	117 722	114 457	109 663
	Canada	3 525 625	3 447 778	3 320 662	3 156 728	3 089 372
N^bre de congés par 100 000 hab.	N.-B.	15 940	15 674	15 488	15 010	14 390
	Canada	12 283	11 832	11 274	10 603	10 262
Durée moyenne de séjour (jours)	N.-B.	9,87	8,46	8,16	8,39	7,56
	Canada	11,10	10,80	10,70	10,00	8,90
Coût moyen par jour- patient	N.-B.	576,80$	619,62$	660,39$	691,42$	775,83$
	Canada	628,00$	635,00$	740,00$	739,00$	840,00$
Coût moyen par congé	N.-B.	5 270$	5 279$	5 388$	5 803$	5 846$
	Canada	6 903$	6 891$	7 910$	7 364$	7 442$
Coût des soins hospitaliers par tête	N.-B.	981,05$	935,41$	972,97$	967,45$	975,74$
	Canada	847,93$	818,20$	792,67$	783,39$	766,24$

Sources : - Données du Nouveau-Brunswick Hôpitaux agréés (Nouveau-Brunswick), Rapport annuel des services financiers, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Données nationales : - Rapports sur la santé, Catalogue 82-003SI, La morbidité hospitalière, 1993-1994 à 1994-1995.
- Rapports sur la santé, Catalogue 82-216, annuel, La morbidité hospitalière, 1995-1996 à 1997-1998.
- Rapports sur la santé, Catalogue 83-246, partie 4, annuel, Indicateurs des hôpitaux, dépenses totales, 1995-1996 à 1997-1998.
- Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-1999, catalogue 1- 895581-74-5 ICIS.

NOTES POUR LA FIGURE 44

La **figure 44** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour dix principales catégories de maladies (Codes de la CIM-9) chez les hommes et les femmes, au Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Les troubles mentaux ont été la cause du plus grand nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

- Chez les hommes, la seconde cause d'hospitalisation a été les maladies de l'appareil circulatoire. Ont suivi les maladies de l'appareil respiratoire et les maladies de l'appareil digestif.

- Chez les femmes, la seconde cause d'hospitalisation a été les maladies de l'appareil circulatoire. Ont suivi les maladies de l'appareil digestif et les maladies de l'appareil respiratoire.

Figure 44 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, selon la catégorie de maladies et le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Codes de la CIM-9

290- 319	Troubles mentaux
390- 459	Maladies de l'appareil circulatoire
460- 519	Maladies de l'appareil respiratoire
520- 579	Maladies de l'appareil digestif
630- 676	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
140- 208	Tumeurs malignes
320- 389	Maladies du système nerveux et des organes des sens
800- 999	Lésions traumatiques et empoisonnements
710- 739	Maladies du système ostéo- articulaire et des muscles et du tissu conjonctif
580- 629	Maladies des organes génito-urinaires
240- 279	Maladies endocriniennes, de la nutrition, du métabolisme et troubles immunitaires
680- 709	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

NOTES POUR LA FIGURE 45

La **figure 45** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, selon les dix principales catégories de maladies (Codes de la CIM-9) chez les hommes et les femmes du Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998.

- Chez les hommes, la principale cause de congés a été les maladies de l'appareil digestif. Ont suivi les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de l'appareil respiratoire et les maladies des organes génito-urinaires.

- Chez les femmes, la principale cause de congés a été les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Ont suivi les maladies des organes génito-urinaires, les maladies de l'appareil digestif et les maladies de l'appareil respiratoire.

Figure 45 Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, selon la catégorie de maladies et le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



Codes de la CIM-9

630-676	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
520-579	Maladies de l'appareil digestif
390-459	Maladies de l'appareil circulatoire
460-519	Maladies de l'appareil respiratoire
580-629	Maladies des organes génito-urinaires
800- 999	Lésions traumatiques et empoisonnements
320- 389	Maladies du système nerveux et des organes des sens
710- 739	Maladies du système ostéo- articulaire et des muscles et du tissu conjonctif
140- 208	Tumeurs malignes
290- 319	Troubles mentaux
680- 709	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané
240- 279	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires

NOTES POUR LE TABLEAU 28

Le **tableau 28** présente des données sur l'utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies, de 1993-1994 à 1997-1998. Ces données fournissent une vue d'ensemble de la morbidité de la population. Il est important de noter que le nombre de personnes traitées pour une affection en particulier n'est pas indiqué, c'est-à-dire que la même personne pourrait avoir été hospitalisée plus d'une fois pour le même problème médical au cours de la même année.

Les données sur l'utilisation présentées au tableau 28 comprennent les éléments suivants :

(i) Nombre total de jours de soins hospitaliers
(ii) Jours de soins hospitaliers par 1 000 habitants
(iii) Nombre total de congés
(iv) Congés par 1 000 habitants

NOTES POUR LES TABLEAUX 29A-E ET POUR LES TABLEAUX 30A-E

Les **tableaux 29a-e** donnent le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1000 habitants, pour les principales catégories de maladies chez les hommes et les femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998.

Les **tableaux 30a-e** donnent le nombre de congés, par 1 000 habitants, pour les principales catégories de maladies chez les hommes et les femmes, pour les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998.

En comparant les données régionales, il faut noter que les différences entre le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, et le nombre de congés pour certaines catégories de maladies (par exemple pour les soins psychiatriques et le traitement du cancer) peuvent être influencées par l'emplacement des centres de traitement de ces maladies.

Dans la section qui suit, on trouvera une comparaison détaillée des taux d'utilisation des ressources hospitalières pour les cinq principales catégories de maladies dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick.

Tableau 28 **Utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**

Les principales catégories de maladies	Sexe	Nbre total de jours de soins hosp. 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Jours de soins par 1 000 habitants. 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Nbre total de congés 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Congés par 1 000 habitants 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
Infections et maladies parasitaires (001-139)	H	8 575	5 838	6 123	5 853	21 024	23.1	15.7	16.4	15.7	56.2	1 148	1 248	1 200	1 081	1 098	3.1	3.3	3.2	2.9	2.9
	F	7 965	7 479	6 357	5 834	6 608	21.1	19.8	16.8	15.4	17.4	1 280	1 362	1 330	1 175	1 163	3.4	3.6	3.5	3.1	3.1
Tumeurs malignes (140-208) Toutes les causes	H	43 099	40 782	39 416	34 756	33 690	115.9	100.9	105.6	93.0	90.1	3 865	4 008	3 858	3 658	3 510	10.4	10.8	10.3	9.8	9.4
	F	39 335	38 185	32 206	30 716	30 709	104.1	100.9	85.0	81.0	80.5	3 156	3 260	3 151	3 080	3 082	8.4	8.6	8.3	8.1	8.1
Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)	H	9 359	9 230	9 235	8 376	7 382	25.2	24.6	24.6	22.4	19.7	675	719	721	651	557	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5
	F	9 510	8 936	7 129	6 355	8 417	25.2	23.6	18.8	16.8	22.1	532	560	512	480	532	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4
Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)	H	10 291	10 125	10 179	7 774	6 861	27.7	27.2	27.3	20.8	18.4	778	771	753	690	612	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6
	F	5 466	4 757	4 436	4 210	3 439	14.5	12.6	11.7	11.1	9.0	322	335	310	310	312	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
Tumeurs malignes du sein (174-175)	H	57	16	17	17	9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7	3	4	5	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	6 500	6 251	4 211	4 073	3 231	17.2	16.5	11.1	10.7	8.5	762	776	757	768	701	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8
Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)	H	12 503	10 087	8 193	7 037	7 145	33.6	27.1	22.0	18.8	19.1	1 314	1 264	1 193	1 037	1 088	3.5	3.4	3.2	2.8	2.9
	F	5 273	5 446	4 021	3 957	4 105	14.0	14.4	10.6	10.4	10.8	549	522	477	450	442	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)	H	5 181	4 841	5 651	5 378	5 611	13.9	13.0	15.1	14.4	15.0	380	435	409	458	478	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3
	F	7 279	6 940	7 140	6 348	6 536	19.2	18.3	18.9	16.7	17.2	484	502	498	463	487	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	H	14 275	9 438	10 475	8 968	10 300	38.4	25.3	28.1	24.0	27.6	1 053	972	1 011	1 051	1 117	2.8	2.6	2.7	2.8	3.0
	F	14 264	11 269	10 535	10 222	10 931	37.8	29.8	27.8	27.0	27.6	1 282	1 325	1 393	1 321	1 443	3.4	3.5	3.7	3.5	3.8
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	H	3 212	2 722	2 834	2 976	2 808	8.6	7.3	7.6	8.0	7.5	409	433	467	442	456	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2
	F	3 959	3 988	4 026	3 733	3 764	10.5	10.5	10.6	9.8	9.9	482	518	609	579	553	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5
Troubles mentaux (290-319)	H	53 948	102 631	266 520	174 326	98 188	145.1	275.5	714.4	466.4	262.6	2 341	2 666	2 769	2 747	2 767	6.3	7.2	7.5	7.3	7.4
	F	97 315	77 327	152 355	186 456	143 709	257.6	204.4	402.3	491.7	378.1	3 197	3 353	3 494	3 498	3 408	8.5	8.9	9.2	9.2	9.0
Autres psychoses (295-299)	H	21 174	29 789	90 117	53 066	33 267	57.0	80.0	241.5	142.0	89.0	792	906	995	1 042	1 146	2.1	2.4	2.7	2.8	3.1
	F	30 071	33 614	55 984	54 775	66 279	79.6	88.8	147.8	144.4	174.4	1 076	1 225	1 284	1 325	1 455	2.8	3.2	3.4	3.5	3.8
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)	H	13 956	23 267	27 672	14 053	10 823	37.5	62.4	74.2	37.6	28.9	1 236	1 410	1 382	1 266	1 259	3.3	3.8	3.7	3.4	3.4
	F	25 244	27 448	28 889	19 721	23 231	66.8	72.5	76.3	52.0	61.1	1 837	1 847	1 841	1 764	1 568	4.9	4.9	4.9	4.7	4.1

Tableau 28 (suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998

Les principales catégories de maladies	Sexe	Nbre total de jours de soins hosp. 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Jours de soins par 1 000 habitants. 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Nbre total de congés 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Congés par 1 000 habitants 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) Toutes les causes	H	36 616	23 636	23 349	50 070	30 483	98.5	63.4	62.6	134.0	81.5	4 430	4 623	5 065	4 858	5 099	11.9	12.4	13.6	13.0	13.6
	F	24 628	22 394	27 085	17 975	25 219	65.2	59.2	71.5	47.4	66.4	5 390	5 944	6 580	6 241	6 738	14.3	15.7	17.4	16.5	17.7
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)	H	14 716	4 836	10 426	25 815	20 904	39.6	13.0	27.9	69.1	55.9	165	130	182	178	227	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
	F	8 764	7 260	8 252	6 717	12 156	23.2	19.2	16.5	17.7	32.0	192	170	192	200	285	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7
Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)	H	14 869	11 275	3 724	17 969	3 009	40.0	30.3	10.0	48.1	8.0	393	410	367	352	318	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
	F	7 118	4 569	11 227	3 187	4 203	18.8	12.1	29.6	8.4	11.1	413	424	427	452	405	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
Maladies de l'oeil et de ses annexes (360-379)	H	5 457	5 646	5 428	5 080	5 110	14.7	15.2	14.5	13.6	13.7	3 382	3 552	4 012	3 821	4 040	9.1	9.5	10.8	10.2	10.8
	F	6 805	7 692	7 625	6 447	6 874	18.0	20.3	20.1	17.0	18.1	3 953	4 411	5 182	4 792	5 232	10.5	11.7	13.7	12.6	13.8
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) Toutes les causes	H	101 292	88 299	88 095	92 605	75 619	272.5	237.0	236.1	247.7	202.3	9 269	8 590	9 291	9 222	9 322	24.9	23.1	24.9	24.7	24.9
	F	90 212	83 149	73 325	66 366	69 416	238.8	219.8	193.6	175.0	182.6	7 230	7 158	7 469	7 434	7 412	19.1	18.9	19.7	19.6	19.5
Cardiopathies ischémiques (410-414)	H	31 394	25 586	25 977	25 151	24 112	84.4	68.7	69.6	67.3	64.5	4 220	3 836	4 061	4 208	4 132	11.4	10.3	10.9	11.3	11.1
	F	20 579	18 457	19 042	16 877	17 266	54.5	48.8	50.3	44.5	45.4	2 283	2 220	2 354	2 395	2 392	6.0	5.9	6.2	6.3	6.3
Autres formes de cardiopathies (420-429)	H	18 929	17 180	19 181	20 302	17 855	50.9	46.1	51.4	54.3	47.8	2 109	1 986	2 209	2 240	2 275	5.7	5.3	5.9	6.0	6.1
	F	21 999	20 573	19 290	18 754	20 553	58.2	54.4	50.9	49.5	54.1	2 090	2 027	2 079	2 167	2 245	5.5	5.4	5.5	5.7	5.9
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)	H	35 141	29 415	25 649	34 968	18 627	94.5	79.0	68.7	93.5	49.8	1 067	1 072	1 104	1 131	1 110	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
	F	32 431	30 295	22 543	17 675	19 443	85.9	80.1	59.5	46.6	51.2	983	1 040	1 126	1 131	1 110	2.6	2.7	3.0	3.0	2.9
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519) Toutes les causes	H	57 448	51 702	54 599	49 658	45 100	154.5	138.8	146.3	132.8	120.9	8 683	8 442	8 652	7 853	8 172	23.4	22.7	23.2	21.0	21.9
	F	48 545	45 578	46 309	39 735	42 648	128.5	120.5	122.3	104.8	112.2	7 839	7 899	8 108	7 142	7 291	20.8	20.9	21.4	18.8	19.2
Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)	H	5 859	5 446	4 840	4 180	3 907	15.8	14.6	13.0	11.2	10.5	1 680	1 561	1 420	1 299	1 366	4.5	4.2	3.8	3.5	3.7
	F	4 945	5 465	4 215	4 017	3 371	13.1	14.4	11.1	10.6	8.9	1 348	1 369	1 188	1 130	983	3.6	3.6	3.1	3.0	2.6
Pneumonie et grippe (480-487)	H	13 225	13 471	12 982	13 603	15 133	35.6	36.2	34.8	36.4	40.5	1 623	1 690	1 703	1 664	1 764	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7
	F	14 085	12 756	13 383	11 645	13 596	37.3	33.7	35.3	30.7	35.8	1 587	1 598	1 642	1 499	1 690	4.2	4.2	4.3	4.0	4.4
Mal. pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)	H	28 030	21 708	21 099	16 681	17 324	75.4	58.3	56.6	44.6	46.3	2 787	2 485	2 529	2 385	2 453	7.5	6.7	6.8	6.4	6.6
	F	20 510	17 742	16 859	16 306	17 061	54.3	46.9	49.8	43.0	44.9	2 630	2 491	2 395	2 117	2 220	7.0	6.6	6.3	5.6	5.8

Tableau 28 (suite) **Utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**

Les principales catégories de maladies	Sexe	Nbre total de jours de soins hosp. 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Jours de soins par 1 000 habitants. 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Nbre total de congés 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	Congés par 1 000 habitants 1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	H	43 272	40 486	40 474	38 692	36 295	116.4	108.0	108.5	103.5	97.1	9 683	10 368	11 299	10 080	9 756	26.0	27.6	30.3	27.0	26.1
	F	49 586	47 533	47 325	44 056	43 127	131.3	125.6	125.0	116.2	113.5	10 679	11 337	12 383	10 793	10 561	28.2	30.0	32.7	28.5	27.8
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)	H	8 125	8 346	7 717	7 151	6 641	21.9	22.4	20.7	19.1	17.8	2 072	2 387	2 838	2 389	2 090	5.6	6.4	7.6	6.4	5.6
	F	8 125	7 990	8 376	8 061	7 012	21.5	21.1	22.1	21.3	18.4	2 089	2 349	2 965	2 434	2 155	5.5	6.2	7.8	6.4	5.7
Entérite et colite non infectieuses (555-558)	H	5 425	5 664	5 507	4 759	4 758	14.6	15.2	14.8	12.7	12.7	1 129	1 265	1 347	980	973	3.0	3.4	3.6	2.6	2.6
	F	8 975	8 841	8 782	6 980	6 821	23.7	23.4	23.2	18.1	17.9	1 665	1 726	1 911	1 421	1 299	4.4	4.6	5.0	3.7	3.4
Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)	H	8 263	7 082	7 637	7 192	7 670	22.2	19.0	21.0	19.2	20.5	1 356	1 498	1 620	1 480	1 484	3.6	4.0	4.3	3.9	4.0
	F	11 807	11 499	11 759	12 028	11 909	31.3	30.4	31.1	31.7	31.3	1 957	2 134	2 406	2 048	2 048	5.2	5.6	6.4	5.4	5.4
Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)	H	12 246	11 218	11 773	11 018	10 623	32.9	30.1	31.0	29.5	28.4	1 700	1 706	1 893	1 773	1 726	4.6	4.6	5.1	4.7	4.6
	F	14 550	13 350	12 993	12 132	12 309	38.5	35.3	34.3	32.0	32.4	2 695	2 729	2 896	2 777	2 847	7.1	7.2	7.6	7.3	7.5
Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	H	25 930	19 513	18 899	16 584	16 165	69.7	52.4	50.7	44.4	43.2	6 821	6 812	6 441	6 126	5 805	18.3	18.3	17.3	16.4	15.5
	F	37 436	34 707	33 042	30 585	28 439	99.1	91.7	87.3	80.7	74.8	11 494	12 417	11 868	11 219	10 052	30.4	32.8	31.3	29.6	26.4
Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)	H	9 938	8 380	8 897	8 134	7 299	26.7	22.5	23.8	21.8	19.5	3 394	3 372	3 344	3 136	2 949	9.1	9.1	9.0	8.4	7.9
	F	10 063	10 348	9 814	9 051	8 348	26.6	27.3	25.9	23.9	22.0	4 271	4 792	4 105	3 998	3 268	11.3	12.7	10.8	10.5	8.6
Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)	H	9 462	8 299	7 002	5 252	5 302	25.5	22.3	18.8	14.1	14.2	3 131	3 101	2 742	2 628	2 507	8.4	8.3	7.3	7.0	6.7
	F						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)	H						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	18 111	16 893	16 105	14 552	13 510	47.9	44.6	42.5	38.4	35.5	5 212	5 303	5 405	5 065	4 647	13.8	14.0	14.3	13.4	12.2
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)	H						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	48 752	42 124	36 972	33 666	32 250	129.1	111.3	97.6	88.8	84.8	12 613	12 072	11 437	10 794	10 629	33.4	31.9	30.2	28.5	28.0
Complications liées principalement à la grossesse (640-648)	H						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	11 563	9 566	8 259	7 193	7 618	30.6	25.3	21.8	19.0	20.0	2 801	2 569	2 348	2 060	2 141	7.4	6.8	6.2	5.4	5.6
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement (650-659)	H						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	20 457	16 600	14 207	12 990	11 976	54.2	43.9	37.5	34.3	31.5	4 646	4 219	3 884	3 726	3 576	12.3	11.2	10.3	9.8	9.4
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'acc. (660-669)	H						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	14 047	13 542	12 349	11 502	10 570	37.2	35.8	32.6	30.3	27.8	3 552	3 794	3 772	3 663	3 487	9.4	10.0	9.9	9.7	9.2

Tableau 28 (suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998

Les principales catégories de maladies	Sexe	Nbre total de jours de soins hosp.					Jours de soins par 1 000 habitants					Nbre total de congés					Congés par 1 000 habitants				
		1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998
Maladies de la peau et du tissu sous-cutané (680-709)	H	7 123	7 635	6 909	6 488	7 431	19.2	20.5	18.5	17.4	19.9	1 194	1 334	1 390	1 275	1 264	3.2	3.6	3.7	3.4	3.4
	F	8 532	6 727	6 716	6 256	5 788	22.6	17.8	17.7	16.5	15.2	1 256	1 301	1 254	1 195	1 309	3.3	3.4	3.3	3.2	3.4
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif (710-739)	H	20 958	19 933	17 968	23 004	17 963	56.4	53.5	48.2	61.5	48.0	4 285	4 490	4 355	4 615	4 719	11.5	12.1	11.7	12.3	12.6
	F	33 279	27 979	26 985	27 373	25 673	88.1	73.9	71.3	72.2	67.5	4 770	4 792	4 764	5 135	5 234	12.6	12.7	12.6	13.5	13.8
Arthropathies et affections apparentées (710-719)	H	8 959	8 578	8 442	9 515	7 935	24.1	23.0	22.6	25.5	21.2	2 027	2 143	2 160	2 382	2 424	5.5	5.8	5.8	6.4	6.5
	F	16 562	12 252	13 031	12 379	11 927	43.8	32.4	34.4	32.6	31.4	2 086	2 104	2 227	2 397	2 446	5.5	5.6	5.9	6.3	6.4
Affections des régions du plan dorsal (720-724)	H	6 992	6 062	4 872	4 771	5 010	18.8	16.3	13.1	12.8	13.4	993	902	821	819	801	2.7	2.4	2.2	2.2	2.1
	F	7 718	7 181	6 022	6 024	5 364	20.4	19.0	15.9	15.9	14.1	969	810	814	857	817	2.6	2.1	2.1	2.3	2.1
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire (730-739)	H	3 116	3 137	2 729	6 733	2 302	8.4	8.4	7.3	18.0	6.2	465	498	483	507	458	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2
	F	6 074	5 479	4 847	5 668	4 627	16.1	14.5	12.8	14.9	12.2	739	756	722	743	724	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9
Anomalies congénitales (740-749)	H	1 324	2 052	10 020	1 216	1 567	3.6	5.5	26.9	3.3	4.2	470	522	514	480	485	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
	F	1 894	1 713	1 374	1 429	1 045	5.0	4.5	3.6	3.8	2.7	472	439	438	385	371	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)	H	570	530	320	906	1 116	1.5	1.4	0.9	2.4	3.0	75	82	68	141	121	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
	F	1 795	1 758	1 121	361	667	4.8	4.6	3.0	1.0	1.8	163	193	183	81	88	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2
Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	H	22 987	20 225	21 872	19 684	19 376	61.8	54.3	58.6	52.7	51.8	4 211	4 415	4 699	4 422	4 537	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
	F	25 425	26 905	25 357	23 793	26 943	67.3	71.1	67.0	62.6	70.9	4 838	5 182	5 409	5 122	5 233	12.8	13.7	14.3	13.5	13.8

Tableau 28 (suite) **Utilisation des ressources hospitalières pour les principales catégories de maladies selon le sexe d'après le NOMBRE TOTAL de JOURS de SOINS HOSPITALIERS et de CONGÉS et le nombre, par 1 000 habitants, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**

Les principales catégories de maladies	Sexe	Nbre total de jours de soins hosp. 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Jours de soins par 1 000 habitants 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Nombre total de congés 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	Congés par 1 000 habitants 1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)	H	37 997	32 933	28 392	26 932	26 507	102.2	88.4	76.1	72.1	70.9	5 224	5 211	5 100	4 996	4 854	14.1	14.0	13.7	13.4	13.0
	F	41 726	33 068	33 564	29 998	28 581	110.5	87.4	88.9	79.1	75.2	3 887	3 857	3 955	3 921	3 757	10.3	10.2	10.4	10.3	9.9
Fractures du crâne (800-804)	H	1 456	1 136	1 475	1 270	1 041	3.9	3.0	4.0	3.4	2.8	335	300	312	296	300	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
	F	508	353	342	432	236	1.3	0.9	0.9	1.1	0.6	77	97	81	90	73	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
Fractures du cou et du tronc (805-809)	H	3 054	2 619	2 425	2 959	2 555	8.2	7.0	6.5	7.9	6.8	245	255	215	258	244	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	F	3 261	3 027	3 059	3 302	2 239	8.6	8.0	8.1	8.7	5.9	207	197	204	229	181	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
Fractures du membre supérieur (810-819)	H	1 282	1 474	1 395	1 788	1 408	3.4	4.0	3.7	4.8	3.8	530	598	544	621	633	1.4	1.6	1.5	1.7	1.7
	F	2 356	1 908	1 777	2 535	1 989	6.2	5.0	4.7	6.7	5.2	407	407	391	461	472	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2
Fractures du membre inférieur (820-829)	H	7 025	6 545	6 443	5 858	6 247	18.9	17.6	17.3	15.7	16.7	731	750	654	706	702	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9
	F	13 925	13 445	12 608	11 489	11 296	36.9	35.5	33.3	30.3	29.7	829	789	868	870	844	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2
Entorses (840-848)	H	1 041	818	664	831	789	2.8	2.2	1.8	2.2	2.1	263	257	240	221	231	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	F	976	740	633	592	530	2.6	2.0	1.7	1.6	1.4	174	168	137	142	130	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)	H	1 872	4 517	1 626	1 071	1 096	5.0	12.1	4.4	2.9	2.9	315	293	280	258	221	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
	F	7 660	832	2 208	866	637	20.3	2.2	5.8	2.3	1.7	165	140	136	147	138	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)	H	746	711	814	542	898	2.0	1.9	2.2	1.5	2.4	100	96	111	88	106	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	F	346	251	387	250	294	0.9	0.7	1.0	0.7	0.8	23	31	34	26	37	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Contusions avec intégrité de la surface cutanée (920-924)	H	632	976	512	712	598	1.7	2.6	1.4	1.9	1.6	182	171	152	165	167	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	F	930	700	1 010	802	620	2.5	1.9	2.7	2.1	1.6	134	143	151	145	120	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Brûlures (940-949)	H	1 323	1 326	1 229	1 316	1 483	3.6	3.6	3.3	3.5	4.0	124	100	94	118	93	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	F	495	634	593	190	462	1.3	1.7	1.6	0.5	1.2	37	46	35	25	31	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)	H	423	377	419	490	386	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	112	83	105	102	82	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	F	600	437	507	309	279	1.6	1.2	1.6	0.8	0.7	75	66	90	70	53	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)	H	1 182	1 031	986	974	799	3.2	2.8	2.6	2.6	2.1	279	319	306	285	249	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
	F	2 195	1 839	1 513	1 257	1 233	5.8	4.9	4.0	3.3	3.2	453	454	394	367	347	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)	H	157	380	528	112	136	0.4	1.0	1.4	0.3	0.4	73	64	59	64	45	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	F	119	201	132	104	224	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6	43	52	32	32	42	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)	H	9 155	7 917	6 376	6 364	6 512	24.6	21.2	17.1	17.0	17.4	844	819	877	859	873	2.3	2.2	2.0	2.3	2.3
	F	7 333	6 941	7 204	6 117	7 161	19.4	18.3	19.0	16.1	18.8	777	775	895	840	893	2.1	2.0	2.4	2.2	2.3
Erreur / inconnue	H	193 681	199 979	320 870	273 080	262 172	519.8	536.0	858.4	730.4	702.6	26 089	27 824	29 428	27 475	27 700	70.2	74.7	78.9	73.5	74.1
	F	245 334	198 457	232 939	280 511	234 993	648.4	524.1	614.3	738.0	618.6	31 519	36 393	35 124	31 940	32 397	83.4	96.2	92.8	84.2	85.2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources.

Tableau 29a **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	23.1	25.2	22.1	14.6	15.1	38.0	38.6	22.2	15.9	29.3
	F	21.1	25.6	19.1	14.7	18.8	24.4	13.3	41.5	21.0	36.4
Tumeurs malignes	H	115.9	119.6	114.2	130.3	121.0	89.3	118.4	134.0	98.9	147.6
Toutes les causes	F	104.1	95.5	107.9	125.0	103.5	93.7	86.7	141.7	68.6	121.4
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	13.6	13.6	13.7	15.0	12.1	14.0	18.9	16.9	7.9	15.8
	F	15.0	14.3	15.3	15.5	15.8	14.6	16.0	16.8	10.0	18.2
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	25.6	31.4	23.0	28.7	18.9	21.3	49.6	38.8	21.8	24.6
	F	14.3	15.6	13.7	17.7	11.7	11.5	13.1	30.6	12.6	13.6
Sein	H	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
	F	17.2	16.7	17.4	26.0	12.1	14.0	11.1	28.6	17.1	14.1
Organes génito-urinaires	H	25.0	18.1	28.2	22.2	45.5	15.8	9.4	28.9	14.6	26.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	51.5	56.6	49.2	64.0	44.3	38.2	40.5	49.3	54.4	81.1
	F	57.6	49.0	61.4	65.9	63.9	53.6	46.5	65.7	29.0	75.6
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	38.4	30.1	42.1	63.2	36.3	25.3	27.0	48.3	27.6	26.0
	F	37.8	40.7	36.5	37.1	41.4	30.3	35.9	58.4	40.4	34.3
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	8.6	10.0	8.0	9.1	7.6	7.3	11.1	7.7	10.7	9.1
	F	10.5	12.1	9.8	10.3	9.2	9.9	12.7	19.8	10.6	8.8
Troubles mentaux	H	145.1	110.9	160.6	167.6	153.8	160.3	180.8	97.6	97.4	71.0
	F	257.6	179.9	291.6	254.7	484.1	115.5	223.2	353.5	122.2	118.0
Autres psychoses	H	57.0	50.2	60.0	81.3	41.5	56.7	69.3	28.6	64.7	19.4
	F	79.6	72.5	82.7	120.4	79.1	44.6	85.8	121.3	61.8	44.2
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	37.5	46.0	33.7	49.7	16.6	34.8	75.7	61.9	26.9	38.6
	F	67.6	79.5	62.4	85.0	54.6	46.0	105.4	114.1	55.2	70.6
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	98.5	83.1	114.5	80.5	121.5	144.2	68.0	116.6	55.0	38.3
Toutes les causes	F	65.2	71.7	62.3	55.5	91.1	37.6	112.3	111.9	41.7	53.5
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	39.6	29.2	44.3	39.9	54.2	38.2	36.3	81.5	19.2	6.3
	F	23.2	21.8	23.8	11.6	50.9	6.8	50.2	18.5	11.9	10.6
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	40.0	11.2	53.0	22.2	50.7	89.4	11.5	6.5	14.0	9.0
	F	18.8	24.0	16.6	18.5	21.7	8.7	37.1	63.1	6.5	14.2
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	14.7	18.5	13.0	15.3	11.4	12.1	17.0	23.8	18.4	16.7
	F	18.0	21.4	16.5	19.4	13.1	17.2	19.4	26.8	19.0	24.3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire Toutes les causes	H	272.5	[illegible]	283.9	255.1	382.5	208.5	255.3	279.7	238.3	233.0
	F	238.8	227.3	243.8	197.5	346.0	180.2	282.6	294.2	184.5	197.7
Cardiopathies ischémiques	H	84.4	87.1	83.2	75.8	96.4	77.2	91.7	78.4	92.2	79.2
	F	54.5	62.2	51.1	51.8	51.0	50.4	68.7	92.3	49.9	56.6
Autres formes de cardiopathies	H	50.9	52.1	50.4	55.8	50.9	43.8	58.7	45.6	50.7	52.0
	F	58.2	57.1	58.7	58.1	66.4	50.8	80.2	68.0	42.2	51.1
Maladies vasculaires cérébrales	H	94.5	80.1	110.0	88.5	185.4	51.8	86.2	94.5	50.6	58.9
	F	85.9	46.1	103.2	66.1	194.3	42.0	49.8	71.6	36.1	42.7
Maladies de l'appareil respiratoire Toutes les causes	H	154.5	192.3	137.4	124.2	149.8	138.6	157.4	212.3	224.7	159.6
	F	128.5	173.3	108.9	104.8	116.1	105.4	133.5	214.7	175.3	185.4
Affections aiguës des voies respiratoires	H	15.8	22.2	12.8	14.6	10.7	13.2	21.1	12.1	25.0	25.1
	F	13.1	20.4	9.9	11.6	6.6	11.7	22.1	14.2	21.8	20.1
Pneumonie et grippe	H	35.6	43.2	32.1	26.0	35.9	34.8	25.7	47.8	51.6	43.9
	F	37.3	49.0	32.2	29.3	34.0	33.3	33.5	62.9	45.2	63.1
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	75.4	92.3	67.8	57.1	79.3	67.0	84.8	131.9	98.4	84.6
	F	54.3	73.2	46.0	38.1	56.9	42.6	46.9	120.9	71.6	72.7
Maladies de l'appareil digestif	H	116.4	160.0	96.7	98.3	103.8	87.2	141.3	213.1	156.6	151.6
	F	131.3	181.4	109.3	98.6	107.0	124.1	155.7	249.1	186.5	155.0
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	21.9	36.0	15.5	12.5	19.1	14.9	26.4	69.0	33.3	29.6
	F	21.5	37.4	14.6	10.6	13.2	20.5	26.3	60.9	36.8	32.6
Entérite et colite non infectieuses	H	14.6	23.0	10.8	10.1	11.4	10.9	18.9	32.5	27.9	13.0
	F	23.8	34.5	19.1	15.2	20.4	21.8	30.4	39.1	41.8	23.0
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	22.2	28.7	19.3	18.8	22.5	16.4	22.6	28.6	27.6	36.9
	F	31.3	40.8	27.1	21.9	28.2	31.5	38.0	57.7	43.2	28.6
Autres maladies de l'appareil digestif	H	32.9	42.1	28.8	30.8	28.4	27.1	39.5	50.8	39.8	44.8
	F	38.5	47.1	34.7	36.9	31.3	36.3	39.8	72.0	42.3	46.9
Maladies des organes génito-urinaires	H	89.7	70.0	69.6	57.5	98.1	51.9	69.0	75.7	75.5	58.1
	F	99.1	138.8	81.7	87.3	77.5	80.2	125.6	118.6	144.3	157.0
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	26.7	28.6	25.9	26.2	30.5	20.6	15.4	37.8	34.8	25.5
	F	26.6	27.7	26.2	27.5	30.2	20.2	19.6	33.7	29.0	29.9
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	25.5	30.1	23.3	24.5	19.4	26.3	33.9	29.9	30.0	26.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	47.9	68.5	38.9	36.6	37.1	43.7	88.1	61.8	53.1	78.8
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	129.1	133.5	127.1	125.5	125.5	130.7	124.2	134.0	123.5	160.9
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.6	34.0	29.1	32.6	27.7	27.0	28.6	31.5	28.7	50.9
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	54.2	57.8	52.5	51.4	55.8	50.1	46.6	66.9	54.9	69.2
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	37.2	34.8	38.2	33.4	37.0	45.0	42.8	28.6	34.5	31.0
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	19.2	15.7	20.7	22.6	18.5	21.0	12.4	33.8	14.0	10.5
	F	22.6	18.9	24.2	23.8	20.2	29.2	16.7	29.8	17.8	15.7
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	H	56.4	61.2	54.2	52.0	50.4	60.7	64.4	70.5	51.8	68.3
	F	88.1	103.9	81.2	66.1	79.5	100.0	173.5	113.0	63.5	93.2
Arthropathies et affections apparentées	H	24.1	22.8	24.7	20.8	22.7	31.1	30.9	22.5	15.2	27.7
	F	43.8	51.8	40.3	27.5	42.3	52.5	103.2	50.3	24.8	44.5
Affections des régions du plan dorsal	H	18.8	23.3	16.8	17.0	15.7	17.7	21.5	27.8	21.7	25.0
	F	20.4	25.5	18.2	14.1	18.6	22.3	19.5	37.7	23.0	28.3
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	8.4	9.8	7.7	8.6	8.6	5.8	8.1	13.0	8.4	12.0
	F	16.1	16.9	15.7	16.2	12.9	18.3	38.0	8.7	8.5	14.3
Anomalies congénitales	H	3.6	4.6	3.1	3.8	2.5	2.9	2.6	2.8	5.2	6.8
	F	5.0	8.2	3.6	2.9	4.0	3.9	2.8	6.6	8.0	15.7
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	1.5	1.6	1.5	0.7	0.3	3.7	2.6	1.6	1.5	0.7
	F	4.8	6.9	3.8	8.0	1.6	1.6	4.2	5.6	8.1	8.9
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	61.8	53.8	65.4	81.8	38.1	77.3	65.3	51.7	51.1	48.0
	F	67.3	70.6	65.9	75.4	66.3	54.7	92.9	93.0	50.3	67.0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	102.2	135.7	87.1	79.3	104.9	76.3	96.8	90.0	87.5	287.0
	F	110.5	87.3	120.6	105.7	185.5	86.6	109.7	105.5	65.9	87.6
Fractures du crâne	H	3.9	4.5	3.7	5.1	3.4	2.3	2.7	2.5	5.5	5.8
	F	1.3	1.2	1.4	3.0	0.5	0.5	0.1	0.2	1.7	2.4
Fractures du cou et du tronc	H	8.2	11.4	6.8	6.8	4.4	9.4	12.1	14.3	10.7	10.0
	F	8.6	9.4	8.3	8.1	7.3	9.5	15.5	18.5	4.6	8.6
Fractures du membre supérieur	H	3.4	4.5	3.0	2.7	2.9	3.3	6.0	2.4	3.9	5.4
	F	6.2	3.9	7.3	8.8	5.3	7.8	5.5	7.2	1.5	4.1
Fractures du membre inférieur	H	18.9	18.0	19.3	21.9	17.9	17.9	18.7	25.9	13.3	20.5
	F	35.2	25.1	39.6	51.1	36.6	30.1	30.9	36.7	19.3	21.4
Entorses	H	2.8	4.2	2.2	2.1	1.7	2.7	4.4	4.1	3.5	5.3
	F	2.6	4.6	1.7	1.1	1.5	2.5	2.4	8.6	3.5	5.2
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	5.0	5.3	4.9	5.6	5.3	3.8	10.0	0.6	5.2	3.5
	F	20.3	1.4	28.5	5.0	76.1	1.2	0.6	0.8	0.9	3.5
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.9	2.0	4.0	0.4	3.3
	F	0.9	0.4	1.1	1.4	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.4
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	1.7	2.3	1.4	0.8	1.6	1.8	2.9	0.9	2.4	2.6
	F	2.5	3.0	2.2	2.5	2.6	1.5	3.9	5.5	2.0	2.0
Brûlures	H	3.6	4.0	3.4	2.9	4.4	2.7	2.8	6.4	4.0	3.8
	F	1.3	1.4	1.3	1.2	1.8	0.7	0.6	0.0	2.7	0.8
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	1.1	1.9	0.8	0.6	0.6	1.3	2.6	1.3	1.3	2.5
	F	1.6	2.4	1.3	0.6	0.6	2.8	0.8	0.5	2.3	5.5
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	3.2	4.6	2.5	1.8	3.2	2.7	6.4	5.0	4.5	2.5
	F	5.8	10.2	3.9	2.5	3.8	5.7	18.3	7.5	7.4	6.3
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.4	0.5	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2	0.9	0.3	0.8
	F	0.3	0.4	0.3	0.1	0.6	0.1	0.6	0.7	0.2	0.4
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	24.6	18.8	27.3	18.0	44.7	18.4	18.1	16.3	21.7	19.1
	F	19.4	19.2	19.5	16.1	24.3	17.9	24.5	17.8	14.7	22.4

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29b **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	15.7	20.0	13.7	13.8	12.4	15.1	13.2	23.4	23.4	19.1
	F	19.8	22.3	18.7	20.3	18.2	17.4	15.7	34.7	21.2	23.0
Tumeurs malignes	H	109.5	117.7	105.8	150.7	85.5	78.2	120.2	123.3	101.9	138.9
Toutes les causes	F	100.9	107.2	96.2	114.8	95.8	82.3	91.0	160.5	101.0	99.9
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	13.5	14.8	12.8	19.0	8.1	11.2	22.1	11.6	8.6	20.0
	F	13.4	11.4	14.3	14.8	15.0	13.1	8.7	18.2	12.0	9.9
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	23.1	31.1	19.5	23.5	19.5	15.3	42.4	47.3	17.0	33.7
	F	12.3	12.3	12.4	14.1	11.2	11.7	8.0	23.4	7.3	18.1
Sein	H	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	16.5	18.7	15.6	21.1	17.1	7.7	10.4	45.8	16.2	14.0
Organes génito-urinaires	H	17.3	16.2	17.9	26.1	13.8	13.2	9.6	16.8	17.1	20.8
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	55.5	55.6	55.5	82.2	44.1	38.4	46.1	47.6	59.1	64.4
	F	58.6	64.8	55.9	64.8	52.6	49.8	63.8	75.1	65.4	57.9
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	25.3	29.7	23.4	18.4	28.8	23.0	28.2	35.7	27.9	30.4
	F	29.8	41.3	24.8	21.4	23.8	29.8	34.8	51.4	39.4	45.2
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	7.3	8.7	6.7	8.4	5.4	6.2	10.6	11.6	7.5	6.9
	F	10.5	13.0	9.5	9.4	10.5	8.5	10.3	16.4	14.5	10.9
Troubles mentaux	H	275.5	422.8	209.5	192.2	316.3	113.3	903.6	213.4	407.1	85.4
	F	204.4	271.8	175.1	167.1	202.8	152.9	261.1	393.1	299.7	153.4
Autres psychoses	H	80.0	138.7	53.7	76.2	44.7	38.5	415.3	56.0	60.5	40.3
	F	88.8	128.6	71.5	81.1	75.9	56.0	136.2	105.9	167.6	67.2
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	62.4	83.9	52.9	102.6	28.9	24.1	224.7	69.7	34.3	33.2
	F	72.5	88.1	65.8	68.5	47.7	83.0	99.1	183.3	52.4	75.1
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	63.4	93.1	50.2	65.4	52.4	31.0	43.4	34.3	170.4	47.9
Toutes les causes	F	59.2	53.0	61.9	52.9	81.6	49.9	71.1	60.6	43.6	44.5
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	13.0	6.5	15.9	33.5	5.7	7.5	6.4	[illegible]	9.6	3.1
	F	19.2	9.2	23.5	13.5	43.8	12.1	14.8	[illegible]	3.3	5.8
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	30.3	64.5	14.9	6.4	31.0	7.0	10.7	10.9	138.4	26.0
	F	12.1	15.2	10.7	10.0	13.2	8.7	23.0	14.7	11.8	12.9
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	15.2	16.5	14.6	20.2	10.5	12.7	16.3	14.9	16.6	17.6
	F	20.3	23.3	19.0	20.9	18.4	17.7	25.9	21.0	22.8	22.9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	237.0	214.4	247.1	229.6	225.1	269.9	201.4	209.4	214.1	231.6
Toutes les causes	F	219.8	208.5	224.7	196.1	297.2	175.6	198.7	234.7	190.4	233.3
Cardiopathies ischémiques	H	68.7	77.3	64.8	73.9	53.4	67.1	79.4	86.0	67.2	87.3
	F	48.8	52.3	47.2	51.0	45.9	44.5	52.1	46.7	45.6	68.1
Autres formes de cardiopathies	H	46.1	48.4	45.1	46.7	47.0	41.3	48.7	51.3	55.1	34.7
	F	54.4	54.2	54.5	54.8	59.1	49.8	59.1	74.2	44.6	52.2
Maladies vasculaires cérébrales	H	79.0	51.2	91.4	61.8	85.7	130.1	28.8	48.3	53.9	71.4
	F	80.1	54.2	91.3	57.7	161.1	50.9	39.4	58.8	51.4	72.0
Maladies de l'appareil respiratoire	H	138.8	165.2	125.9	116.2	128.0	137.6	154.6	174.9	174.5	154.0
Toutes les causes	F	120.5	152.5	106.5	101.5	90.1	130.5	134.7	164.4	148.2	171.3
Affections aiguës des voies respiratoires	H	14.6	22.8	11.0	14.4	7.9	10.5	23.2	16.1	28.5	16.7
	F	14.4	20.3	11.9	13.3	8.1	14.7	20.0	16.7	22.1	19.6
Pneumonie et grippe	H	36.2	42.6	33.3	36.2	30.7	32.8	38.4	33.7	46.7	45.5
	F	33.7	38.4	31.7	31.8	30.5	33.0	29.2	36.9	37.8	50.4
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	58.3	67.5	54.1	42.1	70.6	49.6	65.7	96.6	66.8	52.4
	F	46.9	66.7	38.3	32.2	38.6	44.6	56.9	94.0	58.5	73.7
Maladies de l'appareil digestif	H	108.7	141.5	94.0	99.1	93.1	89.3	130.9	171.2	137.9	140.0
	F	125.6	172.8	105.1	98.8	104.4	113.0	163.5	205.7	183.4	142.6
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	22.4	34.4	17.0	19.4	18.9	12.5	26.0	44.0	33.8	38.1
	F	21.1	36.7	14.4	11.0	16.9	15.2	34.2	62.6	32.6	29.1
Entérite et colite non infectieuses	H	15.2	22.7	11.9	11.6	12.3	11.7	14.7	28.2	26.5	26.1
	F	23.4	35.3	18.2	16.6	16.0	22.4	30.6	35.6	42.8	21.4
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	19.0	21.3	18.0	17.3	16.2	18.4	18.5	32.0	21.3	17.7
	F	30.4	40.8	25.9	22.4	28.1	27.2	42.8	43.7	43.4	32.0
Autres maladies de l'appareil digestif	H	30.1	34.3	28.2	28.7	26.2	30.0	34.1	36.5	31.4	38.0
	F	35.3	41.7	32.5	34.1	29.5	34.0	39.4	38.7	45.5	39.7
Maladies des organes génito-urinaires	H	52.4	59.7	49.1	56.8	46.5	43.4	53.3	63.1	69.0	48.1
	F	91.7	116.6	80.9	84.3	75.9	78.4	121.0	147.7	99.3	121.2
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	22.5	24.4	21.7	22.6	23.7	18.3	13.7	32.5	28.8	22.6
	F	27.3	29.3	26.5	26.2	31.4	21.4	21.4	51.5	23.8	32.6
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	22.3	27.9	19.8	25.2	15.5	18.4	33.7	27.4	31.7	15.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	44.6	62.6	36.8	35.4	33.9	41.7	77.4	64.4	52.6	62.8
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	111.3	114.2	110.1	110.7	103.2	117.0	107.0	117.9	109.6	127.7
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	25.3	30.0	23.2	26.9	23.4	18.9	26.8	34.4	26.7	36.4
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	43.9	47.6	42.2	42.0	45.3	39.1	36.2	51.3	47.2	58.4
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	35.8	30.4	38.1	34.9	30.5	50.3	37.1	26.6	31.1	24.3
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	20.5	18.7	21.3	18.7	22.3	23.0	15.5	24.4	22.1	12.6
	F	17.8	17.9	17.7	14.4	18.1	20.9	16.4	20.6	17.6	18.4
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	53.5	51.2	54.5	47.5	55.4	61.3	65.2	54.5	43.1	48.7
	F	73.9	77.3	72.5	58.9	76.7	82.9	88.2	97.9	62.2	78.2
Arthropathies et affections apparentées	H	23.0	18.1	25.2	20.2	22.7	33.4	24.4	16.2	15.3	17.7
	F	32.4	29.6	33.6	23.8	36.2	41.6	30.0	46.3	22.6	30.3
Affections des régions du plan dorsal	H	16.3	20.6	14.4	11.2	17.1	14.9	26.0	28.9	15.7	18.1
	F	19.0	24.1	16.7	13.3	18.3	18.9	26.8	34.0	19.2	23.1
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	8.4	6.2	9.4	10.0	11.1	7.0	7.0	5.6	5.5	6.7
	F	14.5	14.1	14.6	14.1	15.3	14.6	19.1	8.8	10.4	18.7
Anomalies congénitales	H	5.5	8.2	4.3	3.9	2.6	6.6	7.0	9.9	10.5	4.3
	F	4.5	4.9	4.4	4.3	2.9	6.1	2.9	5.5	5.7	5.2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	1.4	2.4	1.0	1.2	0.3	1.4	2.8	3.8	2.2	1.7
	F	4.6	8.6	2.9	3.9	2.8	2.0	7.6	4.1	10.1	10.0
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	54.3	58.2	52.5	66.7	40.8	49.6	54.4	68.0	57.0	58.2
	F	71.1	81.2	66.7	94.0	45.1	60.4	81.1	124.3	61.7	86.8

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	88.4	88.0	88.6	116.3	79.1	68.4	104.1	90.1	67.9	104.5
	F	87.4	86.6	87.8	102.1	85.1	74.7	86.2	106.4	68.7	105.0
Fractures du crâne	H	3.0	2.2	3.4	2.3	5.4	2.6	1.7	1.8	2.2	2.9
	F	0.9	1.2	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4
Fractures du cou et du tronc	H	7.0	8.2	6.5	4.2	6.2	9.4	15.0	4.8	3.6	11.3
	F	8.0	9.8	7.2	8.3	7.1	6.0	7.6	9.4	7.9	16.0
Fractures du membre supérieur	H	4.0	5.1	3.4	3.7	2.8	3.8	6.9	7.0	3.5	4.9
	F	5.0	5.2	5.0	5.7	4.1	5.1	2.9	12.1	4.2	4.8
Fractures du membre inférieur	H	17.6	18.5	17.1	18.9	15.2	17.3	21.4	30.4	14.5	15.0
	F	35.5	28.2	38.7	51.7	34.7	28.7	32.8	50.4	20.3	22.4
Entorses	H	2.2	2.9	1.9	2.5	1.4	1.7	3.0	4.2	2.0	3.5
	F	2.0	2.8	1.6	1.3	1.3	2.3	1.6	4.1	3.5	2.0
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	12.1	3.8	15.9	33.3	10.6	2.4	3.0	3.8	4.8	2.8
	F	2.2	1.1	2.7	4.1	1.5	2.4	2.1	0.5	0.9	0.9
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	1.9	3.0	1.4	1.7	1.1	1.5	3.3	2.7	3.9	1.3
	F	0.7	0.5	0.7	0.9	0.3	1.0	0.6	0.7	0.6	0.0
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	2.6	4.0	2.0	2.4	1.4	2.3	7.0	2.4	1.4	6.2
	F	1.9	2.4	1.6	1.2	1.6	2.1	1.9	1.9	3.4	1.3
Brûlures	H	3.6	5.9	2.5	3.2	2.1	2.2	7.0	6.6	3.2	9.1
	F	1.7	3.0	1.1	1.3	1.7	0.1	0.2	1.0	1.1	11.0
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	1.0	1.6	0.8	1.0	0.5	0.9	0.6	2.9	1.9	1.1
	F	1.2	2.0	0.8	0.4	0.7	1.5	1.8	0.0	2.0	3.4
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	2.8	4.6	1.9	2.0	1.5	2.3	6.3	3.4	3.6	5.3
	F	4.9	7.0	4.0	3.9	3.3	4.7	7.9	6.9	5.6	8.4
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	1.0	1.1	0.9	1.8	0.3	0.7	1.1	0.5	0.6	2.1
	F	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.1	0.3	0.5	0.4	0.7
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	21.2	16.5	23.4	33.9	23.1	12.2	17.3	12.0	10.7	28.6
	F	18.3	16.2	19.3	18.1	24.1	15.1	15.1	14.1	13.6	23.2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilis ressources hospitalières.

Tableau 29c **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	16.4	19.1	15.2	15.9	13.8	16.0	17.4	26.3	18.0	18.3
	F	16.8	20.2	15.3	15.0	10.6	20.8	19.6	24.4	19.8	18.8
Tumeurs malignes	H	105.6	124.5	97.3	144.2	65.6	79.6	128.7	177.3	109.8	112.6
Toutes les causes	F	85.0	89.2	83.2	115.4	61.5	71.5	72.2	131.7	91.1	76.1
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	11.7	12.3	11.5	14.3	9.1	11.0	11.0	19.8	10.8	11.6
	F	11.8	11.2	12.0	15.8	9.3	10.7	10.6	12.9	11.5	10.3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	24.5	35.3	19.8	30.8	13.7	14.1	52.1	61.8	26.3	16.8
	F	11.2	10.2	11.6	19.0	7.5	8.0	8.7	25.6	6.4	8.1
Sein	H	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3
	F	11.1	14.9	9.5	13.7	7.7	6.8	9.0	15.0	16.5	18.4
Organes génito-urinaires	H	13.3	15.9	12.1	20.2	7.2	8.4	11.8	9.9	16.8	22.5
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	56.0	60.9	53.9	78.8	35.6	46.1	53.8	85.8	55.9	61.5
	F	51.0	52.9	50.1	66.9	37.0	46.0	43.9	78.1	56.7	39.3
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	28.1	23.9	29.9	31.1	32.6	25.9	19.3	32.0	22.9	25.2
	F	27.8	36.9	23.9	19.3	26.5	26.2	41.5	44.1	38.3	24.6
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	7.6	10.8	6.2	8.2	6.3	3.9	8.0	12.1	12.3	10.3
	F	10.6	13.3	9.5	11.0	9.4	7.9	8.6	18.4	17.1	8.5
Troubles mentaux	H	714.4	1761.5	251.1	240.1	257.9	256.0	629.3	9970.1	107.0	664.4
	F	402.3	897.1	189.6	160.1	226.0	182.1	860.3	2626.7	665.6	182.4
Autres psychoses	H	241.5	608.1	79.4	148.9	57.6	26.2	78.3	3924.2	61.6	28.1
	F	147.8	322.7	72.6	83.8	58.6	64.6	143.1	1410.6	149.2	96.0
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	74.2	170.4	31.6	33.1	29.7	32.0	55.6	948.1	30.6	44.5
	F	76.3	135.5	50.8	52.3	61.8	36.9	174.1	314.9	84.5	62.8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	62.6	34.2	75.2	112.7	35.1	76.8	37.2	33.7	33.2	32.7
Toutes les causes	F	71.5	42.5	84.0	37.3	174.1	36.4	46.5	35.4	40.5	46.5
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	27.9	6.4	37.5	46.4	14.0	52.7	4.3	6.6	8.8	4.3
	F	16.5	8.9	19.8	3.5	48.3	6.4	7.8	7.8	10.1	6.8
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	10.0	9.5	10.2	16.5	4.2	9.7	11.7	12.6	8.3	7.2
	F	29.6	8.7	38.6	6.1	99.9	7.2	11.1	8.1	7.5	8.8
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	14.5	15.9	14.0	17.2	12.1	12.4	18.1	12.6	14.6	17.7
	F	20.1	21.6	19.5	23.4	16.8	18.3	21.8	14.9	20.9	27.0

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	236.1	219.0	243.7	307.4	209.5	210.1	224.1	253.3	197.0	230.5
Toutes les causes	F	193.6	205.9	188.4	212.4	194.9	154.3	218.5	249.3	178.9	210.6
Cardiopathies ischémiques	H	69.6	74.2	67.6	79.8	53.9	68.8	70.7	78.0	73.3	77.2
	F	50.3	58.2	46.9	47.4	42.1	51.5	52.9	70.4	50.0	70.6
Autres formes de cardiopathies	H	51.4	49.7	52.2	66.0	47.8	41.6	49.7	54.9	46.9	51.2
	F	50.9	54.3	49.5	56.3	50.1	41.2	60.3	68.9	46.6	51.6
Maladies vasculaires cérébrales	H	68.7	51.1	76.6	96.5	66.5	65.4	52.9	71.5	36.7	61.6
	F	59.5	50.2	63.6	80.6	71.7	35.5	55.3	68.5	40.3	49.6
Maladies de l'appareil respiratoire	H	146.3	152.8	143.5	104.1	115.5	216.7	149.6	130.4	165.2	148.6
Toutes les causes	F	122.3	151.5	109.7	114.3	106.0	108.8	120.1	179.3	157.1	157.3
Affections aiguës des voies respiratoires	H	13.0	20.1	9.8	10.3	6.8	12.4	18.0	16.5	24.0	17.8
	F	11.1	16.3	8.9	10.6	4.0	12.4	15.9	12.4	18.2	16.1
Pneumonie et grippe	H	34.8	40.7	32.2	30.2	33.7	32.8	30.4	36.3	47.7	42.0
	F	35.3	41.5	32.6	28.6	35.4	33.9	22.7	57.3	43.1	49.1
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	56.6	63.3	53.6	35.5	52.5	74.6	72.2	64.5	58.1	62.4
	F	49.8	65.0	43.3	45.5	38.9	45.6	53.9	91.4	58.0	71.6
Maladies de l'appareil digestif	H	108.5	135.9	96.3	112.1	85.1	91.0	107.3	157.4	140.5	144.5
	F	125.0	175.3	103.3	106.3	97.0	106.9	169.8	218.0	179.8	144.7
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	20.7	26.9	17.9	23.2	15.7	14.4	17.4	36.7	26.9	30.7
	F	22.1	32.9	17.5	19.7	18.2	14.2	24.2	64.7	27.5	30.8
Entérite et colite non infectieuses	H	14.8	21.2	11.9	14.8	8.8	12.0	14.8	22.6	27.3	16.3
	F	23.2	35.9	17.7	16.5	15.6	21.4	30.2	42.1	38.2	34.0
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	21.0	26.2	18.7	20.4	18.5	17.1	19.0	27.5	31.6	23.5
	F	31.1	45.9	24.6	24.6	25.6	23.7	52.2	54.6	50.6	24.7
Autres maladies de l'appareil digestif	H	31.6	37.9	28.8	31.5	24.8	30.0	26.3	48.3	35.0	48.6
	F	34.3	44.2	30.1	29.6	24.7	36.6	45.0	38.0	48.3	40.1
Maladies des organes génito-urinaires	H	50.7	57.8	47.5	52.0	51.0	38.7	35.2	67.4	66.1	60.9
	F	87.3	103.9	80.1	81.4	83.0	75.5	113.0	122.6	85.7	113.5
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	23.8	27.2	22.3	22.0	25.2	19.7	14.3	32.5	33.6	26.2
	F	25.9	28.4	24.9	23.9	30.6	19.5	24.3	35.5	23.4	37.0
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	18.8	22.0	17.3	20.9	16.3	14.5	15.3	26.3	25.0	21.3
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	42.5	54.0	37.6	35.1	37.2	40.8	66.6	51.6	45.9	56.1
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	97.6	100.8	96.3	99.4	86.7	103.4	101.4	102.8	90.4	117.4
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	21.8	25.4	20.3	23.4	19.6	17.4	20.3	34.1	20.5	34.0
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	37.5	43.5	34.9	36.5	35.8	32.3	40.8	44.5	39.3	53.3
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	32.6	26.8	35.1	33.0	27.0	46.4	34.8	19.3	26.9	23.1
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	18.5	20.5	17.6	17.2	15.3	20.6	18.3	26.2	16.9	25.7
	F	17.7	14.7	19.0	20.4	16.5	20.4	8.3	17.6	14.2	20.6
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	48.2	50.8	47.0	42.0	47.4	52.0	57.8	69.9	43.0	44.8
	F	71.3	73.2	70.4	64.6	74.8	72.0	88.3	100.1	58.0	65.6
Arthropathies et affections apparentées	H	22.6	21.6	23.1	20.8	22.5	26.2	24.1	31.2	16.0	22.8
	F	34.4	31.1	35.8	29.7	39.6	38.4	38.7	39.2	24.6	28.9
Affections des régions du plan dorsal	H	13.1	17.4	11.2	9.3	12.1	12.1	16.1	24.8	16.8	15.0
	F	15.9	21.2	13.6	11.1	15.7	14.2	21.2	29.5	19.0	19.7
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	7.3	6.5	7.7	7.6	6.4	9.1	12.0	7.7	5.2	2.4
	F	12.8	11.5	13.4	16.3	12.7	10.8	18.6	21.4	5.4	7.8
Anomalies congénitales	H	26.9	79.0	3.8	2.1	4.7	4.8	4.1	1.8	4.6	336.3
	F	3.6	4.3	3.3	3.8	3.0	3.2	0.8	2.0	8.2	3.0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.9	1.4	0.6	0.7	0.3	1.0	1.0	1.3	1.6	1.4
	F	3.0	6.8	1.3	1.5	0.7	1.7	3.1	4.4	9.1	8.6
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	58.6	64.3	56.1	79.7	37.3	50.3	55.8	55.1	57.0	91.9
	F	67.0	84.1	59.6	72.2	46.0	60.8	91.1	84.6	69.3	102.6

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	76.1	81.4	73.7	89.6	58.8	72.2	89.3	97.8	66.9	88.3
	F	88.9	85.7	90.2	98.9	93.8	76.6	90.4	109.9	73.1	86.5
Fractures du crâne	H	4.0	5.8	3.1	2.6	3.5	3.2	2.1	14.0	3.2	9.2
	F	0.9	0.8	0.9	1.2	0.6	1.1	0.3	0.4	1.5	0.6
Fractures du cou et du tronc	H	6.5	9.1	5.3	5.4	3.3	7.4	16.4	16.3	4.0	5.9
	F	8.1	12.7	6.1	6.8	6.5	4.9	12.2	23.0	12.3	6.9
Fractures du membre supérieur	H	3.7	5.6	2.9	2.3	2.7	3.8	8.1	5.6	4.6	4.5
	F	4.7	5.3	4.4	5.1	3.8	4.3	4.7	4.7	4.4	8.0
Fractures du membre inférieur	H	17.3	17.1	17.3	23.7	10.9	17.3	17.4	24.1	14.7	16.6
	F	33.3	24.5	37.1	47.0	32.5	31.1	28.7	18.1	19.9	32.3
Entorses	H	1.8	3.3	1.1	1.0	1.1	1.2	2.7	5.9	2.9	3.1
	F	1.7	3.0	1.1	1.0	1.1	1.1	2.8	9.9	1.7	1.0
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	4.4	2.7	5.1	9.8	2.0	3.1	2.6	2.9	2.1	3.8
	F	5.8	2.0	7.5	2.7	17.4	2.0	0.9	6.3	0.7	2.4
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	2.2	2.3	2.1	1.3	2.3	2.8	3.0	0.7	2.3	2.5
	F	1.0	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.8	1.5	0.9	1.0
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	1.4	2.2	1.0	1.1	0.8	1.1	2.8	1.2	1.3	3.9
	F	2.7	3.2	2.4	2.3	1.4	3.7	3.6	4.5	2.4	3.3
Brûlures	H	3.3	2.2	3.8	5.0	2.7	3.7	2.7	0.6	2.8	1.6
	F	1.6	2.6	1.1	1.8	1.4	0.1	4.2	0.1	3.6	0.8
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	1.1	1.3	1.1	1.6	0.8	0.7	0.7	0.6	1.2	2.4
	F	1.6	2.1	1.4	0.6	2.0	1.6	3.7	1.5	0.9	2.8
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	2.6	4.7	1.7	1.8	1.5	1.9	4.9	3.8	3.4	7.4
	F	4.0	6.9	2.8	2.4	2.9	3.0	6.1	7.1	8.6	4.4
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	1.4	0.9	1.7	0.1	4.6	0.2	1.6	0.1	0.9	0.6
	F	0.3	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.9	0.1
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	17.1	11.9	19.4	23.7	17.9	16.2	12.8	13.1	9.7	14.2
	F	19.0	15.3	20.6	23.3	19.4	18.9	16.1	26.0	10.6	15.7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29d **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	15.7	17.1	15.0	17.4	12.0	15.6	21.2	18.1	15.7	14.8
	F	15.4	18.0	14.3	12.7	15.2	15.1	10.6	33.3	16.0	19.4
Tumeurs malignes	H	93.0	111.4	85.0	115.5	68.4	68.9	98.4	115.2	107.6	129.7
Toutes les causes	F	81.0	95.0	75.0	107.7	59.8	55.2	83.4	138.4	89.5	88.5
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	11.1	10.5	11.4	15.9	8.2	9.8	10.0	8.6	11.1	11.2
	F	10.7	9.3	11.3	15.1	8.8	9.8	8.8	17.6	7.5	7.3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	20.0	28.3	16.4	22.8	10.2	16.0	33.3	29.6	24.7	28.6
	F	10.8	13.7	9.6	11.9	11.5	5.1	14.9	13.9	9.8	19.2
Sein	H	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
	F	10.7	14.0	9.4	14.3	4.7	9.0	8.1	27.2	14.7	10.4
Organes génito-urinaires	H	11.1	14.5	9.6	13.4	7.5	7.6	6.9	9.5	11.5	31.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	50.7	58.0	47.5	53.3	42.6	35.4	48.2	67.6	60.3	58.5
	F	48.7	58.1	44.7	66.4	34.9	31.3	51.6	79.7	57.5	51.6
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	24.0	26.3	23.0	19.8	26.0	23.3	20.7	34.1	27.4	25.4
	F	27.0	33.4	24.2	17.1	30.8	25.0	21.4	39.1	42.5	26.4
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	8.0	10.2	7.0	8.2	7.0	5.6	11.7	13.2	8.8	9.1
	F	9.8	11.7	9.0	9.0	10.9	7.0	15.3	13.3	10.6	8.9
Troubles mentaux	H	466.4	1042.2	215.3	153.8	386.5	102.1	1170.9	2189.5	760.4	671.8
	F	491.7	1122.6	222.3	268.4	180.1	217.2	1186.6	888.5	999.6	1430.2
Autres psychoses	H	142.0	344.4	53.7	65.4	56.3	38.0	153.1	1959.5	55.6	30.7
	F	144.4	316.6	70.9	85.6	64.3	61.9	288.7	599.7	65.0	606.4
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	37.6	74.3	21.6	20.2	24.3	20.2	128.2	151.8	30.1	45.7
	F	52.0	65.8	46.1	48.5	50.9	38.2	65.9	135.1	43.5	58.8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	134.0	154.5	125.0	35.8	190.8	153.4	21.8	34.2	26.7	601.0
Toutes les causes	F	47.4	67.1	39.0	32.8	49.6	34.2	160.4	54.8	29.7	38.4
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	69.1	129.5	42.7	12.4	93.7	22.2	2.2	8.0	3.9	567.0
	F	17.7	38.8	8.7	6.8	14.2	4.8	130.9	21.7	6.0	6.5
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	48.1	7.7	65.7	4.8	80.0	117.3	3.5	8.7	7.9	11.2
	F	8.4	8.1	8.5	5.9	11.5	8.1	9.1	11.1	6.2	8.5
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	13.6	15.1	12.9	14.4	12.7	11.5	13.8	15.0	13.5	19.4
	F	17.0	17.6	16.7	16.3	16.6	17.4	17.9	16.7	16.2	20.3

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	247.7	232.9	254.2	325.1	270.6	159.2	208.3	215.1	198.5	331.9
Toutes les causes	F	175.0	208.9	160.6	164.6	167.3	148.7	187.9	266.7	186.3	233.5
Cardiopathies ischémiques	H	67.3	79.0	62.2	74.9	48.2	63.0	83.7	74.6	80.3	74.4
	F	44.5	49.5	42.4	45.8	32.7	49.1	48.3	50.3	40.7	66.1
Autres formes de cardiopathies	H	54.3	47.7	57.2	47.7	83.3	40.0	52.6	44.6	49.9	40.7
	F	49.5	59.4	45.2	43.6	47.3	44.7	63.4	94.3	51.0	46.3
Maladies vasculaires cérébrales	H	93.5	69.6	104.0	169.6	101.9	34.2	37.9	39.5	33.6	186.9
	F	46.6	58.6	41.5	40.1	53.7	29.8	48.9	67.9	48.2	81.6
Maladies de l'appareil respiratoire	H	132.8	129.0	134.5	139.3	160.6	101.7	144.4	120.6	131.4	113.6
Toutes les causes	F	104.8	119.6	98.5	102.1	96.8	96.2	109.7	135.2	126.0	108.6
Affections aiguës des voies respiratoires	H	11.2	14.8	9.6	11.1	6.4	11.4	12.8	18.3	16.2	12.0
	F	10.6	15.6	8.4	10.5	5.3	9.6	18.1	16.4	15.4	12.8
Pneumonie et grippe	H	36.4	36.1	36.5	29.2	49.8	30.5	27.5	46.6	43.0	26.4
	F	30.7	33.0	29.7	28.1	31.2	30.0	17.7	38.8	40.1	33.4
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	44.6	50.7	42.0	49.9	36.4	39.1	62.6	41.3	45.5	53.2
	F	43.0	50.1	40.0	34.3	45.2	40.5	51.4	65.3	45.7	46.3
Maladies de l'appareil digestif	H	103.5	117.3	97.5	114.1	86.6	90.7	92.3	137.3	125.5	116.7
	F	116.2	150.9	101.3	94.3	97.9	113.0	165.0	204.9	140.1	117.8
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	19.1	23.5	17.2	14.8	19.3	17.6	17.2	24.9	25.7	25.7
	F	21.3	30.2	17.4	16.5	18.5	17.3	23.9	55.2	27.3	25.5
Entérite et colite non infectieuses	H	12.7	16.0	11.3	13.0	9.7	11.1	8.3	15.8	20.1	17.3
	F	18.4	25.6	15.3	9.0	15.1	22.6	20.3	38.8	26.9	20.5
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	19.2	21.9	18.1	18.8	17.0	18.5	20.3	20.4	24.7	19.4
	F	31.7	38.3	28.9	28.4	25.0	33.7	41.6	48.4	39.3	26.0
Autres maladies de l'appareil digestif	H	29.5	35.1	27.0	29.5	25.3	26.1	20.0	56.3	36.7	35.1
	F	32.0	40.1	28.5	29.5	27.6	28.5	50.8	42.3	30.8	32.3
Maladies des organes génito-urinaires	H	44.4	49.0	42.3	43.7	41.4	42.0	47.1	46.9	51.6	47.7
	F	80.7	107.2	69.3	72.6	70.1	64.8	125.3	118.4	90.6	109.1
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	21.8	21.0	22.1	17.7	22.9	26.1	10.4	21.8	25.6	23.6
	F	23.9	27.0	22.6	19.8	29.4	18.2	19.2	39.8	28.4	24.7
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	14.1	15.1	13.6	15.6	13.3	11.7	13.3	18.7	15.2	14.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	38.4	53.2	32.1	34.7	27.6	33.9	65.3	50.0	44.9	56.7
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	88.8	87.3	89.4	84.3	82.7	102.4	82.0	82.8	78.0	112.9
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	19.0	18.6	19.1	17.6	21.8	17.9	16.4	22.0	14.1	26.8
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	34.3	36.2	33.4	29.4	32.8	38.7	30.3	30.6	32.9	52.3
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.3	27.4	31.6	31.5	24.6	39.3	30.8	23.9	27.8	25.3
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	17.4	16.5	17.7	18.6	18.0	16.5	12.1	24.7	16.5	16.1
	F	16.5	16.0	16.7	19.3	13.4	17.4	6.3	21.4	18.9	18.3
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	61.5	44.5	69.0	45.4	109.6	51.9	44.6	63.1	32.9	53.1
	F	72.2	83.1	67.5	59.2	72.4	71.5	97.7	96.0	63.5	92.9
Arthropathies et affections apparentées	H	25.5	17.0	29.1	22.1	36.8	28.7	17.4	27.9	12.9	17.0
	F	32.6	36.2	31.1	25.1	37.8	30.5	50.2	49.5	21.8	37.6
Affections des régions du plan dorsal	H	12.8	15.6	11.5	8.5	15.3	10.8	13.4	22.9	10.0	23.3
	F	15.9	19.3	14.4	11.1	14.2	18.3	14.9	20.4	16.6	28.4
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	18.0	6.5	23.0	9.0	51.9	8.0	8.0	5.8	5.0	8.0
	F	14.9	17.1	14.0	13.7	14.4	14.0	15.7	16.7	18.8	15.8
Anomalies congénitales	H	3.3	2.7	3.5	3.6	3.8	3.0	2.4	1.7	3.0	3.2
	F	3.8	6.4	2.7	2.6	2.6	2.7	4.0	2.9	11.0	3.0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	2.4	3.5	1.9	1.3	2.3	2.3	1.6	1.9	6.6	1.1
	F	1.0	1.2	0.9	1.4	0.6	0.6	0.7	0.0	1.8	1.5
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	52.7	55.4	51.5	57.0	51.8	45.2	45.7	56.3	54.3	67.0
	F	62.7	76.8	56.8	65.8	48.9	55.3	65.3	97.8	54.5	115.2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	72.1	82.6	67.5	65.1	68.0	69.4	90.7	88.1	78.2	78.0
	F	79.1	82.5	77.7	84.1	82.0	65.7	82.0	102.3	58.7	112.1
Fractures du crâne	H	3.4	4.4	3.0	2.6	3.0	3.2	3.5	3.7	6.5	2.0
	F	1.1	0.6	1.4	1.9	1.4	0.8	0.5	1.1	0.4	0.7
Fractures du cou et du tronc	H	7.9	9.8	7.1	6.6	7.2	7.5	13.2	12.4	8.4	6.8
	F	8.7	11.2	7.6	8.2	7.9	6.7	13.0	13.3	7.4	14.6
Fractures du membre supérieur	H	4.8	6.7	4.0	3.8	3.8	4.3	8.3	4.4	6.9	5.9
	F	6.7	8.2	6.0	7.0	6.3	4.6	9.3	6.0	3.8	16.5
Fractures du membre inférieur	H	15.7	19.1	14.2	15.2	13.8	13.5	21.7	22.6	15.7	20.0
	F	30.3	27.6	31.5	38.2	35.7	19.2	27.0	37.5	19.7	35.5
Entorses	H	2.2	2.6	2.1	1.0	3.2	2.0	2.4	2.7	2.7	2.7
	F	1.6	2.6	1.1	0.6	0.7	2.2	0.9	5.2	2.0	3.6
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	2.9	1.8	3.3	3.8	3.0	3.1	2.0	2.4	1.1	2.5
	F	2.3	2.2	2.3	1.3	3.7	2.0	5.0	0.9	0.8	2.6
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	1.5	1.5	1.4	1.7	0.8	1.9	1.1	2.4	1.6	1.0
	F	0.7	0.6	0.7	1.3	0.5	0.2	0.2	2.4	0.4	0.3
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	1.9	3.4	1.3	1.0	1.3	1.6	2.9	4.5	4.1	2.0
	F	2.1	2.1	2.1	1.4	2.7	2.3	1.6	4.1	1.6	2.3
Brûlures	H	3.5	3.1	3.7	4.4	3.2	3.6	1.1	5.1	3.0	4.0
	F	0.5	0.7	0.4	0.5	0.1	0.7	1.2	0.1	1.0	0.2
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	1.3	2.2	0.9	0.3	1.5	1.0	3.6	0.5	2.5	1.3
	F	0.8	1.5	0.5	0.6	0.3	0.7	0.3	2.0	2.1	1.6
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	2.6	4.2	1.9	2.2	1.6	1.9	3.9	2.6	5.0	4.0
	F	3.3	5.9	2.2	1.6	1.2	4.0	7.9	3.8	6.1	5.1
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3	1.0
	F	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.7
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	17.0	13.6	18.5	17.3	19.7	18.5	18.3	13.1	11.0	13.6
	F	16.1	12.5	17.7	18.9	18.3	15.6	11.0	22.7	8.7	14.1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29e **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	56.2	17.0	73.2	14.0	190.6	14.7	17.1	22.4	16.8	14.0
	F	17.4	20.5	16.1	14.2	19.1	14.8	21.6	25.1	16.5	23.3
Tumeurs malignes	H	90.1	97.2	87.0	105.7	93.5	59.8	68.5	95.3	97.3	129.3
Toutes les causes	F	80.8	75.4	83.1	91.8	87.9	68.0	54.4	90.1	84.7	72.4
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	10.5	3.7	6.8	2.5	2.6	1.8	1.1	0.6	1.3	0.7
	F	13.9	12.5	14.5	14.7	17.7	10.7	9.2	14.7	13.9	12.2
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	16.8	21.9	14.6	14.8	18.9	9.9	14.1	18.6	23.5	29.8
	F	8.7	9.3	8.5	8.7	8.7	8.0	9.2	7.2	9.5	10.5
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	F	8.5	10.3	7.7	11.2	4.5	7.3	8.3	11.1	11.3	10.4
Organes génito-urinaires	H	11.6	10.9	11.8	14.4	13.9	6.8	7.4	5.7	12.0	16.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	51.2	52.2	50.8	66.2	49.7	34.9	32.3	56.0	50.9	73.6
	F	49.7	43.3	52.4	57.2	57.0	42.1	27.7	57.1	50.0	39.2
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	27.6	23.4	29.4	18.1	45.3	25.0	14.2	28.6	25.4	26.2
	F	28.8	31.3	27.7	29.3	28.6	24.7	27.4	45.1	27.4	33.5
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	7.5	11.6	5.7	5.5	6.0	5.7	9.8	13.2	13.7	8.9
	F	9.9	12.5	8.8	8.1	9.0	9.4	10.4	17.2	14.0	8.8
Troubles mentaux	H	262.6	502.5	158.5	125.6	270.9	76.4	1260.7	173.6	142.8	535.2
	F	378.1	772.7	210.5	214.1	160.1	261.7	1034.9	692.7	459.4	1095.5
Autres psychoses	H	89.0	120.4	75.3	68.8	109.1	46.9	207.3	65.0	63.3	163.7
	F	174.4	423.6	68.6	78.2	62.5	64.5	958.6	98.7	68.9	681.3
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	28.9	39.6	24.3	31.0	20.2	21.3	48.0	63.1	20.8	49.2
	F	61.1	121.8	35.3	29.1	39.5	37.8	58.4	535.3	29.5	78.6
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	81.5	139.0	56.6	35.2	105.5	26.5	34.3	758.0	31.6	49.8
Toutes les causes	F	66.4	95.2	54.1	43.6	78.5	39.1	35.0	421.7	40.9	39.1
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	55.9	113.1	31.1	11.6	74.7	6.6	10.3	725.0	10.8	17.1
	F	32.0	65.1	17.9	13.6	30.0	9.5	2.8	387.7	14.2	7.6
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	8.0	8.9	7.7	5.2	12.2	5.6	4.7	13.4	5.9	15.7
	F	11.1	7.3	12.6	7.0	21.9	8.6	12.1	6.4	5.4	6.2
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	13.7	13.7	13.7	13.9	14.4	12.6	13.2	15.1	12.9	14.8
	F	18.1	18.0	18.1	18.5	19.0	16.8	15.4	21.5	18.3	18.1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire Toutes les causes	H	202.3	217.3	195.6	207.7	210.9	186.6	182.4	258.7	172.4	308.2
	F	182.6	192.3	178.5	180.6	211.3	140.4	177.4	245.8	172.3	208.5
Cardiopathies ischémiques	H	64.5	76.5	59.3	61.4	48.3	68.6	76.6	79.6	67.5	90.3
	F	45.4	53.5	42.0	45.6	38.7	41.4	49.7	62.0	48.7	60.7
Autres formes de cardiopathies	H	47.8	50.2	46.7	49.5	44.8	45.7	51.7	70.5	40.3	53.2
	F	54.1	62.9	50.3	48.3	60.4	41.5	53.4	96.3	55.5	64.2
Maladies vasculaires cérébrales	H	49.8	47.1	51.0	48.6	76.8	26.5	17.4	41.7	30.7	111.6
	F	51.2	41.7	55.2	54.5	76.2	33.0	42.2	42.4	34.6	53.2
Maladies de l'appareil respiratoire Toutes les causes	H	120.6	140.1	112.2	123.6	115.5	96.1	131.1	138.6	149.7	133.9
	F	112.2	129.8	104.7	104.2	104.8	105.3	124.5	136.8	137.2	117.6
Affections aiguës des voies respiratoires	H	10.5	14.6	8.6	11.1	5.7	9.0	12.7	17.9	15.3	13.4
	F	8.9	14.2	6.6	7.0	4.2	8.7	13.7	12.1	16.5	12.2
Pneumonie et grippe	H	40.5	41.4	40.1	48.9	40.0	30.5	24.7	48.3	50.3	39.0
	F	35.8	41.2	33.5	30.6	36.5	33.4	17.2	48.0	48.3	50.6
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	46.3	58.7	41.0	38.4	45.8	38.7	66.3	57.9	52.3	62.4
	F	44.9	52.9	41.5	40.2	42.4	41.9	67.5	68.3	44.9	40.5
Maladies de l'appareil digestif	H	97.1	119.6	87.3	83.9	96.4	81.5	110.5	146.7	120.6	110.4
	F	113.5	139.1	102.6	90.7	107.9	110.0	131.4	196.3	132.4	120.9
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	17.8	21.7	16.1	11.7	20.2	16.5	23.3	32.3	19.9	16.5
	F	18.4	23.3	16.4	12.6	19.3	17.4	23.0	43.6	21.2	13.7
Entérite et colite non infectieuses	H	12.7	17.6	10.6	10.9	10.1	10.9	11.8	18.6	23.4	13.0
	F	17.9	24.0	15.4	14.2	13.6	18.6	18.8	37.0	24.0	21.3
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	20.5	25.9	18.2	19.8	20.7	13.7	24.9	29.7	29.4	18.5
	F	31.3	36.8	28.2	25.8	28.0	31.0	32.0	63.8	36.6	33.5
Autres maladies de l'appareil digestif	H	28.4	35.2	25.5	23.8	28.3	24.4	27.8	45.0	33.0	40.7
	F	32.4	37.5	30.2	26.1	35.1	29.6	41.2	35.1	38.5	33.0
Maladies des organes génito-urinaires	H	43.2	46.1	42.0	51.7	37.9	35.5	29.7	48.1	58.9	40.0
	F	74.8	92.1	67.5	77.6	58.1	66.3	90.0	102.8	81.5	106.3
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	19.5	19.8	19.4	19.6	20.0	18.5	12.4	19.7	25.6	17.7
	F	22.0	24.4	20.9	19.7	20.8	22.4	21.0	26.6	27.3	21.7
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	14.2	16.9	13.0	14.0	11.0	14.0	12.5	17.1	21.2	13.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*Source : **Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.***

Tableau 29e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	35.5	47.4	30.5	34.6	24.9	32.1	54.2	50.0	37.5	55.6
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	84.8	91.1	82.2	79.2	72.9	95.7	81.9	96.4	85.4	107.8
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	20.0	22.5	19.0	18.7	19.4	19.0	16.9	28.2	19.4	30.4
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	31.5	35.7	29.7	25.3	29.8	34.6	28.6	36.9	33.4	46.9
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	27.8	27.0	28.1	28.7	20.9	35.4	32.6	22.7	27.8	22.4
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	19.9	22.0	19.0	22.2	14.4	20.2	15.9	19.1	19.9	34.0
	F	15.5	15.8	15.3	11.7	18.2	16.1	10.5	23.1	15.5	17.5
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	48.0	52.2	46.2	43.6	47.8	47.5	50.9	79.4	34.9	67.1
	F	67.5	64.3	68.9	68.0	66.4	72.6	72.5	79.0	52.7	66.0
Arthropathies et affections apparentées	H	21.2	20.6	21.5	18.4	23.3	22.9	20.3	29.0	14.9	25.9
	F	31.4	26.8	33.3	26.7	37.5	36.2	30.7	36.4	21.3	25.7
Affections des régions du plan dorsal	H	13.4	18.6	11.1	8.6	13.0	12.0	17.6	33.7	7.8	29.3
	F	14.1	16.6	13.1	12.1	13.7	13.4	13.5	22.9	14.8	18.9
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	6.2	5.6	6.4	5.5	7.0	6.8	7.7	7.7	4.1	4.6
	F	12.2	12.5	12.0	13.5	9.6	12.8	16.5	10.8	9.7	14.2
Anomalies congénitales	H	4.2	3.5	4.5	5.2	4.8	3.4	2.4	1.2	4.3	4.6
	F	2.7	2.8	2.7	3.1	3.3	1.7	1.4	3.2	2.8	3.7
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	3.0	4.8	2.2	1.4	4.4	0.7	4.8	6.9	6.1	1.3
	F	1.8	4.4	0.6	1.0	0.2	0.7	6.0	5.2	2.7	5.2
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	51.8	53.7	51.0	72.9	35.5	43.3	52.2	53.7	43.8	72.6
	F	70.9	66.8	72.6	109.6	49.1	56.9	56.6	87.2	55.9	84.1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 29e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de *JOURS DE SOINS HOSPITALIERS*, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	70.9	75.1	69.1	71.2	62.2	73.9	65.6	93.9	61.0	98.4
	F	75.2	75.0	75.3	84.2	77.7	62.8	70.2	97.4	54.2	102.2
Fractures du crâne	H	2.8	1.9	3.2	4.8	2.5	2.2	1.2	1.2	2.3	2.2
	F	0.6	0.6	0.6	0.3	1.1	0.5	0.2	0.2	0.5	1.5
Fractures du cou et du tronc	H	6.8	9.2	5.8	5.5	5.9	6.1	6.6	17.4	5.2	14.0
	F	5.9	5.6	6.0	6.3	4.4	7.5	6.4	6.2	3.8	7.5
Fractures du membre supérieur	H	3.8	4.1	3.6	3.6	2.9	4.5	6.6	3.1	3.1	3.6
	F	5.2	7.4	4.3	3.3	4.9	4.8	9.4	15.6	3.0	7.4
Fractures du membre inférieur	H	16.7	16.0	17.0	20.1	15.6	15.1	17.7	16.2	11.8	21.5
	F	29.7	26.1	31.3	43.0	33.1	18.3	21.6	24.0	21.5	40.5
Entorses	H	2.1	2.4	2.0	1.6	2.1	2.3	2.0	3.4	2.2	2.3
	F	1.4	1.9	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	2.9	1.9	2.1
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	2.9	2.7	3.0	5.2	1.6	2.2	1.4	4.1	3.4	0.9
	F	1.7	1.6	1.7	1.2	1.3	2.7	0.7	4.4	1.5	2.0
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	2.4	2.7	2.3	2.0	2.0	2.8	0.8	4.7	3.5	2.0
	F	0.8	1.5	0.5	0.4	0.2	0.7	0.9	0.8	1.9	1.9
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	1.6	2.3	1.3	1.3	1.5	1.1	2.3	4.2	2.0	1.8
	F	1.6	2.2	1.4	1.6	1.2	1.5	1.2	5.5	1.5	2.2
Brûlures	H	4.0	3.7	4.1	5.2	3.9	3.2	4.1	2.2	1.2	8.4
	F	1.2	2.2	0.8	0.7	1.0	0.7	0.5	3.2	0.2	6.8
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	1.3	0.6	2.7	0.9	1.0
	F	0.7	1.3	0.5	0.2	0.4	1.0	0.3	0.7	1.1	3.1
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	2.1	4.8	1.0	1.1	0.6	1.2	4.9	2.9	3.4	8.5
	F	3.2	4.5	2.7	4.0	1.2	3.0	3.8	4.8	3.3	7.1
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.6	0.2
	F	0.6	0.4	0.7	0.1	0.1	1.9	0.3	0.3	0.5	0.4
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	17.4	14.9	18.5	14.6	17.4	24.0	11.2	22.5	14.0	15.5
	F	18.8	14.8	20.5	19.2	24.8	17.4	20.5	18.2	10.8	13.7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30a

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	3.1	4.1	2.7	2.2	3.1	2.7	4.0	4.1	3.1	5.9
	F	3.4	4.7	2.8	2.0	2.4	4.1	3.3	5.7	4.3	6.4
Tumeurs malignes	H	10.4	10.6	10.3	10.8	10.5	9.6	9.7	13.5	9.5	11.4
Toutes les causes	F	8.4	7.7	8.6	8.1	9.2	8.6	5.5	10.2	6.5	10.6
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.3	0.7	1.2
	F	0.9	0.7	0.9	0.9	1.1	0.9	0.5	1.1	0.6	1.0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	1.8	2.2	1.7	1.8	1.6	1.5	2.8	2.9	1.7	2.0
	F	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6	1.1	0.8	0.9
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	2.0	2.1	2.0	2.2	1.7	2.1	1.4	3.3	1.7	2.6
Organes génito-urinaires	H	2.2	2.1	2.2	2.5	2.0	2.0	2.0	3.4	1.8	2.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	5.3	5.3	5.3	5.3	5.8	4.9	3.9	5.9	5.3	6.1
	F	4.6	4.1	4.9	4.3	5.5	4.9	3.0	4.7	3.4	6.0
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	2.8	3.2	2.7	2.0	3.0	3.0	3.1	4.7	2.7	3.3
	F	3.4	4.6	2.9	2.6	2.7	3.4	3.8	6.3	4.3	5.1
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	1.1	1.5	0.9	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.3	1.9
	F	1.3	1.5	1.2	0.8	1.4	1.3	1.4	2.1	1.5	1.4
Troubles mentaux	H	6.3	8.9	5.1	5.4	4.9	5.2	12.2	8.5	7.5	8.2
	F	8.5	12.4	6.7	7.0	6.6	6.7	13.7	17.7	10.1	11.5
Autres psychoses	H	2.1	2.8	1.8	2.3	1.6	1.6	4.0	2.0	3.3	1.5
	F	2.8	3.6	2.5	3.2	2.4	2.0	4.0	5.2	3.0	3.0
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	3.3	5.2	2.5	2.4	2.3	2.7	7.3	5.6	3.8	5.5
	F	4.9	8.4	3.3	3.4	3.0	3.7	9.1	11.7	6.7	8.2
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	11.9	12.1	11.9	11.7	11.6	12.2	15.7	12.0	9.9	12.1
Toutes les causes	F	14.3	14.2	14.3	14.2	13.0	15.9	19.4	13.8	10.9	14.6
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.9	0.4	0.3
	F	0.5	0.6	0.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	1.1	1.3	0.9	0.7	0.9	1.2	1.7	1.0	1.0	1.5
	F	1.1	1.5	0.9	0.8	0.9	1.2	1.7	2.5	1.0	1.5
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	9.1	9.2	9.1	9.0	8.7	9.5	11.9	8.5	7.8	9.3
	F	10.5	10.3	10.6	10.7	9.3	11.8	15.1	8.7	7.7	10.6

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	24.9	27.5	23.8	20.3	25.7	25.5	27.2	30.0	26.6	27.6
Toutes les causes	F	19.1	22.4	17.7	14.8	18.2	20.4	21.4	30.7	19.7	22.8
Cardiopathies ischémiques	H	11.4	12.3	10.9	9.7	11.0	12.2	11.6	12.2	12.6	12.3
	F	6.0	6.6	5.8	5.4	5.4	6.7	5.9	7.8	5.7	7.9
Autres formes de cardiopathies	H	5.7	6.1	5.5	4.7	6.1	5.7	6.6	5.5	5.9	6.1
	F	5.5	5.9	5.4	4.6	5.7	5.8	5.3	8.2	5.0	6.5
Maladies vasculaires cérébrales	H	2.9	2.9	2.9	2.3	3.2	3.2	2.5	3.8	2.5	3.2
	F	2.6	2.5	2.6	2.3	2.5	3.2	3.0	3.0	2.1	2.4
Maladies de l'appareil respiratoire	H	23.4	30.3	20.2	17.6	20.0	23.4	24.1	31.7	34.3	28.8
Toutes les causes	F	20.8	27.3	17.9	15.3	17.7	21.0	20.3	29.0	30.3	28.6
Affections aiguës des voies respiratoires	H	4.5	5.9	3.9	3.8	3.3	4.8	5.9	3.9	6.0	7.0
	F	3.6	5.1	2.9	2.9	2.3	3.7	4.5	4.8	5.1	5.9
Pneumonie et grippe	H	4.4	5.4	3.9	3.2	3.9	4.7	3.6	6.6	5.9	5.7
	F	4.2	5.8	3.5	3.0	3.6	3.9	3.8	8.2	5.7	6.6
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	7.5	10.1	6.3	5.1	6.3	7.7	7.9	14.1	10.3	9.6
	F	7.0	9.1	6.0	4.9	6.0	7.4	5.8	11.6	9.9	9.9
Maladies de l'appareil digestif	H	26.0	31.9	23.4	18.6	29.7	21.8	30.7	38.1	28.7	34.7
	F	28.3	35.2	25.2	17.8	31.8	26.2	30.9	43.1	32.9	38.5
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	5.6	7.7	4.6	2.2	6.8	4.9	7.4	11.2	5.4	10.0
	F	5.5	8.2	4.4	1.7	5.6	6.0	6.8	13.4	6.1	9.8
Entérite et colite non infectieuses	H	3.0	4.9	2.2	1.6	2.7	2.3	4.8	5.0	5.5	4.0
	F	4.4	6.3	3.6	2.6	4.5	3.6	5.9	6.3	7.1	5.5
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	3.7	4.2	3.4	2.3	4.6	3.3	4.0	5.6	3.8	4.3
	F	5.2	6.5	4.6	2.3	6.5	5.1	5.9	8.1	6.2	6.4
Autres maladies de l'appareil digestif	H	4.6	5.5	4.2	3.7	4.8	4.0	5.0	6.5	5.1	6.0
	F	7.1	8.1	6.7	5.7	7.4	7.2	7.5	9.3	7.2	9.4
Maladies des organes génito-urinaires	H	18.3	17.0	18.9	18.4	21.1	17.3	19.3	25.9	14.4	13.6
	F	30.4	33.9	28.9	24.7	34.3	27.5	33.7	41.2	28.2	39.4
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	9.1	7.5	9.9	7.6	12.4	9.7	6.7	11.9	6.8	6.6
	F	11.3	8.8	12.4	11.5	17.0	8.3	8.0	16.3	7.0	7.8
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	8.4	8.7	8.3	10.0	8.0	6.8	11.6	13.2	6.8	6.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	13.8	18.6	11.7	8.8	13.4	13.1	20.3	16.4	14.0	26.2
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	33.4	32.8	33.7	31.9	31.9	37.6	32.0	31.4	30.2	39.1
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	7.4	8.9	6.8	6.9	6.5	7.0	8.2	8.6	7.2	12.6
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	12.3	12.0	12.4	11.9	13.2	12.2	10.2	13.0	11.6	13.7
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.4	8.3	9.9	8.0	9.4	12.5	10.2	6.6	8.3	7.3
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	3.2	3.4	3.1	2.4	3.4	3.6	3.2	6.0	3.1	2.6
	F	3.3	3.7	3.1	2.3	3.2	4.0	2.9	6.8	3.4	3.2
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	11.5	10.8	11.8	10.5	10.3	15.0	10.4	13.9	8.9	12.6
	F	12.6	12.1	12.9	10.2	11.9	17.0	13.6	12.8	9.5	14.8
Arthropathies et affections apparentées	H	5.5	3.7	6.2	5.4	5.1	8.3	3.0	4.9	2.9	5.3
	F	5.5	4.6	5.9	4.2	5.4	8.4	4.5	4.7	3.3	6.8
Affections des régions du plan dorsal	H	2.7	3.7	2.2	1.7	2.4	2.6	3.9	5.5	3.1	3.3
	F	2.6	3.3	2.3	1.9	2.2	2.7	3.7	3.7	2.7	3.5
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.2	1.3	1.1	1.8
	F	2.0	1.6	2.1	1.8	1.7	2.9	1.7	1.5	1.3	2.1
Anomalies congénitales	H	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1	0.7	1.2	1.7	1.7
	F	1.2	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.5	1.6	2.0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
	F	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	0.9
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	11.3	11.3	11.3	9.9	11.8	12.4	9.9	11.5	10.9	13.5
	F	12.8	12.7	12.9	10.3	14.0	14.4	10.2	16.4	10.5	16.7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30a
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1993-1994

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	14.1	16.1	13.1	10.1	14.4	15.2	16.3	14.4	13.9	20.6
	F	10.3	11.3	9.8	7.7	10.6	11.5	10.4	13.3	9.3	14.4
Fractures du crâne	H	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	1.0	1.2	1.2
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
Fractures du cou et du tronc	H	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1
	F	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.3	0.5
Fractures du membre supérieur	H	1.4	1.7	1.3	1.3	1.1	1.6	2.4	1.4	1.1	2.1
	F	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	1.7	1.4	1.5	0.6	1.5
Fractures du membre inférieur	H	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.3	2.0	2.5	1.5	2.5
	F	2.2	1.8	2.4	2.1	2.4	2.6	1.7	2.6	1.5	1.7
Entorses	H	0.7	0.9	0.6	0.4	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	1.1
	F	0.5	0.8	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	1.2	0.7	1.1
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	1.0	0.9	0.4	0.9	1.5
	F	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	1.3
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.8
	F	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	0.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.3	0.5	0.5	0.6
	F	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0	0.6	0.3	0.4
Brûlures	H	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
	F	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	0.8	1.1	0.5	0.4	0.6	0.7	1.3	1.0	1.2	0.9
	F	1.2	2.1	0.8	0.5	0.8	1.2	2.0	1.7	2.1	2.3
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	2.3	2.0	2.4	1.8	3.2	2.2	1.6	2.0	1.9	2.6
	F	2.1	1.9	2.1	1.6	2.8	2.0	1.1	2.1	1.6	2.9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30b **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	3.3	4.6	2.8	2.4	2.7	3.3	3.4	6.1	4.9	4.2
	F	3.6	5.0	3.0	2.7	2.3	4.0	3.8	6.8	5.2	4.8
Tumeurs malignes	H	10.8	10.7	10.8	11.9	10.5	9.9	9.2	14.6	9.0	12.5
Toutes les causes	F	8.6	8.1	8.8	8.7	8.9	8.9	5.7	11.0	7.9	9.1
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	1.1	1.1	1.1	1.4	1.0	1.0	1.3	1.3	0.7	1.6
	F	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	1.9	2.4	1.6	1.6	1.7	1.5	2.5	4.8	1.5	2.5
	F	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	1.3	0.5	1.3
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	1.9	1.6	3.1	2.0	2.2
Organes génito-urinaires	H	1.9	1.8	1.9	2.5	1.8	1.4	1.3	2.2	1.9	2.1
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siéges autres et sans précision	H	5.9	5.2	6.2	6.5	6.1	5.9	4.1	6.4	4.9	6.3
	F	4.9	4.5	5.1	4.9	5.3	5.1	3.4	5.7	4.6	4.7
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	2.6	3.0	2.4	1.7	2.8	2.8	2.8	3.8	2.5	3.7
	F	3.5	5.1	2.8	2.3	2.6	3.6	4.3	6.1	4.8	5.7
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	1.2	1.4	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.7
	F	1.4	1.9	1.1	0.9	1.2	1.3	2.8	1.8	1.6	1.6
Troubles mentaux	H	7.2	10.0	5.9	6.2	5.8	5.7	13.0	10.9	8.5	9.0
	F	8.9	13.0	7.1	7.4	7.0	6.8	14.8	20.2	9.6	12.0
Autres psychoses	H	2.4	3.2	2.1	2.3	2.0	1.9	4.5	3.1	3.3	1.9
	F	3.2	4.4	2.7	3.0	2.6	2.6	5.6	6.1	3.5	3.7
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	3.8	5.8	2.9	3.1	2.6	3.0	7.6	6.6	4.5	5.6
	F	4.9	7.9	3.6	3.8	3.3	3.6	8.4	13.2	5.7	7.6
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	12.4	12.4	12.4	11.8	12.4	13.2	15.2	12.2	10.1	13.5
Toutes les causes	F	15.7	15.5	15.8	15.7	14.6	17.3	22.4	14.8	10.7	16.9
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4
	F	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	0.3
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	1.1	1.4	1.0	0.7	0.9	1.4	1.6	1.4	1.1	1.8
	F	1.1	1.4	1.0	0.9	0.8	1.3	1.1	1.9	1.2	1.6
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	9.5	9.5	9.6	9.1	9.1	10.6	11.9	8.4	7.8	10.5
	F	11.7	12.0	11.5	11.2	10.6	12.9	17.8	11.1	8.2	12.8

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	23.1	25.4	22.0	20.7	21.1	24.4	25.2	29.6	23.1	27.1
Toutes les causes	F	18.9	22.0	17.6	15.0	18.4	19.6	19.4	25.1	20.1	26.1
Cardiopathies ischémiques	H	10.3	11.6	9.7	9.5	8.5	11.3	11.3	13.0	10.4	13.1
	F	5.9	6.3	5.7	5.1	5.4	6.5	5.4	4.8	5.7	9.6
Autres formes de cardiopathies	H	5.3	5.5	5.3	4.9	4.8	6.1	5.1	7.4	5.2	5.2
	F	5.4	5.6	5.2	4.5	5.6	5.8	4.7	6.8	5.0	6.8
Maladies vasculaires cérébrales	H	2.9	3.0	2.8	2.6	2.7	3.1	3.2	3.5	2.5	3.5
	F	2.7	2.9	2.7	2.3	2.8	3.0	2.6	3.2	2.7	3.4
Maladies de l'appareil respiratoire	H	22.7	29.3	19.7	17.6	19.3	22.5	28.2	26.8	31.6	27.9
Toutes les causes	F	20.9	27.1	18.2	14.8	17.7	22.4	24.3	25.3	26.9	31.6
Affections aiguës des voies respiratoires	H	4.2	6.3	3.2	3.6	2.6	3.6	6.3	4.9	7.1	5.8
	F	3.6	5.2	2.9	2.7	2.2	4.0	5.1	4.4	5.5	5.3
Pneumonie et grippe	H	4.5	5.7	4.0	3.8	3.9	4.5	4.9	4.9	6.4	5.7
	F	4.2	5.1	3.8	3.0	3.8	4.8	3.9	4.8	5.0	6.9
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	6.7	8.7	5.8	4.5	5.7	7.3	8.4	10.4	9.0	7.5
	F	6.6	8.9	5.6	4.2	5.4	7.2	6.5	12.1	8.2	10.8
Maladies de l'appareil digestif	H	27.8	32.9	25.6	23.7	29.3	23.6	29.9	41.2	29.8	36.1
	F	30.0	36.0	27.3	23.5	32.2	26.2	31.3	44.2	33.2	40.5
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	6.4	8.3	5.6	4.8	7.1	4.8	5.8	12.6	5.8	11.6
	F	6.2	8.3	5.3	3.8	7.2	4.9	7.0	13.1	5.5	11.4
Entérite et colite non infectieuses	H	3.4	4.9	2.7	2.6	3.2	2.4	3.6	4.9	5.9	4.3
	F	4.6	6.9	3.5	3.1	3.6	4.0	5.6	6.9	7.8	6.6
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	4.0	4.3	3.9	3.3	4.8	3.5	4.1	5.6	3.7	4.8
	F	5.6	6.5	5.3	4.1	6.6	5.2	5.4	7.2	6.5	7.2
Autres maladies de l'appareil digestif	H	4.6	5.2	4.3	3.7	4.4	4.9	4.5	5.9	5.1	5.6
	F	7.2	8.0	6.9	6.1	7.1	7.5	7.8	8.3	7.6	8.6
Maladies des organes génito-urinaires	H	18.3	18.2	18.3	19.9	19.9	15.0	17.2	31.0	17.1	13.0
	F	32.8	35.5	31.7	29.0	36.5	29.2	34.9	55.2	29.2	34.0
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	9.1	7.8	9.6	8.4	11.8	8.5	5.9	14.5	7.3	6.5
	F	12.7	10.6	13.6	13.3	17.9	9.0	8.9	22.3	8.0	9.0
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	8.3	9.4	7.8	10.3	7.4	5.7	10.7	15.9	8.6	5.3
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	14.0	18.0	12.3	10.2	13.1	13.6	20.8	23.1	14.0	18.6
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	31.9	30.7	32.4	30.2	30.7	36.7	28.5	29.3	30.4	34.7
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	6.8	8.2	6.2	6.3	6.5	5.7	7.6	8.5	7.4	10.3
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	11.2	11.5	11.0	10.4	12.3	10.2	8.5	11.4	12.2	13.6
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.0	7.7	11.0	8.9	9.5	15.2	9.3	6.7	8.1	6.0
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	3.6	3.8	3.5	3.4	3.0	4.0	3.6	6.6	3.6	2.7
	F	3.4	3.5	3.4	3.8	2.6	3.9	3.2	6.4	2.6	3.5
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	12.1	10.9	12.6	10.6	11.6	15.8	12.1	12.4	8.5	12.7
	F	12.7	12.2	12.9	10.1	11.8	17.2	13.8	15.1	9.5	13.1
Arthropathies et affections apparentées	H	5.8	4.1	6.5	5.5	5.7	8.6	3.8	4.4	3.3	5.5
	F	5.6	4.4	6.1	4.0	5.8	8.6	4.2	5.7	3.5	5.4
Affections des régions du plan dorsal	H	2.4	3.2	2.1	1.9	2.1	2.2	4.1	5.2	2.1	2.9
	F	2.1	3.0	1.8	1.5	1.5	2.2	3.5	4.8	2.3	2.7
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	1.3	1.2	1.4	1.1	1.3	1.8	1.4	1.2	1.0	1.4
	F	2.0	1.8	2.1	2.0	1.7	2.6	2.2	1.8	1.6	2.0
Anomalies congénitales	H	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	1.3	1.8	1.3
	F	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.7	0.2	0.3
	F	0.5	1.0	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	1.3
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	11.8	12.4	11.6	10.9	10.9	13.2	11.3	13.6	10.5	16.1
	F	13.7	14.8	13.2	12.4	11.6	16.0	14.9	17.0	11.9	18.2

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30b
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1994-1995

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	14.0	16.1	13.0	11.0	13.6	14.5	16.6	18.2	13.7	18.6
	F	10.2	11.6	9.6	7.9	10.1	10.8	10.6	12.6	9.5	15.9
Fractures du crâne	H	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.3
	F	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Fractures du cou et du tronc	H	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	0.8	0.4	1.0
	F	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	1.0
Fractures du membre supérieur	H	1.6	2.0	1.4	1.3	1.2	1.9	2.1	2.9	1.7	1.9
	F	1.1	1.2	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.5	0.9	1.7
Fractures du membre inférieur	H	2.0	2.1	2.0	1.8	2.0	2.1	2.6	2.8	1.6	2.1
	F	2.1	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	1.4	2.8	1.5	2.2
Entorses	H	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.3	0.5	0.9
	F	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	1.2
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	F	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	0.8	0.3	0.6
	F	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3
Brûlures	H	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.5
	F	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.5
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	0.9	1.5	0.6	0.5	0.5	0.8	1.4	1.5	1.2	1.9
	F	1.2	2.0	0.8	0.6	0.9	1.2	2.2	1.5	1.8	2.6
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	2.2	1.8	2.4	2.2	2.8	2.1	1.9	1.8	1.4	2.3
	F	2.0	1.8	2.1	1.7	2.5	2.2	1.7	1.9	1.4	2.5

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30c **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	3.2	4.4	2.7	2.4	2.6	3.1	3.9	6.9	3.8	4.4
	F	3.5	4.9	2.9	2.8	2.0	4.0	4.9	6.2	4.5	4.8
Tumeurs malignes	H	10.3	10.8	10.1	11.4	9.2	9.8	7.9	16.3	10.1	11.6
Toutes les causes	F	8.3	8.5	8.2	8.9	7.8	8.0	6.2	12.0	7.7	10.1
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	0.9	0.8	1.3	0.8	1.4
	F	0.9	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.3	1.1	0.7	1.0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	1.8	2.3	1.6	1.8	1.3	1.6	2.5	4.0	1.9	1.4
	F	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	1.4	0.4	0.9
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	F	2.0	2.3	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	2.0	2.5	3.0
Organes génito-urinaires	H	1.6	1.9	1.4	2.0	1.0	1.3	1.0	2.0	2.1	2.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	5.9	5.6	6.1	6.2	5.9	6.0	3.5	9.0	5.2	6.4
	F	4.7	4.7	4.7	4.8	4.5	4.7	3.6	7.6	4.1	5.1
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	2.7	3.1	2.5	2.5	2.4	2.8	2.4	3.4	3.3	3.2
	F	3.7	4.8	3.2	3.1	2.9	3.6	3.8	6.0	5.1	4.4
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	1.3	1.5	1.1	1.5	1.1	0.8	1.5	1.8	1.4	1.5
	F	1.6	1.9	1.5	1.9	1.3	1.3	1.3	2.1	2.1	1.8
Troubles mentaux	H	7.5	10.8	6.0	6.5	6.1	5.3	13.8	14.7	8.3	9.4
	F	9.2	13.7	7.3	7.5	7.2	7.1	17.2	20.0	11.0	10.4
Autres psychoses	H	2.7	3.8	2.2	2.5	2.5	1.5	4.9	5.3	3.7	1.7
	F	3.4	4.6	2.9	3.3	2.5	2.8	7.6	4.6	3.0	4.0
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	3.7	5.9	2.7	2.9	2.4	2.9	8.0	7.0	4.0	6.5
	F	4.9	8.3	3.4	3.4	3.2	3.5	8.9	14.2	7.3	5.6
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	13.6	12.6	14.0	15.4	13.0	13.5	16.0	11.2	10.5	13.6
Toutes les causes	F	17.4	15.4	18.2	19.4	16.3	19.0	18.2	13.2	13.4	17.4
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4
	F	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	1.0	1.2	0.9	0.6	0.5	1.5	1.3	1.1	1.2	1.3
	F	1.1	1.3	1.0	0.6	1.0	1.5	1.2	1.1	1.2	1.8
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	10.8	10.0	11.1	12.5	10.4	10.3	13.1	8.5	8.2	10.9
	F	13.7	12.1	14.4	16.0	12.4	14.7	14.4	9.8	10.6	13.7

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	24.9	27.2	23.9	23.5	22.2	26.2	25.2	32.3	24.1	31.3
Toutes les causes	F	19.7	22.3	18.6	17.5	18.2	20.3	19.9	28.1	19.5	25.8
Cardiopathies ischémiques	H	10.9	11.7	10.5	9.9	9.4	12.5	9.9	12.7	11.3	13.6
	F	6.2	6.7	6.0	5.2	5.4	7.6	4.7	8.2	6.1	9.1
Autres formes de cardiopathies	H	5.9	6.4	5.7	6.0	4.9	6.1	5.8	7.2	6.0	7.4
	F	5.5	6.1	5.2	5.0	5.2	5.5	6.2	7.2	5.2	6.9
Maladies vasculaires cérébrales	H	3.0	3.1	2.9	2.4	3.1	3.3	3.3	3.8	2.5	3.3
	F	3.0	2.8	3.0	2.9	3.2	3.0	2.8	3.6	2.4	3.0
Maladies de l'appareil respiratoire	H	23.2	27.8	21.2	20.7	19.4	23.6	26.4	24.0	29.7	28.2
Toutes les causes	F	21.4	26.0	19.4	19.4	16.8	22.3	21.2	28.7	27.4	27.2
Affections aiguës des voies respiratoires	H	3.8	5.5	3.1	3.0	2.2	4.1	5.4	3.7	6.4	5.1
	F	3.1	4.4	2.5	2.7	1.2	3.7	3.9	3.6	5.0	4.4
Pneumonie et grippe	H	4.6	5.5	4.1	3.6	3.8	5.1	4.4	6.2	5.6	6.2
	F	4.3	5.5	3.9	3.0	3.7	4.9	2.9	6.8	5.6	7.1
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	6.8	8.3	6.1	5.5	5.7	7.2	7.3	9.2	8.3	8.7
	F	6.3	8.2	5.5	5.1	4.4	7.3	5.7	12.4	7.7	8.9
Maladies de l'appareil digestif	H	30.3	33.1	29.0	33.6	29.6	23.4	27.5	42.1	29.5	39.5
	F	32.7	38.2	30.3	33.4	31.7	25.3	33.3	47.1	34.1	45.0
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	7.6	7.7	7.6	10.0	7.5	5.1	5.6	11.0	5.2	12.0
	F	7.8	8.7	7.5	8.9	8.2	5.1	7.2	13.9	5.0	13.5
Entérite et colite non infectieuses	H	3.6	5.2	2.9	3.6	2.9	2.1	4.0	5.2	6.3	4.6
	F	5.0	7.6	4.0	4.6	3.6	3.6	6.2	7.9	8.0	8.1
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	4.3	4.5	4.3	5.4	4.2	3.1	3.5	5.9	4.2	5.1
	F	6.4	7.2	6.0	6.9	6.4	4.6	6.2	9.7	6.8	7.0
Autres maladies de l'appareil digestif	H	5.1	6.0	4.7	4.6	4.8	4.6	4.8	9.0	5.1	7.0
	F	7.6	8.9	7.1	7.0	6.6	7.8	8.2	8.0	9.0	9.9
Maladies des organes génito-urinaires	H	17.3	16.5	17.6	19.1	20.2	13.2	11.9	30.5	14.9	15.2
	F	31.3	30.6	31.7	29.7	35.0	30.2	27.9	45.3	26.9	30.2
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	9.0	7.5	9.6	8.9	12.0	7.8	4.8	14.7	6.9	7.1
	F	10.8	8.5	11.9	10.6	16.5	8.2	7.0	17.7	6.8	6.7
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	7.3	7.9	7.1	9.1	7.3	4.7	6.4	14.2	7.2	6.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	14.3	16.0	13.5	12.3	13.8	14.6	16.2	18.4	14.2	17.4
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	30.2	28.8	30.8	29.9	28.5	34.4	28.6	28.5	26.3	33.5
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	6.2	7.6	5.6	5.4	5.5	5.9	7.1	9.1	5.4	11.0
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.3	10.8	10.0	9.9	11.3	8.8	9.6	10.2	11.0	12.3
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	10.0	7.5	11.0	9.7	9.3	14.4	9.2	6.3	7.3	6.5
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	3.7	3.8	3.7	3.9	3.0	4.2	3.5	6.7	3.1	3.5
	F	3.3	3.5	3.2	3.7	2.5	3.5	2.0	5.3	3.4	4.0
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	11.7	10.3	12.3	9.9	12.6	14.5	10.4	15.0	8.3	10.9
	F	12.6	11.0	13.3	11.4	12.7	15.9	10.8	14.2	9.1	12.4
Arthropathies et affections apparentées	H	5.8	3.9	6.6	4.6	7.0	8.4	3.7	5.3	2.9	4.8
	F	5.9	4.1	6.7	4.8	6.8	8.6	3.5	5.2	3.3	5.3
Affections des règions du plan dorsal	H	2.2	2.8	1.9	1.7	2.0	2.0	2.8	5.2	2.1	2.6
	F	2.1	2.9	1.8	1.7	1.8	2.0	2.5	4.2	2.4	3.3
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	1.3	1.1	1.4	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.0	0.7
	F	1.9	1.5	2.1	2.4	1.8	2.1	1.7	2.0	1.1	1.4
Anomalies congénitales	H	1.4	1.4	1.4	1.0	2.0	1.2	1.2	1.0	1.6	1.3
	F	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	0.5	0.9	1.5	1.3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5
	F	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	0.8
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	12.6	14.1	11.9	11.8	10.5	13.6	11.8	14.1	11.7	20.6
	F	14.3	15.8	13.6	12.7	12.4	16.0	13.9	15.8	12.9	23.1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30c
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1995-1996

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	13.7	16.0	12.6	11.7	12.0	14.3	15.1	17.7	14.5	18.7
	F	10.4	11.6	10.0	8.6	9.7	11.7	11.0	14.7	9.9	13.1
Fractures du crâne	H	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	1.0	0.5	1.3	1.0	1.0
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2
Fractures du cou et du tronc	H	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.9	0.5	0.8
	F	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.5	0.7	0.6
Fractures du membre supérieur	H	1.5	1.8	1.3	1.3	1.1	1.6	2.3	2.0	1.5	1.6
	F	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	1.4	1.5	0.9	0.9	1.2
Fractures du membre inférieur	H	1.8	2.0	1.6	1.5	1.5	1.9	1.8	2.6	1.7	2.3
	F	2.3	2.0	2.4	2.4	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	2.5
Entorses	H	0.6	1.0	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	1.3	1.0	1.0
	F	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	1.5	0.5	0.4
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	0.8	1.0	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	1.6
	F	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.8
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7
	F	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	0.3	0.2
Brûlures	H	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8
	F	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	0.8	1.3	0.6	0.5	0.5	0.7	1.3	1.7	1.0	1.7
	F	1.0	1.8	0.7	0.4	0.6	1.1	1.8	1.7	2.1	1.7
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2
	F	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	2.4	1.9	2.6	2.3	2.7	2.6	1.9	2.5	1.3	2.6
	F	2.4	1.7	2.6	2.4	2.5	3.1	1.4	2.7	1.1	2.6

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30d **Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997**

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	2.9	3.5	2.6	2.6	2.2	3.0	3.4	5.6	3.0	3.1
	F	3.1	4.2	2.6	2.5	2.0	3.5	3.5	6.6	4.0	3.5
Tumeurs malignes	H	9.8	10.5	9.5	10.9	8.9	8.6	8.7	11.4	10.2	12.2
Toutes les causes	F	8.1	8.3	8.0	8.8	7.8	7.5	6.0	12.0	8.1	8.9
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	1.0	0.8	1.0	1.1	1.1	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1
	F	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.4	1.4	0.5	0.8
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	1.7	2.2	1.5	1.8	1.1	1.5	2.1	2.4	2.2	2.3
	F	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.4	0.9	1.1
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	F	2.0	2.0	2.0	2.4	1.3	2.4	1.5	2.9	2.0	2.1
Organes génito-urinaires	H	1.5	1.6	1.4	2.0	1.1	1.1	1.5	1.1	1.5	2.4
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	5.6	5.7	5.6	6.0	5.5	5.2	4.2	7.0	5.9	6.4
	F	4.5	4.6	4.5	4.8	4.8	3.6	3.3	6.2	4.7	4.9
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	2.8	3.1	2.7	2.4	2.8	2.9	2.2	3.8	3.2	3.3
	F	3.5	4.4	3.1	2.5	3.3	3.5	3.0	5.1	5.1	4.2
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	1.2	1.6	1.0	1.0	1.2	0.8	1.3	1.5	1.4	2.1
	F	1.5	1.7	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.6	1.6	1.7
Troubles mentaux	H	7.3	10.7	5.9	6.5	5.9	5.2	12.7	15.0	8.6	9.5
	F	9.2	12.7	7.8	8.1	7.8	7.3	14.7	19.5	9.6	11.2
Autres psychoses	H	2.8	3.9	2.3	2.9	2.1	1.8	6.0	4.3	3.5	2.2
	F	3.5	4.8	2.9	3.4	2.7	2.7	6.6	6.3	3.5	4.1
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	3.4	5.9	2.3	2.2	2.2	2.6	6.0	8.8	4.5	6.1
	F	4.7	7.0	3.6	3.5	3.6	3.8	7.2	12.0	5.5	6.3
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	13.0	11.9	13.5	12.7	14.3	13.4	11.7	11.6	11.0	14.1
Toutes les causes	F	16.5	14.4	17.3	15.4	19.0	17.7	16.9	13.6	12.3	16.0
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6
	F	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	0.4
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	0.9	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3	0.6	1.1	1.0	2.0
	F	1.2	1.4	1.1	0.8	0.9	1.5	1.3	1.7	1.1	2.1
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	10.2	9.6	10.5	10.0	11.3	10.3	10.0	8.6	9.0	10.6
	F	12.6	11.3	13.2	12.0	14.5	13.2	13.7	9.7	10.0	11.9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	24.7	27.8	23.3	22.8	23.1	24.1	28.5	30.6	25.8	28.9
Toutes les causes	F	19.6	22.8	18.2	17.1	17.7	20.1	20.5	29.0	19.9	26.4
Cardiopathies ischémiques	H	11.3	13.0	10.5	10.3	9.4	11.8	13.1	12.9	12.2	14.4
	F	6.3	6.9	6.1	6.0	4.9	7.4	5.9	6.7	6.0	9.7
Autres formes de cardiopathies	H	6.0	6.5	5.8	5.7	5.3	6.3	7.2	8.4	6.3	6.4
	F	5.7	6.8	5.3	4.7	5.2	6.0	6.7	9.8	6.0	6.4
Maladies vasculaires cérébrales	H	3.0	3.2	2.9	2.7	3.2	2.9	3.4	3.3	2.9	3.5
	F	3.0	3.3	2.9	2.5	3.2	2.9	3.5	3.8	2.8	3.6
Maladies de l'appareil respiratoire	H	21.0	24.5	19.5	18.8	18.4	21.4	25.1	23.3	25.3	23.2
Toutes les causes	F	18.8	22.6	17.2	15.7	16.0	20.3	20.9	23.3	24.4	21.1
Affections aiguës des voies respiratoires	H	3.5	4.8	2.9	3.3	2.0	3.5	4.6	5.5	5.0	4.1
	F	3.0	4.4	2.4	2.6	1.6	3.0	4.4	4.5	4.6	4.1
Pneumonie et grippe	H	4.5	4.9	4.2	3.7	4.4	4.7	4.0	5.6	5.6	5.2
	F	4.0	4.6	3.7	3.2	3.5	4.4	2.2	5.2	5.4	4.5
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	6.4	7.6	5.9	5.5	5.0	7.1	7.7	7.9	6.9	8.3
	F	5.6	6.8	5.1	4.7	4.0	6.5	6.6	9.1	6.3	6.3
Maladies de l'appareil digestif	H	27.0	31.0	25.2	21.8	29.3	24.5	27.7	36.7	28.7	35.3
	F	28.5	33.3	26.4	21.3	31.5	26.6	32.0	43.2	28.7	36.1
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	6.4	6.8	6.2	3.9	8.6	6.2	6.0	8.8	4.7	10.3
	F	6.4	7.5	6.0	3.7	8.6	5.6	7.5	12.1	4.2	10.2
Entérite et colite non infectieuses	H	2.6	3.9	2.1	1.8	2.5	1.9	2.5	4.1	4.6	4.2
	F	3.7	5.3	3.1	2.3	3.4	3.6	4.3	5.6	6.0	5.1
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	3.9	4.5	3.7	3.0	4.5	3.5	4.2	4.8	4.5	4.6
	F	5.4	6.2	5.1	3.8	6.2	5.1	6.8	8.9	5.4	5.3
Autres maladies de l'appareil digestif	H	4.7	5.9	4.2	4.1	4.3	4.3	4.2	8.1	6.0	6.3
	F	7.3	7.9	7.1	6.9	6.7	7.7	7.8	8.8	7.0	9.2
Maladies des organes génito-urinaires	H	16.4	15.1	16.9	17.0	19.3	14.5	14.3	23.1	13.3	14.0
	F	29.6	31.4	28.8	25.6	32.8	28.0	29.2	43.5	27.0	33.6
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	8.4	6.9	9.1	8.0	11.0	6.2	4.9	11.9	6.0	7.2
	F	10.5	8.3	11.5	9.3	16.4	8.6	7.1	15.6	7.4	6.5
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	7.0	7.0	7.0	8.0	7.6	5.4	8.2	10.2	6.2	5.2
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	13.4	16.6	12.0	10.9	12.1	13.1	17.3	19.2	13.5	19.4
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	28.5	26.7	29.2	27.3	27.6	33.1	25.0	28.9	24.1	33.1
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	5.4	6.2	5.1	4.4	5.5	5.4	5.7	8.2	4.5	8.4
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.8	9.6	9.9	8.4	11.1	10.3	7.8	8.3	9.3	13.1
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.7	7.8	10.4	10.0	9.0	12.4	8.6	7.7	8.0	6.8
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	3.4	3.8	3.3	3.4	2.9	3.4	2.9	6.2	3.7	3.3
	F	3.2	3.4	3.0	3.2	2.5	3.4	2.2	5.1	3.7	3.3
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	12.3	10.4	13.2	11.1	13.0	15.6	9.2	15.0	8.4	12.2
	F	13.5	12.1	14.2	11.9	13.6	17.2	12.5	15.1	9.7	14.0
Arthropathies et affections apparentées	H	6.4	4.0	7.4	5.4	7.4	9.6	3.4	6.2	3.1	4.8
	F	6.3	4.4	7.1	5.1	7.5	9.0	3.8	6.4	3.4	5.5
Affections des régions du plan dorsal	H	2.2	2.6	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	4.1	1.9	3.6
	F	2.3	2.5	2.2	2.0	2.0	2.6	2.4	2.8	2.1	3.2
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	1.4	1.3	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3
	F	2.0	2.0	1.9	2.1	1.7	2.1	2.3	3.0	1.7	1.5
Anomalies congénitales	H	1.3	1.3	1.3	1.2	1.6	1.1	0.8	1.0	1.8	1.1
	F	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.0	0.9	0.7	1.1	0.8
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.2
	F	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	11.8	12.9	11.4	11.8	10.2	12.5	11.8	12.0	11.3	17.1
	F	13.5	14.4	13.1	11.9	12.4	15.3	11.7	18.3	10.4	22.0

*Source : **Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.***

Tableau 30d
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1996-1997

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	13.4	16.8	11.9	10.6	11.4	13.7	18.8	17.2	15.5	16.5
	F	10.3	11.7	9.7	8.7	9.7	10.9	10.5	15.0	9.9	14.3
Fractures du crâne	H	0.8	1.1	0.7	0.7	0.5	0.8	1.1	0.9	1.4	0.8
	F	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
Fractures du cou et du tronc	H	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	1.0	0.6	0.7	0.9
	F	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.9
Fractures du membre supérieur	H	1.7	2.2	1.4	1.4	1.2	1.8	3.6	1.4	1.9	1.7
	F	1.2	1.5	1.1	1.2	0.9	1.2	2.1	1.4	1.0	1.5
Fractures du membre inférieur	H	1.9	2.3	1.7	1.5	1.7	1.9	2.7	2.7	2.2	2.1
	F	2.3	2.1	2.4	2.2	2.8	2.2	1.9	2.9	1.6	2.7
Entorses	H	0.6	0.8	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8
	F	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	1.3	0.5	0.8
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	1.1	0.5	1.1
	F	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.8
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0	1.1	0.7	0.4
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.6
Brûlures	H	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6
	F	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6
	F	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	0.7	1.1	0.5	0.4	0.6	0.6	1.1	0.7	1.3	1.0
	F	1.0	1.8	0.6	0.5	0.4	1.0	1.7	2.1	1.8	1.6
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	2.3	2.0	2.4	2.2	2.6	2.4	2.4	3.0	1.4	2.1
	F	2.2	1.7	2.4	2.2	2.6	2.5	1.7	2.8	1.2	1.9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30e

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies infectieuses et parasitaires	H	2.9	4.2	2.4	2.0	2.5	2.7	3.6	6.5	4.1	3.8
	F	3.1	4.3	2.5	2.2	2.1	3.3	3.5	5.4	4.0	4.9
Tumeurs malignes	H	9.4	10.1	9.1	9.1	9.8	8.2	7.4	11.2	10.3	12.1
Toutes les causes	F	8.1	7.9	8.2	8.0	8.8	7.8	5.1	9.4	8.9	8.2
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	H	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	0.6	1.0
	F	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	1.3	0.7	1.0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	H	1.5	2.0	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	2.2	2.1	2.2
	F	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8
Sein	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	1.8	2.0	1.8	1.8	1.6	1.9	1.3	1.7	2.5	2.4
Organes génito-urinaires	H	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.1	1.0	1.1	1.6	1.7
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sièges autres et sans précision	H	5.6	5.9	5.5	5.5	5.8	5.2	4.3	6.9	5.9	7.2
	F	4.6	4.2	4.7	4.5	5.3	4.4	2.5	5.5	4.9	4.1
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	H	3.0	3.2	2.9	2.8	3.0	2.9	2.2	3.7	3.3	3.6
	F	3.8	4.5	3.5	3.7	3.1	3.7	3.7	6.3	4.4	4.3
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	H	1.2	1.7	1.0	1.0	0.9	1.1	1.5	1.6	2.1	1.4
	F	1.5	1.7	1.4	1.1	1.5	1.5	1.1	2.2	1.9	1.4
Troubles mentaux	H	7.4	10.8	5.9	6.9	5.7	5.1	15.0	12.9	8.4	9.3
	F	9.0	13.0	7.3	7.5	6.8	7.5	17.4	20.0	8.9	10.7
Autres psychoses	H	3.1	4.3	2.5	3.2	2.3	2.0	6.7	4.4	4.2	1.9
	F	3.8	5.5	3.1	3.9	2.4	3.0	9.3	6.8	4.3	2.7
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	H	3.4	5.6	2.4	2.6	2.2	2.4	7.5	7.0	3.5	6.4
	F	4.1	6.8	3.0	2.6	2.9	3.6	7.6	12.1	3.9	7.4
Maladies du système nerveux et des organes des sens	H	13.6	13.2	13.8	13.3	14.9	13.3	13.2	15.2	12.1	13.7
Toutes les causes	F	17.7	16.1	18.4	16.9	19.7	18.7	15.4	18.9	15.5	16.1
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	H	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8
	F	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.2	1.3	0.9	0.4
Autres maladies et syndromes du système nerveux central	H	0.9	1.1	0.7	0.6	0.5	1.1	1.0	1.4	0.9	1.5
	F	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.5	1.2	1.0	1.5
Troubles de l'oeil et de ses annexes	H	10.8	10.2	11.1	10.7	12.1	10.4	10.2	11.2	9.8	10.5
	F	13.8	12.8	14.2	13.0	15.2	14.4	12.1	14.7	12.6	12.6

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Maladies de l'appareil circulatoire	H	24.9	28.1	23.5	22.3	22.3	26.2	25.4	34.9	25.7	30.1
Toutes les causes	F	19.5	22.5	18.2	17.3	18.4	19.0	20.7	27.2	21.1	24.1
Cardiopathies ischémiques	H	11.1	12.6	10.4	9.5	8.8	12.9	12.1	13.6	12.3	13.1
	F	6.3	7.4	5.8	5.6	5.2	6.7	6.4	8.2	7.0	8.8
Autres formes de cardiopathies	H	6.1	7.1	5.6	5.4	5.0	6.5	6.7	9.2	6.7	6.9
	F	5.9	6.9	5.5	5.0	5.3	6.1	6.5	8.5	6.6	7.0
Maladies vasculaires cérébrales	H	3.0	3.1	2.9	2.8	2.9	3.0	2.4	4.2	2.4	4.5
	F	2.9	2.9	2.9	2.8	3.1	2.8	2.8	3.2	2.6	3.4
Maladies de l'appareil respiratoire	H	21.9	26.6	19.8	19.3	18.7	21.5	23.7	26.2	28.3	26.9
Toutes les causes	F	19.2	23.1	17.5	16.4	16.0	20.3	20.1	21.8	25.3	23.7
Affections aiguës des voies respiratoires	H	3.7	5.1	3.0	3.3	1.9	3.9	4.6	5.7	4.8	5.5
	F	2.6	3.8	2.1	2.1	1.2	2.9	3.4	3.4	4.2	3.8
Pneumonie et grippe	H	4.8	6.0	4.3	4.0	4.2	4.7	3.5	7.1	7.0	6.0
	F	4.4	5.6	4.0	3.5	4.1	4.4	2.4	6.0	6.3	7.4
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes	H	6.6	8.4	5.8	5.2	5.4	6.7	7.7	9.6	8.3	8.5
	F	5.8	7.0	5.3	5.0	4.4	6.8	6.3	8.9	7.1	6.4
Maladies de l'appareil digestif	H	26.1	29.2	24.7	20.5	29.8	24.1	30.3	35.4	27.3	27.7
	F	27.8	31.7	26.1	20.0	32.6	25.9	31.4	40.1	29.0	31.1
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	H	5.6	5.2	5.7	3.4	7.9	6.1	7.4	7.6	3.8	4.0
	F	5.7	5.3	5.8	3.1	8.9	5.6	7.1	8.0	4.2	3.2
Entérite et colite non infectieuses	H	2.6	4.1	2.0	1.7	2.2	2.0	3.3	4.1	5.0	3.3
	F	3.4	5.3	2.6	2.1	2.7	3.0	4.6	5.7	5.7	5.4
Autres maladies de l'intestin et du péritoine	H	4.0	4.2	3.9	3.5	4.8	3.2	4.1	4.5	4.5	3.8
	F	5.4	6.3	5.0	4.1	6.2	4.8	6.0	9.8	5.3	5.8
Autres maladies de l'appareil digestif	H	4.6	5.8	4.1	3.5	4.5	4.3	4.6	8.1	5.8	6.2
	F	7.5	8.5	7.1	6.2	7.7	7.3	7.2	9.5	8.2	9.9
Maladies des organes génito-urinaires	H	15.5	14.4	16.0	17.0	16.3	14.5	13.5	18.0	15.1	12.1
	F	26.4	28.2	25.7	24.4	25.6	27.2	28.5	33.6	25.6	29.1
Autres maladies de l'appareil urinaire	H	7.9	6.7	8.4	7.7	9.6	7.8	6.3	8.7	6.7	6.0
	F	8.6	7.6	9.0	8.6	9.9	8.4	9.4	8.9	7.5	4.9
Maladies des organes génitaux de l'homme	H	6.7	6.6	6.8	8.1	5.9	6.2	6.6	7.9	7.2	4.6
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGES, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Autres affections des organes génitaux de la femme	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	12.2	14.1	11.4	11.0	10.9	12.5	14.2	16.2	11.6	17.3
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	28.0	27.9	28.0	26.0	25.4	33.0	25.2	28.4	26.3	33.6
Complications liées principalement à la grossesse	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	5.6	7.1	5.0	3.9	5.2	6.0	5.6	8.9	6.0	9.5
Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.4	9.5	9.4	7.7	10.4	10.0	7.8	9.4	8.8	12.9
Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement	H	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	F	9.2	8.0	9.7	9.3	8.0	12.0	9.3	7.2	8.3	6.4
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	H	3.4	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4	2.9	5.2	3.1	3.7
	F	3.4	3.6	3.4	3.1	3.3	3.8	3.1	5.6	3.3	3.4
Maladies du système ostéo-articulaire et des muscles et du tissu conjonctif	H	12.6	11.5	13.1	11.2	12.9	15.5	10.7	14.9	10.1	12.7
	F	13.8	12.4	14.4	12.9	14.0	16.4	12.5	16.2	10.5	13.0
Arthropathies et affections apparentées	H	6.5	4.6	7.3	5.5	7.5	9.0	3.8	5.7	4.1	5.6
	F	6.4	4.3	7.3	5.6	7.9	8.7	3.3	5.7	3.5	6.0
Affections des régions du plan dorsal	H	2.1	2.6	1.9	2.2	1.7	1.8	2.3	4.2	1.7	3.6
	F	2.1	2.5	2.0	2.4	1.8	1.8	2.1	3.4	2.4	2.6
Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	H	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	1.3	1.7	1.2	0.8
	F	1.9	2.0	1.9	2.0	1.6	1.9	2.4	2.7	1.8	1.4
Anomalies congénitales	H	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.1	1.0	0.7	1.7	1.4
	F	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.7	1.3	1.0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	H	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.9	0.2
	F	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5
Symptômes, signes et états morbides mal définis	H	12.1	12.6	11.9	12.0	10.6	13.2	11.1	12.2	11.2	17.1
	F	13.8	13.5	13.9	13.0	12.9	16.0	11.6	16.9	11.4	17.1

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

Tableau 30e
(suite)

Utilisation des ressources hospitalières pour certains diagnostics : nombre de CONGÉS, par 1 000 habitants, selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1997-1998

Certains diagnostics	Sexe	N.-B.	Nord	Sud	Régions 1	2	3	4	5	6	7
Lésions traumatiques et empoisonnements	H	13.0	15.3	12.0	11.0	11.2	14.0	15.2	17.7	14.2	15.7
	F	9.9	10.6	9.6	8.6	9.2	11.2	9.9	12.6	9.4	12.2
Fractures du crâne	H	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	1.1	1.0
	F	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
Fractures du cou et du tronc	H	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.2	0.5	0.9
	F	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
Fractures du membre supérieur	H	1.7	2.1	1.5	1.4	1.1	2.1	2.9	1.9	2.1	1.4
	F	1.2	1.5	1.1	0.9	0.9	1.6	2.4	1.4	1.1	1.1
Fractures du membre inférieur	H	1.9	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	2.1	3.2	1.8	2.0
	F	2.2	1.9	2.4	2.4	2.4	2.2	1.7	2.0	1.7	2.4
Entorses	H	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7	0.8
	F	0.3	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5
Traumatismes intercrâniens non associés à des fractures du crâne	H	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8
	F	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.9	0.2	0.3
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin	H	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Contusions avec intégrité de la surface cutanée	H	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6	0.6	0.6
	F	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4
Brûlures	H	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4
	F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2
Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision	H	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
Intoxications par médicaments et produits biologiques	H	0.7	1.3	0.4	0.4	0.3	0.5	1.3	1.1	1.3	1.3
	F	0.9	1.6	0.6	0.5	0.5	0.9	1.1	2.0	1.5	1.9
Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine	H	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	F	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs	H	2.3	2.0	2.5	1.9	2.5	3.0	1.9	3.1	1.8	2.0
	F	2.3	1.9	2.5	2.3	2.4	3.0	1.7	2.6	1.7	1.9

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, Services de soutien des programmes - Base de données sur l'utilisation des ressources hospitalières.

NOTES POUR LA FIGURE 46

La **figure 46** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a varié considérablement d'une année à l'autre pour atteindre un maximum en 1995-1996, chez les hommes.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté d'environ 9% chez les femmes. Chez les hommes, ce nombre a augmenté de 14% en 1994-1995, puis il est resté relativement stable.

Figure 46 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux, selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 47

La **figure 47** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5 et 7. Dans les autres régions, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale au cours de la période à l'étude.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7. Dans les autres régions, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale au cours de la période à l'étude.

Nord et Sud

- De 1993-1994 à 1997-1998, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 2, 4 et 5, alors qu'on n'a constaté aucune différence significative selon le sexe dans la Région 7. Ce nombre était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord de la province et dans l'ensemble de la province.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 1, 4 et 7 et dans le Sud de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 48

La **figure 48** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans toutes les régions, dans le Nord comparativement au Sud et dans l'ensemble de la province.

Figure 47 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick: de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 48 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les troubles mentaux selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

NOTES POUR LA FIGURE 49

La **figure 49** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes), les cardiopathies ischémiques (CI) et les maladies vasculaires cérébrales chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes)

- De 1993-1994 à 1997-1998, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire a diminué d'environ 24% chez les hommes et chez les femmes. Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire est resté essentiellement stable chez les hommes et chez les femmes.

- **Cardiopathies ischémiques**

  De 1993-1994 à 1997-1998, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques (CI) a diminué d'environ 23% chez les hommes et d'environ 18% chez les femmes. Pendant ce temps, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté d'environ 13% chez les femmes et d'environ 3% chez les hommes.

- **Maladies vasculaires cérébrales**

  Le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales a augmenté d'environ 20% chez les hommes en 1996-1997, puis il a diminué d'environ 47%. Chez les femmes, ce nombre a diminué d'environ 40% de 1993-1994 à 1997-1998. Bien qu'il y ait eu des variations d'une année à l'autre, le nombre global de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales a peu changé au cours de cette période, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Figure 49 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire selon le sexe, Nouveau-Brunswick de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 50

La figure 50 montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes) chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 4, 5 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province, chez les hommes.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 2, 3, 6 et 7. Il était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans la Région 5. Dans la Région 4, on n'a constaté aucune différence significative selon le sexe.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, dans le Sud et dans l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 51

La **figure 51** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes) chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 5 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, dans l'ensemble de la province, dans le Nord et dans le Sud.

- Le nombre moyen de congés était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions à l'exception de la Région 5.

Figure 50 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 51 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil circulatoire (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES

NOTES POUR LA FIGURE 52

La **figure 52** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans la Région 2.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 3 et 7. Il était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans la Région 2. On n'a constaté aucune différence significative selon le sexe dans les Régions 5 et 6.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 53

La **figure 53** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province chez les hommes.

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, dans l'ensemble de la province, dans le Nord et dans le Sud.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions.

Figure 52 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 53 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies vasculaires cérébrales selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES

NOTES POUR LA FIGURE 54

La **figure 54** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 55

La **figure 55** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale, uniquement dans la Région 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence significative entre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, et la moyenne provinciale dans aucune des régions.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a constaté aucune différence significative selon le sexe quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, dans aucune des régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 54 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 55 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les cardiopathies ischémiques selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

NOTES POUR LA FIGURE 56

La **figure 56** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire (toutes les causes) et pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les hommes et les femmes, dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

Maladies de l'appareil respiratoire (toutes les causes)

- De 1993-1994 à 1997-1998, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire a diminué d'environ 21% chez les hommes et d'environ 12% chez les femmes. Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire a diminué d'environ 6% chez les hommes et d'environ 7% chez les femmes.

- **Maladies pulmonaires obstructives chroniques**

  De 1993-1994 à 1997-1998, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques a diminué d'environ 38% chez les hommes et d'environ 17% chez les femmes. Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques a diminué d'environ 12% chez les hommes et d'environ 16% chez les femmes.

Figure 56 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**





NOTES POUR LA FIGURE 57

La **figure 57** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 58

La **figure 58** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 2, 4 et 6.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 57 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick: de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 58 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil respiratoire selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES

NOTES POUR LA FIGURE 59

La **figure 59** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a constaté aucune différence significative selon le sexe quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, dans la Région 7. Ce nombre était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 2, 3, 4 et 6, mais il était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans la Région 5.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 60

La **figure 60** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 2 et 4. Dans toutes les autres régions, on n'a constaté aucune différence significative selon le sexe.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans l'ensemble de la province, mais on n'a constaté aucune différence significative selon le sexe entre le Nord et le Sud de la province.

Figure 59 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 60 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 61

La **figure 61** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au course de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 16% chez les hommes et d'environ 13% chez les femmes.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté de 16%, tant chez les hommes que chez les femmes. Il a atteint un maximum en 1995-1996, puis il est revenu aux niveaux de 1993-1994.

Figure 61 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 62

La **figure 62** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 3, 4, 5 et 6. Dans la Région 1, ce nombre était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Dans la Région 7, on n'a constaté aucune différence significative selon le sexe.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 63

La **figure 63** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 5, et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 2, 3, 5 et 6, dans le Nord, dans le Sud et dans l'ensemble de la province. On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes dans les Régions 1, 4 et 7.

Figure 62 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 63 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de l'appareil digestif selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 64

La **figure 64** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 22% chez les hommes et d'environ 23% chez les femmes.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 5% chez les hommes et il est resté stable chez les femmes.

Figure 64 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes, selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 65

La **figure 65** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes (toutes les causes) chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était supérieur à la moyenne provinciale dans les Régions 1, 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était supérieur à la moyenne provinciale dans les Régions 1 et 5.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 2, 4, 6 et 7. On n'a constaté aucune différence significative selon le sexe dans les Régions 3 et 5.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 66

La **figure 66** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes (toutes les causes) chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés par 1 000 habitants, sauf dans les Régions 5 et 7 où ce nombre était supérieur à la moyenne provinciale.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés par 1 000 habitants, sauf dans les Régions 5 et 7 où ce nombre était supérieur à la moyenne provinciale.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, dans les Régions 1, 4, 5, 6 et 7. Cependant, ce nombre était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 2 et 3.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 65 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 66 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les tumeurs malignes (toutes les causes) selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



CANCER DU POUMON

NOTES POUR LA FIGURE 67

La **figure 67** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour le cancer du poumon chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 5 et 7.

Nord et Sud

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers par 1 000 habitants.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 68

La **figure 68** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour le cancer du poumon chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4 et 5.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés par 1 000 habitants.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions sanitaires.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 67 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour le cancer du poumon selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 68 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour le cancer du poumon selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



CANCER DE LA PROSTATE

NOTES POUR LA FIGURE 69

La **figure 69** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 hommes, pour le cancer de la prostate dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 hommes, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2 et 7.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 hommes.

NOTES POUR LA FIGURE 70

La **figure 70** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 hommes, pour le cancer de la prostate dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 hommes, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans la Région 1.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre de congés, par 1 000 hommes.

Figure 69 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 hommes, pour le cancer de la prostate dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 70 **Nombre moyen de congés, par 1 000 hommes, pour le cancer de la prostate, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES

NOTES POUR LA FIGURE 71

La **figure 71** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000, pour le cancer du sein chez les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 5 et 6.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 72

La **figure 72** montre le nombre moyen de congés, par 1 000, pour le cancer du sein chez les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

- On n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés, par 1 000.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre de congés, par 1 000.

Figure 71 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes, pour le cancer du sein chez les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 72 **Nombre moyen de congés, par 1 000 femmes, pour le cancer du sein chez les, femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



CANCER COLORECTAL

NOTES POUR LA FIGURE 73

La **figure 73** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour le cancer colorectal (côlon et rectum) chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1 et 5.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans la Région 2, dans le Sud et dans l'ensemble de la province. On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes dans les Régions 1, 3, 5 et 6.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 4 et 7 et dans le Nord de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 74

La **figure 74** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour le cancer colorectal chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés par 1 000 habitants.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, on n'a constaté aucune différence significative entre les moyennes régionales et la moyenne provinciale quant au nombre de congés, par 1 000 habitants.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes quant au nombre moyen de congés dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud ou l'ensemble de la province.

Figure 73 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour le cancer colorectal selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 74 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour le cancer colorectal selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES

NOTES POUR LA FIGURE 75

La **figure 75** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 femmes, pour les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches, dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes, a connu une baisse significative de 34%.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 femmes, a diminué d'environ 16%.

Figure 75 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 femmes, complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 76

La **figure 76** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes, pour les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (femmes)

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 5.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes.

NOTES POUR LA FIGURE 77

La **figure** 77 montre le nombre moyen de congés, par 1 000 femmes, pour les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (femmes)

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 femmes, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 7.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud quant au nombre moyen de congés, par 1 000 femmes.

Figure 76 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 femmes, pour les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 77 **Nombre moyen de congés, par 1 000 femmes, pour les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

NOTES POUR LA FIGURE 78

La **figure 78** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 17% chez les hommes et il a augmenté d'environ 3% chez les femmes. Chez les hommes, ce nombre a augmenté de manière remarquable pendant l'année 1996-1997.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté d'environ 15% chez les hommes et d'environ 25% chez les femmes.

Figure 78 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens, selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 79

La **figure 79** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 4 et 5.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions sauf dans la Région 4 où c'était l'inverse.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 80

La **figure 80** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans la Région 4.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 4.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, et ce, dans toutes les régions sauf dans la Région 5.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 79 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 80 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système nerveux et des organes des sens selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 81

La **figure 81** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 30% chez les hommes et d'environ 32% chez les femmes, avec une exception remarquable chez les femmes en 1995-1996.

- Au cours de cette même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 7% chez les hommes, mais il n'a connu aucun changement général chez les femmes.

Figure 81 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements, selon le sexe, Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 82

La **figure 82** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2, 5 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Sud que dans le Nord de la province chez les femmes.

- On a constaté une différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, chez les hommes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 1, 2, 3 et 5, mais il était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans la région 7.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 83

La **figure 83** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3, 5 et 7.

Nord et Sud

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et ce, dans chaque région, ainsi que dans le Nord, dans le Sud et dans l'ensemble de la province.

Figure 82 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 83 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les lésions traumatiques et les empoisonnements selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE ET DES MUSCLES

NOTES POUR LA FIGURE 84

La **figure 84** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 15% chez les hommes et d'environ 23% chez les femmes.

- Au cours de cette même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté de 10% tant chez les hommes que chez les femmes.

Figure 84 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles, selon le sexe, Nouveau-Brunswick, de 1993-1994 à 1997-1998**



NOTES POUR LA FIGURE 85

La **figure 85** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 4, 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3, 4, 5 et 7.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, chez les hommes.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 86

La **figure 86** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 5.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans la Région 3.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 3 et 4, mais on n'a constaté aucune différence significative à cet égard dans les autres régions.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 85 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 86 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES

NOTES POUR LA FIGURE 87

La **figure 87** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 38% chez les hommes et d'environ 24% chez les femmes.

- Au cours de cette même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 15% chez les hommes et d'environ 13% chez les femmes.

Figure 87 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 88

La **figure 88** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 5 et 6.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans toutes les régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 89

La **figure 89** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les hommes était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2 et 5.

Régions (femmes)

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les femmes était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 2, 5 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les femmes était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les hommes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans toutes les régions.

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 88 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 89 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies des organes génito-urinaires selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES

NOTES POUR LA FIGURE 90

La **figure 90** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés par 1 000 habitants pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires chez les hommes et les femmes dans la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a diminué d'environ 28% chez les hommes et d'environ 23% chez les femmes.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, a augmenté de 6% chez les hommes et d'environ 12% chez les femmes.

Figure 90 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 91

La **figure 91** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 1, 2 et 5.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 4, 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord de la province que dans le Sud chez les femmes.

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, chez les hommes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans les Régions 3, 4, 5, 6 et 7, dans le Nord de la province et dans l'ensemble de la province.

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1 et 2, et dans le Sud de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 92

La **figure 92** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 5 et 7.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 5, 6 et 7.

Nord et Sud

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé dans le Nord que dans le Sud de la province.

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, chez les hommes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans toutes les régions, sauf dans la Région 2, ainsi que dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 91 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 92 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et pour les troubles immunitaires selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ

NOTES POUR LA FIGURE 93

La **figure 93** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané chez les hommes et les femmes du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de 1993-1994 à 1997-1998.

- Au cours de cette période, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, a augmenté d'environ 4% chez les hommes et il a diminué d'environ 32% chez les femmes.

- Au cours de la même période, le nombre de congés, par 1 000 habitants, est resté assez uniforme, malgré quelques petites variations, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Figure 93 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané selon le sexe, Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998



NOTES POUR LA FIGURE 94

La **figure 94** montre le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané chez les hommes et les femmes dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, chez les hommes était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 5.

Régions (femmes)

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, chez les femmes était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 5.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de jours de soins hospitaliers par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- Le nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les Régions 1, 4, 5 et 7, dans le Nord de la province et dans l'ensemble de la province.

- On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes dans les Régions 2, 3 et 6 et dans le Sud de la province.

NOTES POUR LA FIGURE 95

La **figure 95** montre le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané chez les hommes et les femmes, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période quinquennale de 1993-1994 à 1997-1998.

Régions (hommes)

- Chez les hommes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans les Régions 3 et 5.

Régions (femmes)

- Chez les femmes, le nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, était sensiblement plus élevé que la moyenne provinciale dans la Région 3 et 5.

Nord et Sud

- On n'a constaté aucune différence significative entre le Nord et le Sud de la province quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Différences selon le sexe

- On n'a constaté aucune différence significative entre les hommes et les femmes quant au nombre moyen de congés par 1 000 habitants, et ce, dans aucune des régions, dans le Nord, le Sud et l'ensemble de la province.

Figure 94 **Nombre moyen de jours de soins hospitaliers, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



Figure 95 **Nombre moyen de congés, par 1 000 habitants, pour les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané selon le sexe dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1993-1994 à 1997-1998**



AUTRES DONNÉES

ANOMALIES CONGÉNITALES

NOTES POUR LA FIGURE 96

La **figure 96** montre le nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 100 000 habitants, selon le sexe, pour toutes les anomalies congénitales au Nouveau-Brunswick et au Canada, pour chaque année de la période de 1992-1993 à 1997-1998.

- Au Nouveau-Brunswick, le nombre de jours de soins hospitaliers, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales a augmenté d'environ 86% chez les hommes en 1995-1996 puis il est resté stable les deux années suivantes. Ce nombre a diminué d'environ 45% chez les femmes de 1993-1994 à 1997-1998. Au cours de cette même période, le nombre annuel de jours de soins hospitaliers pour les anomalies congénitales au Canada a diminué d'environ 40% chez les hommes et d'environ 45% chez les femmes.

- De 1992-1993 à 1997-1998, le nombre annuel de congés, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales a diminué d'environ 11% chez les Néo-Brunswickois et d'environ 16% chez les Néo-Brunswickoises. Au cours de cette même période, le nombre annuel de congés pour les anomalies congénitales au Canada a diminué d'environ 37% chez les hommes et d'environ 32% chez les femmes.

- Le nombre annuel de jours de soins hospitaliers, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales a été constamment moins élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, à l'exception de l'année 1995-1996, où ce nombre a été de cinq à six fois plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada, chez les hommes.

- Le nombre annuel de congés, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales a été plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

- Le nombre annuel de jours de soins hospitaliers et de congés, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales a été constamment plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et ce, tant au Canada qu'au Nouveau-Brunswick.

Figure 96 **Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 100 000 habitants, pour les anomalies congénitales selon le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998**





NOTES POUR LE TABLEAU 31

Le **tableau 31** présente les données sur l'utilisation des ressources hospitalières pour toutes les anomalies congénitales au Nouveau-Brunswick et au Canada, de 1992-1993 à 1997-1998.

NOTES POUR LE TABLEAU 32

Le **tableau 32** donne le nombre total de congés et le nombre de congés, par 100 000 habitants pour certains diagnostics d'anomalies congénitales au Nouveau-Brunswick et au Canada, de 1992-1993 à 1997-1998.

Tableau 31 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 100 000 habitants, pour toutes les anomalies congénitales selon le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998

		1992-1993		1993-1994		1994-1995		1995-1996		1996-1997		1997-1998	
	Sexe	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada
Nombre de congés	H	554	14 236	470	13 241	522	12 442	514	11 258	514	10 515	485	9 922
	F	408	10 526	472	10 025	439	9 541	428	8 870	385	8 038	370	7 849
Congés par 100 000 habitants	H	150	105	126	92	140	87	138	78	128	73	130	66
	F	108	75	125	69	116	65	116	60	102	53	98	52
Nombre de jours de soins hospitaliers	H	2 223	136 015	1 324	104 986	2 052	78 926	10 020	73 097	1 216	67 008	1 567	65 850
	F	1 729	115 713	1 894	90 455	1 713	68 842	1 374	65 739	1 429	55 593	1 045	51 826
Jours de soins hospitaliers par 100 000 habitants	H	599	1 005	356	732	551	548	2 686	501	325	455	419	443
	F	458	831	501	619	453	468	363	442	377	391	275	340

Source : Statistique Canada

- *Rapports sur la santé, supplément n° 1, 1994, vol. 3, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1993-1994.*
- *Rapports sur la santé, supplément n° 1, 1995, vol. 4, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1993-1994.*
- *Catalogue 82-216XPB, La morbidité hospitalière, 1994-1995.*
- *Catalogue 82-216XPB, annuel, La morbidité hospitalière, 1995-1996.*

Tableau 31 Nombre de jours de soins hospitaliers et de congés, par 100 000 habitants, pour toutes les anomalies congénitales selon le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998

	Sexe	1992-1993		1993-1994		1994-1995		1995-1996		1996-1997		1997-1998	
		N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada
Nombre de congés	H	554	14 236	470	13 241	522	12 442	514	11 258	514	10 515	485	9 922
	F	408	10 526	472	10 025	439	9 541	428	8 870	385	8 038	370	7 849
Congés par 100 000 habitants	H	150	105	126	92	140	87	138	78	128	73	130	66
	F	108	75	125	69	116	65	116	60	102	53	98	52
Nombre de jours de soins hospitaliers	H	2 223	136 015	1 324	104 986	2 052	78 926	10 020	73 097	1 216	67 008	1 567	65 850
	F	1 729	115 713	1 894	90 455	1 713	68 842	1 374	65 739	1 429	55 593	1 045	51 826
Jours de soins hospitaliers par 100 000 habitants	H	599	1 005	356	732	551	548	2 686	501	325	455	419	443
	F	458	831	501	619	453	468	363	442	377	391	275	340

Source : Statistique Canada

- *Rapports sur la santé, supplément n° 1, 1994, vol. 3, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1993-1994.*
- *Rapports sur la santé, supplément n° 1, 1995, vol. 4, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1993-1994.*
- *Catalogue 82-216XPB, La morbidité hospitalière, 1994-1995.*
- *Catalogue 82-216XPB, annuel, La morbidité hospitalière, 1995-1996.*

Tableau 32 Nombre total de congés et nombre de congés, par 100 000 habitants, pour certains diagnostics d'anomalies congénitales selon le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998

		1992 - 1993				1993 – 1994				1994 – 1995			
		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants	
	Sexe	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada
Spina bifida	H	0	227	0	2	5	166	1	1	8	170	2	2
	F	9	258	2	2	14	232	4	2	11	251	3	1
Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	H	10	411	3	3	17	446	5	3	6	407	2	3
	F	5	433	1	3	15	395	4	3	4	385	1	3
Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	H	34	2 869	9	21	21	2 800	6	20	31	2 663	8	18
	F	31	2 537	8	18	39	2 639	10	18	38	2 463	10	17
Fissure du palais et bec-de-lièvre	H	17	853	5	6	17	827	5	6	26	818	7	6
	F	22	578	6	4	23	592	6	4	16	559	4	4
Anomalies congénitales de l'appareil digestif	H	83	1 739	22	13	52	1 623	14	11	72	1 548	19	11
	F	40	818	11	6	55	810	15	6	52	758	14	5
Anomalies congénitales des organes génitaux	H	199	3 371	54	25	166	3 026	45	21	165	2 794	44	19
	F	71	1 153	19	8	69	1 061	18	7	76	977	20	7
Malformations du système ostéo-musculaire	H	83	2 341	22	17	62	2 202	17	15	68	2 044	18	14
	F	81	2 410	21	17	103	2 094	27	14	76	2 036	20	14
Anomalies congénitales, autres	H	128	2 425	34	18	130	2 151	35	15	146	1 998	39	14
	F	149	2 339	39	17	154	2 202	41	15	166	2 112	44	14
TOTAL	H	554	14 236	149	105	470	13 241	126	92	522	12 442	140	87
	F	408	10 526	108	75	472	10 025	125	69	439	9 541	116	65

Tableau 32 (suite) **Nombre total de congés et nombre de congés, par 100 000 habitants, pour certains diagnostics d'anomalies congénitales selon le sexe, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998**

		1995 - 1996				1996 - 1997				1997 –1998			
		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants		Nombre de congés		Congés par 100 000 habitants	
	Sexe	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada	N.-B.	Canada
Spina bifida	H	0	123	0	1	3	110	1	1	1	83	0	1
	F	1	204	0	1	8	150	2	1	2	132	1	1
Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	H	15	385	4	3	6	379	2	3	5	318	1	2
	F	9	401	2	3	7	307	2	2	4	307	1	2
Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	H	27	2 635	7	18	28	2 446	7	17	32	2 403	9	16
	F	33	2 451	9	16	26	2 255	7	15	31	2 298	8	15
Fissure du palais et bec-de-lièvre	H	16	819	4	6	19	761	5	5	22	750	6	5
	F	22	544	6	4	10	521	3	3	14	523	4	3
Anomalies congénitales de l'appareil digestif	H	64	1 389	17	10	99	1 412	26	10	79	1 396	21	9
	F	45	682	12	5	43	687	11	5	34	690	9	5
Anomalies congénitales des organes génitaux	H	192	2 353	51	16	142	1 995	38	14	147	1 824	39	12
	F	53	849	14	6	66	734	17	5	64	705	17	5
Malformations du système ostéo-musculaire	H	51	1 914	14	13	57	1 840	15	12	54	1 771	14	12
	F	69	1 894	18	13	62	1 807	16	12	68	1 764	18	12
Anomalies congénitales, autres	H	149	1 640	40	11	126	1 572	34	10	145	1 377	39	9
	F	206	1 841	54	12	163	1 577	43	10	154	1 430	41	9
TOTAL	H	514	11 258	138	78	480	10 515	128	73	485	9 922	130	66
	F	438	8 866	116	69	385	8 038	102	53	371	7 849	98	52

Source : Statistique Canada

- Rapports sur la santé, Supplément n° 1, 1993, vol. 3, n° 1, catalogue 82-003S1, Morbidité hospitalière, 1993-1997.

- Rapports sur la santé, Supplément n° 1, 1992, vol. 4, n° 1, catalogue 82-82003S1, Morbidité hospitalière, 1993-1997.

- Catalogue 82-216XPB, La morbidité hospitalière, 1992-1993, catalogue 82-216XPB, annuel, La morbidité hospitalière, 1993-1994.

NOTES POUR LA FIGURE 97

La **figure 97** montre le nombre moyen de congés, par 100 000 habitants, selon le sexe pour certains diagnostics d'anomalies congénitales au Nouveau-Brunswick et au Canada, au cours de la période de 1992-1993 à 1997-1998.

- Chez les hommes, le principal type d'anomalies congénitales a été les anomalies des organes génitaux au Nouveau-Brunswick et les anomalies de l'appareil circulatoire au Canada.

- Chez les femmes, les anomalies de l'appareil circulatoire ont été le principal type d'anomalies congénitales tant au Nouveau-Brunswick qu'au Canada.

- Le nombre d'anomalies congénitales des organes génitaux a été considérablement plus élevé chez les hommes au Nouveau-Brunswick qu'au Canada.

Figure 97 Nombre moyen de congés pour les anomalies congénitales selon le sexe et le diagnostic, Nouveau-Brunswick et Canada : de 1992-1993 à 1997-1998



Codes de la CIM-9

752 Anomalies congénitales des organes génitaux
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre
747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
742 Autres anomalies congénitales du système nerveux
751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif
741 Spina bifida
756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire
759 Anomalies congénitales, autres et sans précision

SANTÉ DE L'ENFANT

NOTES POUR LE TABLEAU 33

Le **tableau 33** donne le nombre de cas aiguillés pour des problèmes de santé repérés lors des cliniques pédiatriques d'immunisation (cliniques de puériculture) et les cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, au cours de la période de quatre ans de 1995/96 à 1998/99.

Les moyennes obtenues au cours de cette période de quatre ans ont permis d'observer les résultats suivants :

- Pour l'ensemble de la province, les types de problèmes de santé pour lesquels il y a eu le plus de cas aiguillés ont été les problèmes de peau, les problèmes de croissance et de développement et les problèmes généraux de santé;

- Les seules différences significatives entre les sept régions sanitaires et l'ensemble de la province quant à la répartition des cas aiguillés pour des problèmes de santé ont été un pourcentage inférieur à la moyenne pour les problèmes de la bouche dans la Région 1 et un pourcentage supérieur à la moyenne pour ces mêmes problèmes dans la Région 3.

- La seule différence significative entre le Nord et le Sud de la province a été un pourcentage plus élevé de problèmes de croissance et de développement dans le Nord que dans le Sud.

Tableau 33 Nombre de cas aiguillés pour des problèmes de santé repérés lors des cliniques de puériculture et des cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : de 1995/1996 à 1998/1999

1995-1996

Région	Bouche	Problème Psychosocial	Oreilles	Croissance et développement	Peau	Problème général
1	92	25	47	6	15	36
2	189	20	378	7	5	51
3	94	22	30	17	6	67
4	30	33	43	9	6	65
5	36	18	20	13	8	47
6	78	97	15	36	4	50
7	49	27	11	16	5	58
Nord	193	175	89	74	23	220
Sud	375	67	455	30	26	154
Province	568	242	544	104	49	374

1996-1997

Région	Bouche	Problème psychosocial	Oreilles	Croissance et développement	Peau	Problème général
1	116	18	41	15	7	48
2	210	15	374	4	1	39
3	76	26	32	6	8	68
4	23	35	35	8	7	63
5	36	34	21	12	6	28
6	67	109	26	14	3	81
7	37	46	21	70	6	50
Nord	163	224	103	104	22	222
Sud	402	59	447	25	16	155
Province	565	283	550	129	28	377

1997-1998

Région	Bouche	Problème psychosocial	Oreilles	Croissance et développement	Peau	Problème général
1	133	14	43	9	11	35
2	174	23	369	8	2	33
3	45	31	16	20	14	94
4	29	30	39	5	4	56
5	27	22	25	13	11	32
6	75	163	36	15	3	98
7	17	39	14	31	4	42
Nord	148	254	114	64	22	228
Sud	352	68	428	37	27	162
Province	500	322	542	101	49	390

1998-1999

Région	Bouche	Problème psychosocial	Oreilles	Croissance et développement	Peau	Problème général
1	140	10	59	8	6	31
2	146	20	430	14	4	43
3	39	22	24	24	5	37
4	27	25	18	0	7	44
5	28	15	23	9	4	37
6	62	143	17	29	5	67
7	15	26	12	33	4	45
Nord	132	209	70	71	20	193
Sud	325	52	513	46	15	111
Province	457	261	583	117	35	304

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LE TABLEAU 34

Le **tableau 34** donne des renseignements obtenus lors de l'évaluation des nouveau-nés effectuée dans le cadre du programme des Initiatives pour la petite enfance (IPE) lancé en 1994. Tous les nouveau-nés de la province ont été évalués et classés dans l'une des quatre catégories de priorités de la Santé publique. Cette évaluation permet de repérer les enfants porteurs d'un handicap de santé congénital ou acquis, les problèmes de développement ou les problèmes d'interaction familiale. Chaque composante fournit une note et la note totale est évaluée comme suit :

	Note
Priorité élevée	> 9
Priorité moyenne	6 à 8
Priorité faible	3 à 5
Priorité minimale	0 à 2

Le **tableau 34** donne le nombre de nouveau-nés répartis dans chacune des catégories de priorités dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, pour l'année 1998-1999.

- Dans l'ensemble de la province, environ 53% des nouveau-nés ont été classés dans la catégorie de priorité minimale, 16% ont été classés dans la catégorie de priorité faible, 11% ont été classés dans la catégorie de priorité moyenne et 20% ont été classés dans la catégorie de priorité élevée.

- En comparaison avec l'ensemble de la province :

  - La Région 2 comportait un pourcentage plus élevé que le pourcentage moyen des évaluations de « priorité minimale »;
  - La Région 3 comportait un pourcentage plus élevé que le pourcentage moyen des évaluations de « priorité faible » et un pourcentage inférieur au pourcentage moyen des évaluations de « priorité élevée »;
  - La Région 5 comportait un pourcentage légèrement plus élevé que le pourcentage moyen des évaluations de « priorité minimale » et un pourcentage inférieur au pourcentage moyen des évaluations de « priorité faible »;
  - Les Régions 6 et 7 comportaient un pourcentage plus élevé que le pourcentage moyen des évaluations de « priorité minimale » et un pourcentage inférieur au pourcentage moyen des évaluations de « priorité élevée ».

- En comparaison avec le Sud de la province, le Nord avait un pourcentage plus faible des évaluations de « priorité minimale » et un pourcentage plus élevé des évaluations de « priorité faible » et de « priorité élevée ».

Tableau 34 Nombre de clients nouveau-nés évalués pour les IPE selon la catégorie de risque dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick : 1998-1999

	Priorité				
Région	**MINIMALE**	**FAIBLE**	**MOYENNE**	**ÉLEVÉE**	**TOTAL**
1	1 012	117	206	440	1 775
2	1 099	294	241	320	1 954
3	933	398	175	323	1 829
4	228	95	45	55	423
5	197	65	24	60	346
6	371	156	70	201	798
7	250	100	55	154	559
Nord	1 046	426	194	470	2 126
Sud	3 044	809	622	1 083	5 558
Province	4 090	1 225	816	1 553	7 684

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LE TABLEAU 35

Le **tableau 35** présente le nombre total d'échecs aux tests de dépistage des problèmes de la vue, de l'ouïe et de l'élocution dans les cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi, de 1995-1996 à 1998-1999.

Tableau 35 Nombre total d'échecs aux tests de dépistage de la vue, de l'ouïe et de l'élocution dans les cliniques d'hygiène pour enfants de trois ans et demi, dans les sept régions sanitaires, le Nord, le Sud et la province du Nouveau-Brunswick, de 1995-1996 à 1998-1999

1995-1996

Région	VUE	OUÏE	ÉLOCUTION
1	164	212	323
2	97	153	139
3	124	224	160
4	25	40	87
5	51	123	92
6	95	156	226
7	75	120	77
Nord	246	439	482
Sud	385	589	622
Province	631	1 028	1 104

1996-1997

Région	VUE	OUÏE	ÉLOCUTION
1	154	237	330
2	70	119	154
3	133	186	172
4	33	46	80
5	42	100	90
6	78	134	220
7	70	81	53
Nord	223	361	443
Sud	357	542	656
Province	580	903	1 099

1997-1998

Région	VUE	OUÏE	ÉLOCUTION
1	145	197	348
2	78	103	156
3	117	189	190
4	30	41	81
5	49	131	83
6	85	175	227
7	58	62	46
Nord	222	489	437
Sud	340	417	694
Province	559	906	1 131

1998-1999

Région	VUE	OUÏE	ÉLOCUTION
1	147	152	370
2	69	94	144
3	117	191	165
4	56	85	100
5	48	123	88
6	89	160	203
7	64	79	70
Nord	230	447	461
Sud	360	439	667
Province	590	884	1 140

Source : Programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LE TABLEAU 36

Un programme dentaire de prévention, appelé Programme de rinçage buccal au fluorure, est en place dans les écoles primaires du Nouveau-Brunswick depuis 1979. Actuellement, ce programme est accessible à tous les enfants de la province, de la première à la sixième année.

Le **tableau 36** donne le taux de participation des élèves au Programme de rinçage buccal au fluorure, de la 1re à la 6e année, au cours de la période quinquennale de 1994-1995 à 1998-1999. Le taux de participation pour l'ensemble de la province a diminué au cours de cette période, passant de 89,4% en 1994-1995 à 79,5% en 1998-1999. Le taux de participation est considérablement moins élevé en sixième année. Depuis l'introduction, en 1994, de l'école intermédiaire (de la 6e à la 8e année) dans les districts anglophones, certaines des classes de 6e année ont complètement arrêté de participer à ce programme.

Tableau 36 Taux de participation des élèves au programme de rinçage buccal au fluorure de la 1re à la 6e année, Nouveau-Brunswick : de 1994-1995 à 1998-1999

Année	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
1	92,7	93,9	93	92,2	90,1
2	93,6	93,1	93,2	90	90
3	92	91,5	91	90	85
4	90,8	89,2	90	80	85
5	89	87,4	87,2	84	78
6	78,3	73,5	73	58	49
Taux provincial	**89,4**	**88,1**	**87,9**	**82,4**	**79,5**

Source : Service de gestion de la Santé publique, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

NOTES POUR LA FIGURE 98

La **figure 98** montre le taux de natalité, par 1 000 femmes, pour quatre groupes d'âge, au cours de la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, le taux de natalité chez les femmes de 20 à 24 ans a diminué d'environ 31%.

- Chez les adolescentes de moins de 15 ans, le taux de natalité est resté stable entre 1994 et 1998. Chez les adolescentes de 15 à 17 ans et chez les jeunes femmes de 18 et 19 ans, le taux de natalité a diminué respectivement de 30% et de 15% environ, puis il a augmenté chez les femmes de 18 et 19 ans, en 1998.

Figure 98 Taux de natalité, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LA FIGURE 99

La **figure 99** montre le taux de natalité, par 1 000 femmes de 20 à 24 ans, selon l'état matrimonial, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

- Au cours de cette période, le taux de natalité, par 1 000 femmes, célibataires de 20 à 24 ans a augmenté d'environ 8%.
- Au cours de la même période, le taux de natalité, par 1 000 femmes de 20 à 24 ans, mariées, veuves ou divorcées, a diminué d'environ 45%.

Figure 99 Taux de natalité, par 1 000 femmes de 20 à 24 ans, selon l'état matrimonial, Nouveau-Brunswick : 1994-1998



NOTES POUR LE TABLEAU 37

Le **tableau 37** donne le nombre de naissances et le taux de natalité, par 1 000 femmes, selon certains groupes d'âge de même que le nombre de naissances et le taux de natalité, par 1 000 femmes, de 20 à 24 ans, selon l'état matrimonial, pour la période quinquennale de 1994 à 1998.

Tableau 37 Nombre de naissances et taux de natalité, par 1 000 femmes, selon le groupe d'âge, et selon l'état matrimonial des femmes de 20 à 24 ans, Nouveau-Brunswick : 1994-1998

Groupe d'âge	1994		1995		1996		1997		1998	
	Nombre de naiss.	Taux de natalité par 1 000	Nombre de naiss.	Taux de natalité par 1 000	Nombre de naiss.	Taux de natalité par 1 000	Nombre de naiss.	Taux de natalité par 1 000	Nombre de naiss.	Taux de natalité par 1 000
< 15 ans	4	0,08	3	0,06	2	0,04	8	0,16	8	0,16
15-17 ans	288	8,81	294	9,15	216	6,75	216	6,82	194	6,21
18-19 ans	596	25,99	574	24,29	481	21,99	428	20,17	464	22,11
20-24 ans (mariées, veuves ou	1 049	18,50	967	17,24	848	15,37	805	14,95	680	12,79
20-24 ans (célibataires)	1 194	21,08	1 210	21,58	1206	21,86	1 201	22,30	1 183	22,25
Tous les âges	8 907	11,86	8 512	11,32	8 134	10,80	7 867	10,43	7 830	10,40

Source : Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick (base de données des statistiques de l'état civil du N.-B., 1994-1998). Population basée sur le recensement de 1996, après rajustement.

PROBLÈMES LIÉS AU MODE DE VIE

USAGE DE DROGUES

NOTES POUR LE TABLEAU 38

Le **tableau 38** compare les résultats de l'*Enquête provinciale sur la consommation de drogues par les élèves* de 1996 et de celle de 1998. Dans les deux cas, les trois drogues les plus souvent consommées au cours des douze mois qui ont précédé l'enquête ont été l'alcool, le tabac et le cannabis.

- Les deux enquêtes montrent très peu de changements dans la consommation de drogues indiquée, à l'exception de la consommation de LSD qui a diminué de 4% de 1996 à 1998.

Tableau 38 Usage déclaré de substances psychoactives ou de drogues chez les élèves de la 7e, de la 9e, de la 10e et de la 12e année, Nouveau-Brunswick : 1996 et 1998

Drogue	1996 Usage déclaré (%) (n = 3 315)	1998 Usage déclaré (%) (n = 3 298)
Alcool	52,3	55,6
Tabac	32,7	32,2
Cannabis	28,9	30,6
Barbituriques (prescrits)	1,2	1,0
Barbituriques (non prescrits)	2,4	1,4
Héroïne	2,4	1,7
Stimulants (prescrits)	3,7	4,7
Stimulants (non prescrits)	9,3	8,4
Tranquillisants (prescrits)	5,1	5,0
Tranquillisants (non prescrits)	4,5	3,8
LSD*	15,1	10,9
Cocaïne	4,7	4,0
PCP	3,9	3,5
Stéroïdes	2,8	2,2
Psilocybine/mescaline	8,4	9,3
Aérosols pour inhalation	5,8	5,5

*$p<0.05$

Source : Rapport technique, 1996-1998. Service provincial d'épidémiologie, ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick.

Annexe A

Carte des régions sanitaires du Nouveau-Brunswick



GLOSSAIRE

Années potentielles de vie perdues :	Total des années potentielles de vie perdues en raison d'une cause particulière, constitué par la somme des années qu'auraient vécu toutes les personnes décédées en raison de cette cause, si leur espérance de vie avait été normale.
Congé (de l'hôpital) :	Congé ou décès d'un patient.
Taux brut de mortalité :	Proportion de décès au sein d'une population (par 1 000 habitants).
Taux comparatif de l'âge :	Taux brut tel qu'il serait si la population pour laquelle le taux est ajusté et la population-type avaient la même répartition en ce qui concerne l'âge.
Taux d'accroissement naturel :	Mesure de la croissance démographique (en l'absence de migration) obtenue en additionnant le nombre de nouveau-nés à la population et en soustrayant les décès (par 1 000 habitants).
Taux de fécondité par âge :	Nombre de naissances vivantes au cours d'une année pour 1 000 femmes d'un certain groupe d'âge.
Taux de mortalité infantile :	Nombre de décès parmi les enfants âgés de moins d'un an au cours d'une année par rapport au nombre de naissances vivantes durant la même année (par 1 000 naissances vivantes).
Taux de mortalité par âge :	Nombre de décès au cours d'une année dans la population définie d'un certain groupe d'âge par rapport à la population moyenne de ce groupe d'âge au cours de cette année (par 10 000 habitants).
Taux de mortalité proportionnelle :	Nombre de décès attribuables à une cause donnée pendant une période précise, par 1 000 décès survenus au cours de cette même période.

BIBLIOGRAPHIE

Base de données des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, 1994-1998.

Base de données des statistiques de l'état civil du Nouveau-Brunswick, 1994-1998.

Base de données du système HNIC sur les immunisations au Nouveau-Brunswick, 1994-1998.

Conseil canadien de la sécurité (1999). Communications personnelles, Ottawa.

Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Division de la recherche et de la planification, octobre 1994, Programme de nutrition pour les écoles primaires. Rapport de suivi, automne 1998.

Rapport intégral – Enquête provinciale de 1993 sur la consommation de drogues par les élèves.

Statistique Canada, catalogue n° 84-537, *Tables de mortalité, Canada et provinces*, 1994-1996.

Statistique Canada, *Indicateurs des hôpitaux*, 1994-1995, partie 4, dépenses totales.

Statistique Canada, *Indicateurs des hôpitaux*, 1995-1996, partie 4, dépenses totales.

Statistique Canada, *Indicateurs des hôpitaux*, 1996-1997, partie 4, dépenses totales.

Statistique Canada, *La morbidité hospitalière*, catalogue 82-216, 1994-1995.

Statistique Canada, *La morbidité hospitalière*, annuel, catalogue 82-216, 1994-1995.

Statistique Canada, *Rapports sur la santé*, supplément n° 1, 1994, vol. 3, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1994-1998.

Statistique Canada, *Rapports sur la santé*, supplément n° 1, 1995, vol. 4, n° 1, catalogue 82-003S1, La morbidité hospitalière, 1994-1998.

Statistique Canada, *Rapports sur la santé*, supplément n° 21, 1996, vol. 3, n° 4, Indicateurs des hôpitaux, 1994-1998, vol. 4, dépenses totales.